


عضوي کيميا

دولسم ټولگی



Ketabton.com



د پوهنې وزارت

د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو
د روزنې او د ساینس د مرکز معییت
د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي
کتابونو د تالیف لوی ریاست

عضوي کيميا

دو لسم ټولگي

د چاپ کال: ۱۳۹۰ هـ. ش



ليکوالان:

پوهنځی دیپلوم انجینیر عبدالمحمد «عزیز» د کابل پوهنتون استاد.

مؤلف عتیق احمد شیرازی د کیمیا د څانګې علمي غړی

پوهنځی محمد انور شریفی د پروان د لوړو زده کړو د مؤسسې استاد

علمي ایډیټ:

پوهنځی دیپلوم انجینیر عبدالمحمد «عزیز» د کابل پوهنتون استاد.

د ژبې ایډیټ:

مؤلف اقامحمد کرندي خوربانی د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسی کتابونو د تالیف د لوی ریاست علمي

اوسلکی غړی.

دیني، سیاسي او کلتوري کمیټه:

ډاکټر عطاء الله واحدیار پوهنې وزارت ستر سلاکار او د نشراتو رئیس.

حبيب الله راحل د تعلیمي نصاب په ریاست کې د پوهنې وزارت سلاکار.

مؤلف قاری مایل آقا «متقي» د اسلامي زده کړو څانګې علمي غړی

د څارنې کمیټه:

ډکټر اسدالله محقق د تعلیمي نصاب د پراختیا، د بنوونکو د روزنې او د ساینس مرکز معین

ډکټر شیر علي ظریفی د تعلیمي نصاب د پروژې مسوول

د سر مولف مرستیال عبدالظاهر گلستاني د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف لوی رئیس


کمپوز:

ربیع الله

طرح او ډیزاین:

حمید کریمی (سجدره یی)، صفت الله مومند او محمد علي نظري







دا عزت د هر افغان دی

دا وطن افغانستان دی

هر بچی پي قهرمان دی

کور د سولې، کور د توري

د بلوڅو، د ازبکو

دا وطن د ټولو کور دی

د ترکمنو، د تاجکو

د پښتون او هزاره وو

پامریان، نورستانیان

ورسره عرب، گوجر دي

هم ايماق، هم پشه یان

براهوي دي، قزلباش دي

لکه لمر پر شنه آسمان

دا هیواد به تل خلپري

لکه زړه وي جاویدان

په سینه کې د آسیا، به

وايو الله اکبر وایو الله اکبر

نوم د حق مو دی رهبر



بسم الله الرحمن الرحيم

د پوهنې د وزیر پیغام گرانو ښوونکو او زده کوونکو،

ښووننه او روزنه د هر هېواد د پراختیا او پرمختګ بنسټ جوړوي. تعلیمي نصاب د ښوونې او روزنې مهم توکی دی چې د معاصر علمي پرمختګ او ټولنې د اړتیاو له مخې رامنځته کېږي. څرګنده ده چې علمي پرمختګ او ټولنیزې اړتیاوې تل د بدلون په حال کې وي. له دې امله لازمه ده چې تعلیمي نصاب هم علمي او رغنده انکشاف ومومي. البته نه ښايي چې تعلیمي نصاب د سیاسي بدلونونو او د اشخاصو د نظریو او هیلو تابع شي.

دا کتاب چې نن ستاسو په لاس کې دی، پر همدې ارزښتونو چمتو او ترتیب شوی دی. علمي ګټورې موضوعګانې پکې زياتې شوې دي. د زده کړې په بهیر کې د زده کوونکو فعال ساتل د تدریسي پلان برخه ګرځیدلې ده.

هیله من یم دا کتاب له لارښوونو او تعلیمي پلان سره سم د فعالې زده کړې د میتودونو د کارولو له لارې تدریس شي او د زده کوونکو میندې او پلرونه هم د خپلو لویو او زامنو په پاکفیته ښوونه او روزنه کې پرله پسې ګله مرسته وکړي چې د پوهنې د نظام هیلې ترسره شي او زده کوونکو او هېواد ته ښې بریاوې ور په برخه کړي.

پر دې ټکي پوره باور لرم چې زموږ ګران ښوونکي د تعلیمي نصاب په رغنده پلي کولو کې خپل مسؤلیت په ریښتوني توګه سرته رسوي.

د پوهنې وزارت تل زیار کاږي چې د پوهنې تعلیمي نصاب د اسلام د سپېڅلي دین له بنسټونو، د وطن دوستۍ، د پاک حس په ساتلو او علمي معیارونو سره سم د ټولنې د څرګندو اړتیاو له مخې پراختیا ومومي.

په دې ډګر کې د هېواد له ټولو علمي شخصیتونو، د ښوونې او روزنې له پوهانو او د زده کوونکو له میندو او پلرونو څخه هیله لرم چې د خپلو نظریو او رغنده وړاندیزونو له لارې زموږ له مؤلفانو سره د درسي کتابونو په لا ښه تالیف کې مرسته وکړي.

له ټولو هغو پوهانو څخه چې د دې کتاب په چمتو کولو او ترتیب کې یې مرسته کړې، له ملي او نړیوالو درنو مؤسسو، او نورو ملګرو هېوادونو څخه چې د نوي تعلیمي نصاب په چمتو کولو، تدوین او د درسي کتابونو په چاپ او وېش کې یې مرسته کړې ده، مننه او درناوی کوم.

ومن الله التوفیق

فاروق وردګ

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې وزیر



لومړۍ څپرکۍ

- ۱ سربزه
- ۲ په عضوي مرکبونو کې اړیکمیايي اړیکو جوړېدل
- ۳ ۱-۱: د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سونې
- ۴ ۲-۱: د کاربن و لانس او د اړیکو جوړېدل
- ۷ هالیریدینیشن
- ۱۴ د لومړي څپرکي لنډیز
- ۱۵ د- لومړي څپرکي پوښتنې

دویم څپرکۍ

- ۱۸ د مالیکول جوړښت او فورمولونه
- ۱۹ ۱-۲ : مالیکولي فورمول
- ۲۲ ۲-۲ : جوړښتیز فورمولونه
- ۲۳ ۳-۲ : د جوړښتیو فورمولونو د لیکلو لارې
- ۳۱ ۴-۲ : ایزومري (Isomers)
- ۳۳ د دویم څپرکي لنډیز
- ۳۴ تمرین او د دوهم څپرکي پوښتنې

درېم څپرکۍ

- ۳۶ د عضوي مرکبونو ډل بندي
- ۳۷ ۱-۳ : عمومي معلومات
- ۳۸ ۲-۳ : د هایډرو کاربنونو د ډلو ویشل
- ۳۹ ۳-۳ : په هایډرو کاربنونو کې وظیفه یي ډلې
- ۳۹ ۴-۳ : د الکانونو هومولوگي سلسله
- ۴۰ ۳-۵ : عضوي مرکبونه او وظیفه یي ډلې (د هایډروکاربنونو مشتقات)
- ۴۲ ۳-۶ : عضوي مرکبونه د وظیفه یي ډلو سره
- ۴۸ د- دریم څپرکي لنډیز
- ۴۹ د دریم څپرکي پوښتنې

څلورم څپرکۍ

- ۵۱ الکانونه او سایکلونونه
- ۵۲ ۴-۱ : الکانونه (Alkanes)
- ۶۴ ۴-۲ : کره بیزه مرکبونه (سایکلو الکانونه)
- ۶۹ د څلورم څپرکي لنډیز
- ۷۰ د څلورم څپرکي پوښتنې



منځ

لړليک

سرليک

پنځم څپرکی

- ۷۲..... الکينونه او الکايڼونه :
۷۳..... ۱-۰ : الکينونه
۸۲..... ۲-۰ : الکايڼونه (Alkynes)
۸۸..... ۳-۰ : اسيلاين
۹۲..... د پنځم څپرکي لنډيز
۹۳..... د پنځم څپرکي پوښتنې

شپږم څپرکی

- ۹۶..... اروماتيکي مرکبونه (Arenes)
۹۷..... ۱-۶ : د بنزين جوړښت
۱۰۰..... ۲-۶ : د اروماتيک مرکبو نوم ايښودنه
۱۰۰..... ۳-۶ : د اروماتيکو هايډروکاربنونو تعاملونه
۱۰۷..... د شپږم څپرکي لنډيز
۱۰۸..... د شپږم څپرکي پوښتنې او تمرين

اووم څپرکی

- ۱۱۰..... الکايل هلاډونه
۱۱۱..... ۱-۷ : الکايل هلاډونه
۱۱۸..... د اووم څپرکي لنډيز
۱۱۹..... د اووم څپرکي پوښتنې

اتم څپرکی

- ۱۲۱..... الکولونه او ايترونه
۱۲۲..... ۱-۸ الکولونه (Alcohols)
۱۳۷..... ۲-۸ ايترونه (Ethers)
۱۴۱..... د اتم څپرکي لنډيز
۱۴۲..... د اتم څپرکي پوښتنې

نهم څپرکی

- ۱۴۶..... الډيهايډونه او کيټونونه
۱۴۷..... ۹ : الډيهايډ او کيټون (د کاربونيل ډگروپ مرکبه)
۱۴۷..... ۱-۹ : الډيهايډونه
۱۵۹..... ۲-۹ : کيټونونه (Ketones)
۱۶۴..... د نهم څپرکي لنډيز
۱۶۵..... د نهم څپرکي پوښتنې



لسم څپرکی

۱۶۷.....	عضوي تيزابونه (کاربو کسلیک اسید)
۱۶۸.....	۱-۱۰ : عضوي تيزابونه
۱۷۶.....	۲-۱۰ : ځنې مهم کاربوکسلیک اسیدونه
۱۸۲.....	د لسم څپرکي لنډيز
۱۸۳.....	د لسم څپرکي پوښتنې

يو لسم څپرکی

۱۸۵.....	امينونه (Amines)
۱۸۶.....	۱-۱۱ : د امينونو جوړښت او ټولگي
۱۹۷.....	۲-۱۱ : امایډونه (Amides)
۱۹۹.....	د يوولسم څپرکي لنډيز
۱۹۹.....	د يوولسم څپرکي پوښتنې

دوولسم څپرکی

۲۰۱.....	طبيعي پولي ميرونه
۲۰۲.....	۱-۱۲ : د طبيعي پولي ميرونو د لښدي
۲۰۵.....	۱- مونو سکرايډونه
۲۱۲.....	۲ : ډای سکرايډونه
۲۲۰.....	۲-۱۲ : پروټينونه
۲۲۰.....	۳-۱۲ : امينو اسيدونه (Amino acids)
۲۲۸.....	۴-۱۲ : ډای اکسي رابوز نوکليويک (D.N.A) او رابوز کليويک اسيد (R.N.A)
۲۳۱.....	دوولسم څپرکي لنډيز
۲۳۱.....	د دوولسم څپرکي پوښتنې

د يارلسم څپرکی

۲۳۳.....	مصنوعي پولي ميرونه
۲۳۴.....	۱-۱۳ : جمعي پولي ميرونه
۲۴۰.....	۲-۱۳ : متراکم شوي پولي ميرونه (Condensation Polymers)
۲۴۲.....	۳-۱۳ : ساينس ټکنالوژي او ټولنه
۲۴۳.....	۴-۱۳ : د مصنوعي پولي ميرونو په واسطه د هستوگنې د چاپيريال ککړتيا
۲۴۷.....	ديارلسم څپرکي لنډيز
۲۴۷.....	د ديارلسم څپرکي پوښتنې
۲۴۸.....	انځليکونه.....



سربزه

کاربن: خانه خپل خواص لري چې په طبيعت کې يې بيلابيل مرکبونه منځته راوړي دي. دهغه مرکبونه په طبيعت کې ډېر دي چې يوازې ځانگړې برخې ته يې په کيميا کې اختصاص ورکړی شوی دی، او هغه له عضوي کيميا څخه عبارت ده. عضوي کيميا يوه برخه ده چې له هايډروکاربونونو او دهغه له مشتقاتو څخه بحث کوي.

هايډروکاربنونه او دهغه مشتقات په ننني صنعت کې اساسي رول لري. درملونه، رنگونه او اوسني نور عصري سامان آلات له عضوي مرکبونو څخه تشکيل شوي دي.

د دولسم ټولگي کيميا دعضوي کيميا يوه برخه ده او هغه مرکبونه تر مطالعې لاندې نيسي چې له کاربن او هايډروجن څخه تشکيل شوي وي يعنې هايډروکاربنونه او د هغو مشتقات دي.

د دولسم ټولگي کيميا 13 څپرکي لري چې لومړی څپرکی يې په عضوي مرکبونو کې د کيميايي اړيکو تشکيل روښانه کوي.

دويم څپرکی ماليکولي جوړښت او فورمولونه وړاندې کوي.

درېم څپرکی د عضوي مرکبونو د طبقه بندۍ په هکله دی.

څلورم څپرکی الکانونه او سايلکلو الکانونه تشرېح کوي.

پنځم څپرکی الکين او الکاين، شپږم څپرکی اورمالينک مرکبونه، اووم څپرکی الکال هالايدونه، اتم څپرکی الکولونه او ايترونه، نههم څپرکي د الډهايډونو او کيتونونو په هکله معلومات وړاندې کوي.

په همدې ډول لسم څپرکی عضوی تيزابونه، يولسم څپرکی امينونه، دولسم څپرکی طبيعي پولي ميرونه او ديارلسم څپرکی مصنوعي پولي ميرونه توضيح کوي.

د هر څپرکي مطلبونه حيايي خواوې لري او د هر څپرکي د تدریس اساسی موخې دا دي چې په دې برخې کې د زده کوونکو د زده کړې کچه لوړه شي او د خپل ژوندانه په بيلابيلو برخو کې د زده کړې له مطلبونو څخه گټه واخلي او هم په صنعتي مسایلو کې لاسرسی ولري.

د هر څپرکي په پيل کې د زده کړې موخې د پوښتنو په بڼه طرحه شوې دي او د هر څپرکي په پای کې د څپرکي لنډيز ليکل شوی دی چې زده کوونکي له مفاهيمو او د زده کړې له ميتود څخه ښه گټه واخلي.

په همدې ډول دهر څپرکي له لنډيز وروسته تمرين او نه حل شوي پوښتني طرح شوي دي چې زده کوونکي يې په خپله حل کړي چې د اړوند څپرکي د مطالبو په زده کړه کې ورسره مرسته وکړي.

هر څپرکی په ساده او عام فهمه کلمو سره ليکل شوی دی.

د څپرکو دمتونو په منځ کې عملي او نظريي فعاليتونه هم راځي دي چې زده کوونکي يې په خپله د ښوونکي په مرسته په ډله یز او يوکسيز ډول سرته ورسوي او دغه فعاليتونه له زده کوونکو سره لا زياته مرسته کوي.



په عضوي مرکبونو کې د کیمیايي اړیکو جوړیدل



د کاربن د مرکبونو شمیر دومره زیات دی چې د کیمیا د علم یوه مهمه برخه د دې عنصر مرکبونو ته ځانګړې شوې ده او هغه علم چې کولای شو د هغه په واسطه د کاربن او هایډروجن مرکبونه او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسو، د عضوي کیمیا په نوم یادېږي.


په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت، دې رقمونو ته پام وکړئ: یو کال په فرانسه کې د عضوي مرکبونو د خرڅونو عاید په 1995 کال کې یو سلو پنځه ایا میلیارد (185000000000) فرانکو ته رسیدلی دی؛ په داسې حال کې چې د دوره یي جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو (معنې) کلنې خرڅونه یوازې دوه پنځوس 52 میلیارد فرانکه ده. پړدې نسبت د عضوي مرکبونو د خواصو پېژندنه او نوم ایښودنه له ځانګړي اهمیت څخه برخمنه ده. د عضوي مرکبونو د پېژندنې لپاره د اړیکو پېژندنه بنسټیز رول لري؛ نو باید پوره شو چې اړیکه څه ده؟ د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی؟ د اړیکو ډولونه کوم دي؟ د دې څېړنې په مطالعه به په عضوي مرکبونو کې د کیمیايي اړیکو په اړه معلومات حاصل کړئ.



1-1: د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژيکي سويي


کاربن د $1s^2 2s^2 2p^2$ الکتروني جوړښت لرونکی دی ،د هغه د مرکبونو شمیر ډیر او داهمیت لرونکي دی چې د عضوي کیمیا یوه مهمه برخه یې جوړه کړې ده. په 1880 کال کې د 1200 په شمیر عضوي مرکبونه او په 1998 کال له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاس ته راوړل شوي دي . په دې نوموړو شمیر د عضوي مرکبونو کې د کاربن اتومونه د C^{4+} د ایون په بڼه شتون نه لري ؛ خو په عمومي ډول کولای شو ووايو چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اتوم د تحریک په حالت دی او الکتروني جوړښت یې $1s^2 2s^1 2p^3$ دی.

د کاربن د اتوم د ولانسي الکترونونو د انرژۍ د سويي د ډاګرام په (1-1) شکل کې ښودل شوي دی :




1 - 1 شکل د کاربن د اتوم د انرژيکي سويي ډياګرام

په ځينو غیر عضوي مرکبونو کې کولای شئ چې کاربن اتوم د C^{4-} په بڼه وګورئ ؛ د بیلګې په ډول :



په عمومي ډول د کاربن اتومونه کو ولانسي اړیکه لري چې ډیر زیات اوږد زنجیرونه او یا لویې او کوچنۍ کړۍ یې جوړې کړې دي ،په دې زنجیرونو او یا کړیو کې د کاربن د اتومونو ترمنځ یوه ګونې ، دوه ګونې یا درې ګونې اړیکې لیدل کېږي ؛ خو دهغه 1.5 اړیکه هم لیدل شوې ده چې دا اړیکه کیدای شي په بنزین کې د ریزونانس په حالت کې ولیدل شي ، د کاربن - کاربن د اړیکې انرژي $E(C-C) = 360 \text{ KJoul/mol}$ ده.

طبیعي کاربن د دوو ایزوتوبونو $^{12}_6C$ او $^{13}_6C$ لرونکی دی چې په طبیعت کې د هغوی د خپریدو سلنه په ترتیب سره %98.89 او %0.11 ده؛ خو په طبیعت کې $^{14}_6C$ هم شته دی چې د اتومسفير په لوړو طبقو کې چې د لاندې هسته یي تعاملونو په پایله کې جوړېږي، شتون لري: $^{14}_7N + ^1_0n \rightarrow ^{14}_6C + ^1_1H$ د $^{14}_6C$ د نیم عمر اوږدوالی 5568 کاله دی او د $\bar{\beta}$ ذرو د وتلو په پایله کې په نایټروجن تبدیلېږي:



د ژوندیو موجوداتو په عضوي مرکبونو کې $^{14}_6C$ او $^{12}_6C$ د تعادل په حالت کې شتون لري او د هغو د تعادل نسبت $\frac{^{14}_6C}{^{12}_6C} = 10^{-12}$ او ثابت دی. که چیرې ژوندي موجودات چې په هغوی کې حیوانات او نباتات شامل دي ،له طبیعت



1-2: د: کاربن و لانس او د اړیکو جوړیدل:

(2-1) شکل دیووس جوہنست او دکارین فضایی جوہنست


هائڊروجن ، آڪسيجن ، نائٽروجن ، هلوجن اوڻور سره جوڙوي.

H			He														
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne										
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar										
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	112	113	114	115	116		

(1 - 1) جدول د عنصر وٺو دور هي جدول کي د کارين خالي.


کاربن کولای شي چې دیوې گونې ، دوه گونې او درې گونې اړیکو لرونکې وي ، چې په لاندې توگه روښانه کيږي :

څرنگه چې کاربن په خپل ولانسي قشري څلورو لاندني الکترونونو لري ؛ نو پر دې بنسټ د خپل اوکتیت د پوره کولو لپاره څلورو نورو الکترونونو ته اړتیا لري ، د ایټان (C_2H_6) په مالیکول کې د کاربن هر اټوم د کاربن د بل یو اټوم سره او د هایدروجن د درې اټومونو سره اړیکه لري. د کاربن د یو اټوم او د هایدروجن د یو اټوم ترمنځ یوه گونې اړیکه ترل شوې ده چې یوه ، یوه جوړه مشترک الکترونونه د هغوی ترمنځ شتون لري ، نجوړم پوهان په دې باور دي چې د زحل سطحه مایع ایټان جوړه کړي ده:



(1-3) شکل د زحل په سطحه کې د مایع ایټان شتون

سربریزه پر دې کاربن او نور عنصرونه او د هغوی له ډلې نایټروجن ، اکسیجن او سلفور کولای شي د نورو اټومونو سره د اوکتیت دفاعلي په پام کې نیولو سره له یوې جوړې الکترونونو څخه زیات ، دوه جوړې الکترونونه (څلور الکترونه) سره شریک او دوه گونې اړیکه جوړوي ؛ د ایټیلن دمالیکول په ترکیب کې دوه اټومه کاربن او څلور اټومه هایدروجن برخه لري چې د کاربن – کاربن د اټومونو ترمنځ اړیکه دوه گونې ده ، هارمون فورله ایټیلین په جوړوښتو کې په ځانگړې توگه په رومیانو کې شته دی چې د پخیدلو په وخت کې هغه ازادوي او د نورو رومیانو د پخیدلو لامل گرځي ؛ نو پر دې بنسټ په کره نه کې د رومیانو د پخیدلو لپاره د ایټیلین څخه گټه اخیستل کيږي :



(1-4) شکل رومي بانجن د ایټیلین سرچینه.

همدارنگه د کاربن دوه اټومونه کولای شي چې درې گونې اړیکه جوړه کړي او درې جوړې الکترونونه یو له بل سره شریک کړي ؛ دیباگي په ډول : د اسیټیلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ درې گونې اړیکه شتون لري ، د دې مرکب په مالیکول کې د کاربن دوه اټومونه او د هایدروجن دوه اټومونه برخه لري .


د کان پیرټنډي په څراغونو کې د کلسیم کار باید له تیرې څخه گټه اخستل کيږي ؛ داسې چې په کلسیم کار باید باندې اوبه ورزیاتوي د کار باید د جوړو د هایدرو لیز په پایله کې اسیټیلین تر لاسه کيږي .






1- 5) شکل دکانو د پیژندونکو اوکسی استیلین په خراغونو کې د استیلین د گاز کارول.

د کاربن د اتومونو د مهمو څانګړتیاوو څخه یو د زنځیر او تړلي زنځیر (کړۍ) جوړول دی چې په هغوی کې کاربن- کاربن اتومونه یو له بل سره اړیکه لري . لاندې فورمولونه په عضوي مرکبونو کې زنځیري او کپیز کاربنی اسکلیټېټېټي:



د نورو اتومونو ډلګه: د نایټروجن او اکسیجن د اتومونو پر خلاف ، د کاربن د اتومونو ډلګو پرله پسې والي د کاربن – کاربن د اړیکو د قوت د لږوالي لامل نشي کېدای .

په زنځیرونو او کپیزو کې د کاربن اتومونه کولای شي چې د کاربن د نورو اتومونو او نورو عناصرو نورو اتومونو سره دوه ګوني او درې ګوني اړیکې جوړې کړي ؛ دیلګې په ډول:



د کاربن د اتومونو د اړیکو د جوړېدو بیلابیلې طریقې د هغو مرکبونو او ډلو د زیاتوالي او شتون لامل ګرځېدلی دی.

مثال: د فارم الیدهايد (CH₂O) د مرکب د لیوس جوړښت ولیکئ.

حل: په لومړۍ سر کې د ولانسي الکټرونونو مجموعي شمیر محاسبه کړئ.

د هایدروجن هر اټوم یو ولانسي الکټرون لري ، نو د هغه په دوه اتومو کې ، دوه ولانسي الکټرونونه شته دي ؛ په همدې توګه د کاربن هر اټوم څلور ولانسي الکټرونونه او یو اټوم اکسیجن شپږ ولانسي الکټرونونه لري چې په دې مرکب کې ټول ډولس (12) ولانسي الکټرونونه شته دي ، د فارم الیدهايد مرکب د مالیکول د جوړوونکو اتومونو د ولانسي الکټرونونو

په پام کې نیولو سره، د دې مرکب د مالیکول تشکیلونکي اتومونه یو بل سره نژدې کېږي، دلته کاربن چې مرکزي اټوم دی، په منځ کې خالی لری، په دې صورت کې ولایسي الکټرونونه د دغو اتومونو یو له بل سره د نژدې کیدو لامل ګرځي او د لیویس قاعده تطبیق کېږي:



په پورتنی فورمول کې د لیکل شوو الکټرونونو شمیر 12 عدده او د ولایسي الکټرونونو شمیر هم د 12 عدده دی. کاربن دوه یو ګونې اړیکې او یوه دوه ګونې اړیکه لري او په مجموع کې څلور کولو لانت اړیکې ېې جوړې کړي دي. که چیرې اړیکې د یو خط په واسطه وښو، نو لاندې ساختماني فورمول حاصلېږي:



په دې فورمول کې دوه ګونې اړیکه د څلورو شریکو الکټرونونو ښودونکې ده چې د کاربن او اکسیجن ترمنځ تړل شوي ده؛ نو پر دې بنسټ او کټیت قاعده ترسره شوې ده.

مشق او تمرین وکړئ



د لاندې مالیکولونو د لیویس جوړښت رسم کړئ:

الف – کاربن ډای اکساید (CO_2) ، ب – کاربن تترا کلوراید (CCl_4) ج – امونیا (NH_3)

۳-۱. هایبریدایزیشن (Hybridization)

څرنگه چې په پورتنيو کرښو کې مطالعه شول، د کاربن اتومونه یوه ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې جوړولای شي؛ نو باید پوه شئ چې څرنگه دا اړیکې جوړېږي؟ د اوربیتالونو کوم ډولونه د هغوی په جوړېدو کې ونډه اخلي؟ د دې پورتنیو پوښتنو د ځوابونو په خاطر، هایبرید شوي اوربیتالونه مطالعه کوو.

په یوناني ژبه کې د هایبرید (Hybrid) کلمه د یوې د اختلاف په معناه؛ یعنې هغه نسل چې د دوو بیلابیلو نسلونو څخه حاصل شوي دی، د امتزاج یا ګډوډ کیدو مفهوم رسوي، په دې ځای کې د دوو یا څو بیلابیلو اتومونو د اوربیتالونو د اختلاف څخه منظور دای چې دوه یا څو نوي هایبریدي اوربیتالونه منځته راوړي.


د کیمیايي عنصرونو د اتومونو ولایسي الکټرونونه کولای شي چې په s ، p ، او d اوربیتالونو کې شتون ولري؛ نو په دې صورت کې ټول نوموړي اوربیتالونه یو شان ارزښت نه لري. او د هغوی اړیکې هم د یو شان ارزښت څخه برخمنې نه دي؛ لاکن څیړنو په ثبوت رسولې دي چې په مالیکولونو کې د هغوی مرکزي اتومونه د بیلابیلو ولایسي الکټرونونو (s ، p ، d ،) لرونکي دي او د اړیکو له کبله یو ټول ارزښت لري، دا مطلب د علماد هریو Cleyster او Pamling په واسطه روښانه شوی دی، نوموړو علماد وړاندوینه کړې ده: هغه اوربیتالونه چې د لږ ژرۍ له کبله ډیر



اختلاف ونه لري او په عين اصلی قشر کې د لومړنيو په وروستيو قشرونو کې ځای لري، هغوی د لومړنيو شمېرو سره سم يو له بل سره يوځای Hybridization کېږي او د خپلو لومړنيو شمېرو په اندازه هيليريد شوي اوربیتالونه توپليږي چې په يوشان اثر کې سطحه کې شتون لري او د عين الکتروني وړيځې جوړښت لرونکي دي، د اوربیتالونه د اړيکې د جوړېدو په لور کش او د هغوی ننوتل اعظمي وي، د اړيکو د جوړېدو زمينه مساعديږي. د لومړي اوربیتالونو د هيليريدښتن کيدو په پيل کې يو اندازه انرژي په مصرف رسېدلې ده، پر دې بنسټ داسې اوربیتالونه بې ثباته په نظر راځي؛ خو د اړيکې د جوړېدو په وخت کې دا انرژي له لاسه ورکوي او اړونده ثبات حاصلوي.

که څه هم د کاربن لومړي اړيکې دوه طاقه الکترونونه په خپل ولاسي قشر کې لري؛ خو څلور اړيکې د هيليدو جن د لومړنو سره تړلې شي؛ په دې معنا چې د کاربن لومړ خپل څلور نیم وک شوي اوربیتالونه د اړيکو په جوړېدو کې د هيليدو جن د لومړ سره په کاروي، د کاربن د څلورو اړيکو د جوړېدو د روښانه کولو لپاره د اړيکو د جوړېدو تيوري ښکاره کوي چې د کاربن څلور ولاسي الکترونونه چې په $(2s, 2p)$ اوربیتالونو کې شتون لري، يو بل سره مخلوط شوي او د څلورو الکتروني اوربیتالونو د جوړېدو لامل شوي کوم چې د عين شکل او انرژي لرونکي دي.


sp^3 هايبريديزيشن: د کاربن لومړنه په مسبوغ هيليدو کاربنونو کې دا ډول هايبريديزيشن لري او داسې منځ ته راځي چې د s يو اوربیتال او د p درې اوربیتالونه د انرژي د جنب په پايله کې يو له بل سره مخلوطېږي او د sp^3 څلور هايبريد شوي اوربیتالونه جوړوي چې څلور وچه راسونونه مخامخ دي او د هغوی تر منځ زاويه 109.5° درجې ده، د هايبريديزيشن کيدای شي چې په CH_4 ، CCl_4 او په نورو ماليکولونو کې ويلل شي په sp^3 هايبريديزيشن کې د s برخه $\frac{1}{4}$ او د p برخه $\frac{3}{4}$ ده لکه:



(1-6) شکل sp^3 هايبريد

د هايبريديزيشن ډولونو د ډيرو معلومو د لاس ته راوړلو لپاره د CH_4 جوړښت په تفصيل سره مطالعه کوو. په مېتان کې د اړيکې جوړېدل د $C-H$ د څلورو يوشان اړيکو دمخه راتللو او د تتراهيدرال (tetrahedral) د جوړېدو لامل دهغه په ماليکول کې کېږي. د کاربن په لومړ کې د ولاسي قشر الکتروني ترتيب، تتراهيدرال او ولاسي زاويې په لاندې شکل کې ښودل شوي دي:






(1-7) شکل د کاربن د اتوم SP^3 هایدريد او د میتان د مالیکول جوړیدل

تاسو مخکې د هیرید اوریتال شکل لیدلی دی او د کاربن د اتوم د هستې د چاپیریال په فضا کې مو د SP^3 د څلورو اوریتالونو د څلې په اړه معلومات تر لاسه کړي دي او مو لیدل چې څلور هیرید اوریتالونه د تتر اهلیدرال څلور کنجونه چې د اوریتالونو د منځ زانویه 109.4° ده، ځای لري. د sp^3 هایدريد اوریتالونه د اوریتالونو د اعظمي جلاکیدلو لامل کېږي او دا اړیکې یو له بل څخه اعظمي فاصله لري. کله چې د هایدروجن د څلورو اتومونو د $1s$ اوریتالونه د کاربن د څلورو sp^3 اوریتالونو سره نېغ نېغ ننوځي، د تتر اهلیدرال یو مالیکول د $C-H$ څلورو معادلو اړیکو (شکل 1-7) سره تشکیلېږي چې د CH_4 د مالیکول جوړښت سره کوم چې په تجربه ثابت شوي دي، سمون لري.

1-7 شکل د sp^3 د اوریتالونو د نېغ نېغ ننوتل د هایدروجن د اتومونو د $1s$ د څلورو اوریتالونو سره او د CH_4 تتر اهلیدرال شکل ښیي او د sp^3 هایدريدیزیشن کارونه د نورو عضوي او غیر عضوي مرکبونو د تشریح لپاره؛ لکه: په NH_3 او H_2O کې نورو کې روښانه کوی.

د ایټان C_2H_6 په جوړښت کې sp^3 د هایدريدیزیشن دروښانه کولو لپاره لاندې فعالیت ترسره کوی:

فعالیت:



په ایټان کې د اړیکې جوړیدل
مواد او د اړتیا وسامان: یو سیټ د مالیکولونو مولډونه

ناسی په دې فعالیت کې د ایټان د مالیکول (C_2H_6) د لیویس جوړښت په لاندې شکل کې وگورئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ:

شکل د ایټان د هایدريد شوی اوریتالونو مستقیم تداخل.

- 1- د کاربن د هر اتوم شلو خواګې د اړیکو شمیر څو دی؟
- 2- د کاربن د هر اتوم هیریدایزیشن څه ډول دی؟



- 3- د اتومونو درې اړخیز ترتیت د کاربن د هر اټوم په شاوخوا کې په څه ډول دی؟
- 4- د ایټان یو درې لوري لرونکې مودل جوړکړئ؟
- 5- دوه اوربیتالونه چې د تماس په اثر یې په ایټان کې د کاربن – کاربن داتومونو ترمنځ اړیکه منځته راغلې ده، څه نومېږي؟


د کاربن هر اټوم څلور اړیکې لري چې د نورو اتومونو سره یې تړلې دی او د تیترا هایدرال شکل یې جوړ کړی دی. د کاربن هر اټوم د څلورو اړیکو د جوړېدو لپاره، د sp^3 څلور هایدريد اوربیتالونه کارولي دي او د هغوی د نیغو ننوتلو له امله د نورو اتومونو د اوربیتالونو سره د سگما (σ) اړیکه جوړېږي چې د کاربن د هر اټوم په شاوخوا د تیترا هایدرال په شکل د اړیکو د جوړېدو لامل کېږي. په دې هکله پوښتنه پیل کيږي چې یا د کاربن اټوم د هایدريدیزیشن بل ډول هم د اړیکو په جوړېدو کې کارولی شي؟ دا پوښتنه لاندې توضیحات روښانه کوي:

د sp^2 هایدريدیزیشن: په دې ډول هایدريد کې د s یو اوربیتال او د p دوه اوربیتالونه یو د بل سره امتزاج او په پایله کې د sp^2 درې هایدريد شوي اوربیتالونه جوړوي، دا اوربیتالونه په یوه سطحه کې وي چې د ډبرڅخه په sp^2 هر اوربیتال کې $\frac{1}{3}$ او د پرخه $\frac{2}{3}$ ده، د دې اوربیتالونو ترمنځ ولاسي ټولیه 120° درجې ده.



(9-1) شکل د sp^2 هایدريد

د کاربن اتومونه په غیر مشبوع هایدروکاربنونو کې (د ایټلین فامیل کې) په مالیکول کې د sp^2 هایدريد لري. د BF_3 په مالیکول کې بورون sp^2 هایدريد لري:




(10-1) شکل په BF_3 اټوم کې sp^2 هایدريد.

په هایدريدیزیشن کې نیم ډک شوي اویا بشپړ ډک شوي اوربیتالونه برخه اخلي او مالیکول اوربیتال جوړوي؛ د په هایدريدیزیشن کې نه یوازې د s او p اوربیتالونه برخه اخلي؛ بلکې د d او f اوربیتالونه هم برخه لري. د کاربن په مرکبونو کې د sp^2 هایدريدیزیشن چې د دوه ګوني اړیکې د جوړېدو لامل کېږي، د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري.



ساده عضوي ماليکول چې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ يې دوه گونې اړيکه ده ، د ايتلين مرکب دی چې دهغه ليويس جوړښت په لاندې بڼه دی :



(1-1) د ايتلين په ماليکول کې د ليويس جوړښت.

تجربي ښيي چې د ايتلين ماليکول مسطحه جوړښت لري او په هغه کې د اړيکو ترمنځ زاويه د 120° درجو په شاوخوا کې ده .


د ايتلين په مرکب کې د کاربن د دوو اتومونو په منځ کې څه ډول هايبريډيزشن شته دی ؟
دايتلين د ليويس په جوړښت کې ليډل کيږي چې د کاربن يو اتوم د کاربن له بل اتوم سره اړيکه جوړه کړېده ، د کاربن د درې هايبريډ شوي اوربیتالونو د اړيکو د جوړېدو لپاره ، ددی کاربنونو هر اتوم د درې نورو اتومونو سره چې د هغه په شاوخوا (د کاربن د يو اتوم او د هايډروجن د دوو اتومو سره) شتون لري ، ضرورت دی ؛ نو له دې کبله د sp^2 هايبريډيزشن د جوړېدو لامل گرځي .

د sp^2 د اوربیتالونو فضايي شکل د کاربن د اتوم په شاوخوا کې څه ډول دی ؟ درې واړه نوموړي اوربیتالونه په يو ه سطحه کې شتون لري او د هغو ترمنځ زاوې يې 120° درجې دي ، نو د P اوربیتال نه هايبريډيزشن شوي اوربیتال په عمودي بڼه د دوی په سطحه کې شتون لري چې په (1-12) شکل کې ښودل شوي دي :



(1-12) شکل د sp^2 درې هايبريډ اوربیتال د ايتلين د مرکب د اړيکې جوړېدل.

د ايتلين په مرکب کې د اړيکو دجوړېدو لپاره د کاربن دوه sp^2 اوربیتال هريو د هايډروجن د دوه اتومو سره اړيکې ټينگوي او د $\text{C}-\text{H}$ دوه اړيکې جوړوي، د کاربن په هر اتوم کې د sp^2 پاڼې شوي يو هايبريډ اوربیتال يو د بل سره ښخ ورتگ کوي او د کاربن د دوو اتومونو په منځ کې د σ اړيکې د جوړېدو لامل گرځي او څرنگه چې تاسې مخکې د ايتلين د اړيکو په جوړېدو کې وليدل، دويمه اړيکه د کاربن د دوو اتومونو په منځ کې د هغوی P نه هايبريډ شوو اوربیتالونو دڅنگ پرڅنگ ننوتې له امله منځته راځي چې په (1-13) شکل کې ښودل شوي دي .




(1-13): شکل د ايتلين په مرکب کې له اوربیتالونو څخه د گټې اخيستنې د اړيکو جوړېدل.



D د اوربیتالونو د جاني نښتې څخه د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ اړيکه منځته راځي چې د π (د اړيکې په نوم يا ډيرې) د کاربن د دوه اتومونو دوه غیر هلیبرید شوو P اوربیتالونو الکترونونه د مالیکول په پورته او ښکته برخه باندې یو د بل سره شریک او د π اړيکه جوړوي تل په یوه دوه گونې اړيکه کې یوه د σ او یوه د π اړيکه شامله ده د π اړيکه د P غیر هلیبرید شوي اوربیتالونو جاني نښتې څخه تشکیل شوې ده، (1 - 13) شکل و گوري.

فکر وکړي
ستاسې له نظر د σ اړيکه قوي او مستحکمه ده او یا داچې د π اړيکه قوي ده ؟ تشریح یې کړۍ .

sp هلیبرید: په پورتنیو لوستونو کې مو مطالعه کړ چې څرنگه کولای شو چې د **sp** هلیبریزیشن په واسطې سره د کاربن د دوو اتومونو په منځ کې گونې اړيکه روښانه کړو ، اوس به یې زده کوو چې څرنگه د **sp** هلیبریزیشن څخه په ګټه اخېستلو کولای شو چې د کاربن د دوو اتومونو په منځ کې درې گونې اړيکه څرګنده کړو ؛ په دې ډول هلیبرید کې یو د s اوربیتال او یو د P اوربیتال یو د بل سره ګلوټه کیږي ؛ په پایله کې د **sp** هلیبرید اوربیتالونه (*sp-hybrid*) تشکیلېږي چې د اړیکو ولانسي زوايه 180° درجې ده ، د هغوی بېلګه کېدای شي چې د Hg, Cd, Zn, Be عنصرونو **sp** هلیبرید په هلو چنډونو مرکبونو کې وړاندې شي . د تجربې لاس ته راوړنې ښيي چې د Hg, Cd, Zn, Be هلیبرید کې د s او P برخه هریو $\frac{1}{2}$ د هغوی مرکبونه خطي هندسي جوړښت لري ،په **sp** هلیبرید کې د s او P برخه هریو $\frac{1}{2}$ ده .




(14-1) شکل د **sp** هلیبرید:

د **sp** هلیبرید او درې گونې اړیکې جوړیدل د استیلین (C_2H_2) په مرکب کې چې یو ډیر ساده عضوي مرکب دی، د هغه د لیویس د جوړښت سره په لاندې ډول مطالعه کوو :



(15-1) شکل د استیلین مرکب د هغه د لیویس د جوړښت سره.

څرنگه چې په شکل کې موولیدل ، استیلین یو خطي مالیکول دی چې د هغه د اړیکو زاویه د 180° درجه ده . کوم ډول هلیبریزیشن د استیلین د مرکب د کاربن په اتومونو کې شتون لري ؟ د استیلین په مرکب کې د کاربن هر اتوم دوو هلیبرید اوربیتالونو ته اړتیا لري چې په خپل منځ کې یې د هایدروجن د اتومونو سره اړیکې جوړې کړي .



شکل په استیلین کې د کاربن د دوو اتومو sp هایلرید

په 1-16 شکل کې د کاربن په اټوم کې د اوربیتالونو ځایونه او د sp هایلرید ایزیشن لیدل کېږي ، دلته د sp دوه اوربیتالونه خطي حالت لري او 180° درجه زاویه یې په خپل منځ کې جوړه کړې ده ؛ په داسې حال کې چې د کاربن د اتومونو دوه P نه هایلرید ایزیشن شوي اوربیتالونه یو له بل سره موازي او د هغه خط د پاسه عمود ولاړ دي کوم چې د sp دوه اوربیتالونه یې سره نښلوي دي ، د استیلین د جوړیدو لپاره د کاربن د هر اټوم یو اوربیتال د هایدروجن د هر اټوم د sp اوربیتال د هایدروجن د هر اټوم د $1s$ اوربیتالو سره نښته نښته تړسره کوي چې د کاربن او هایدروجن $C-H$ اړیکه جوړوي ، د sp دوه پاتې اوربیتالونه د کاربن په دوو اتومونو کې نښته نښته کوي چې د σ اړیکه د کاربن د دوو اتومونو په منځ کې جوړېږي او د کاربن د اتومونو د هریو دوه الکترونونه چې د P په غیر هایلرید شویو اوربیتالونو کې ځای لري ، دا اوربیتالونه یو له بل سره څنګ پر څنګ نښته کوي ؛ نو د استیلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اتومونو تر منځ د π دوه اړیکې منځته راځي چې په لاندې شکل کې ښودل شوي دي:



شکل په استیلین کې د SP د هایلرید شویو اوربیتالونو څخه ګټه اخیستنه.

فعالیت



د مرکبونو مالیکولي جوړښت او دهغوی د رسمولو په پام کې نیولو سره ، د اویو د مالیکول د اکسیجن هایلرید ایزیشن ، د 1 او 4 نمبر کاربن د اتومونو هایلرید ایزیشن د $CH_3-C^1H^2=C^3H^4$ مرکب په مالیکول کې وټاکئ .



د لومړني څپرکي لنډيز

- عضوي کيميا د کاربن ، هايډروجن دمرکبونو او د هغو د مشتقاتو څخه بحث کوي .
- کاربن داتوم الکتروني جوړښت $1s^2 2s^2 2p^2$ دی چې د کاربن اټوم د هغولو په حالت کې $1s^2 2s^2 2p^3$ الکتروني جوړښت لري .
- د اته الکتروني (octate) حالت د پوره کولو لپاره ، د کاربن اټوم د خپل ولاسي قشر څلور الکترونونه د نورو اټومونو سره د کاربن د نورو اټومونو په شمول گډوي ، په پايله کې د کاربن ولاس څلور دی
- د کاربن اټومونه کولای شي يو گونې ، دوه گونې او درې گونې اړيکې جوړوي کړي .
- Hybridization د دوو يا څو بيلا بيلو اټومو د اوربیتالونو د گډوډ څخه عبارت دی چې دوه اړيا څو نوي هايبريډي اوربیتالونه منځته راوړي .
- sp^3 هايبريډيزيشن : د کاربن اټومونه په مشبوع هايډروکاربونونو کې دا ډول هايبريډيزيشن لري او داسې منځ ته راځي چې د s يو اوربیتال او د p درې اوربیتالونو د انرژي د جذب په پايله کې يو د بل سره مخلوطيږي او د sp^3 څلور هايبريډ شوي اوربیتالونه جوړوي .
- sp^2 هايبريډيزيشن : په دې ډول هايبريډ کې د s يو اوربیتال او د p دوه اوربیتالونه يو د بل سره امتزاج او په پايله کې د sp^2 درې هايبريډ شوي اوربیتالونه جوړوي .
- sp هايبريډ : په دې ډول هايبريډ کې يو د s اوربیتال او يو د p اوربیتال يو د بل سره گډوډ کيږي ؛ په پايله کې د sp هايبريډ اوربیتالونه ($sp - hybrid$) تشکيلېږي
- د سگما اړيکه : که چيرې د الکتروني ورځني پوښتن د هغه خط په اوږدو (امتداد) چې د دوو اټومونو هستې سره نښلوي ، ترسره شي ؛ يعنې د اوربیتالونو ننوتل لوړ وي ، اړيکه کلکه ده چې د (σ) سگما اړيکې په نوم يادېږي ،
- د π اړيکه : په ماليکول کې د دوو اټومونو په منځ کې اړيکه کېدای شي دوه گونې يا درې گونې وي ، دا ډول اړيکې له يوې جوړې څخه د زياتو الکترونونو په واسطه جوړېږي ؛ د بيلگې په ډول : د اکسيجن په ماليکول کې د اکسيجن د دوو اټومونو ترمنځ اړيکه دوه گونې او د نايټروجن په ماليکول کې د نايټروجن د دوو اټومونو تر

منځ اړيکه درې گونې ده. که چېرې د اټومي اوربیتالونو ننوتل څنگ پر څنگ وي؛ یعنې د P د اوربیتالونو د الکتروني روښنې پوښښ څنگ پر څنگ وي او د X د محور د پاسه ځای ونيسي، دا منځ ته راغلې اړيکه د π اړيکې په نوم یادېږي.

• دوه گونې اړيکه د یوې سگما (σ) اړيکې او د یوې پای π اړيکې څخه جوړه شوې ده او درې گونې اړيکه د یو سگما (σ) اړيکه او دوه د (π) پای اړیکو څخه جوړه شوې ده.

د لومړي څپرکي پوښتي څلور خوا به پوښتي

- 1- د کاربن اټوم دهڅې په حالت شتون لري او د----- الکتروني جوړښت لري .
الف - $1s^2 2s^2 2p^2$ ب - $1s^2 2s^1 2p^3$ ج - $1s^2 2s^1 2p^2$ د - $1s^2 2s^1 2p^2$
- 2- د $^{14}_6C$ د نیم عمر اوږدوالی----- کاله دی او د----- د وتلو په پایله کې په نایټروجن بدلېږي .
الف - $5568, +\beta$ ب - $5580, \gamma$ ج - $5580, \alpha$
- 3- په تېولو عضوي مرکبونو کې د کاربن هر اټوم----- گډې اړیکې د کاربن د نورو اټومونو سره او یاد اچې د نورو عنصرونو د اټومونو سره؛ لکه: هایډروجن، اکسیجن، نایټروجن او هلوجن سره جوړوي .
الف - دوه اړیکې، ب - درې اړیکې، ج - څلور اړیکې د - یوه اړیکه
- 4- کاربن کولای شي----- اړیکې ولري .
الف - یوه گونې، ب - دوه گونې، ج - درې گونې، د - درې واړه څو اړونه سم دي
- 5- د کاربن د هر اټوم او د هایډروجن د هر اټوم په منځ کې یوه اړیکه موجود ده چې----- مشترک الکترونونه دهغه په منځ کې شتون لري.
الف - یوه، یوه جوړه، ب - دوه، دوه جوړې، ج - درې، درې جوړې د - څلور جوړې
- 6- Hybrid د دوو یا څو بیلابیلو----- د اختلاف څخه عبارت دی چې دوه او یا څو نوي----- اوربیتالونه منځته راوړي .
الف - اټومي اوربیتال، هلیبرېلې، ب- مالیکول اوربیتال، هلیبرېلې، ج- الف اوب دواړه سم دي، د - هېڅ یو
- 7- که چېرې د P یو اوربیتال د P درې اوربیتالونو سره د انرژي د جذب په پایله کې مختلط شي، کوم هلیبرېلې اوربیتال جوړوي.

الف - sp ، ب - sp^4 ، ج - sp^2 ، د - sp^3

8- د sp^2 برخه د sp^2 په هر اوربیتال کې د ----- او دې درې اوربیتالونو په منځ کې ولاسي زاویه -----

درجې ده .

الف - $\frac{1}{3}$ و 120° ب - $\frac{2}{3}$ و 120° ج - $\frac{2}{3}$ و 180° د - $\frac{4}{5}$ و 180°

9- که چېرې د s یو اوربیتال د p د یو اوربیتال سره گډه شي، کوم هلیبرید لاس ته راځي ؟

الف - sp ، ب - sp^2 ، ج - sp^3 ، د - sp^d

10- که چېرې د اوربیتالونو نښتلیږ او لوړ وي، اړیکه کلکه او مستحکمه ده چې د ----- په نوم یادېږي .

الف - سگما ب - σ ج - الف و ب د - هیچکدام


11- به د $CH \equiv CH - C \equiv CH$ په $CH = CH = CH = CH$ د π څو اړیکې شتون لري

الف - درې ب - څلور ج - پنځه د - دو

تشریحي پوښتنې

1- ولې مالیکولونه د CH_3 او C_2H_5 د فورمولونو سره شتون نه لري ؟


2- د هایدروجن څو ائومه د لاندې کاربنې اسکلیټ د ائومونو سره ترکیب کیدای شي ؟



3- د ایتیل الیهاید (CH_3CHO) خطي اړیکې او د لیویس جوړښت رسم کړئ .

4- د برومین ($CH_3CH = CH_2$) د خطي اړیکو جوړښت، هلیبریدایزیشن او د هغه د اړیکو زاویې رسم کړئ.

5- د کاربن د ائوم هلیبریدایزیشن د لاندې مرکبونو په مالیکولونو کې وټاکئ .




6- له هلیبریدایزیشن څخه په گټه اخیستنه د CCl_4 په مرکب کې د اړیکو جوړیدل روښانه کړئ.

7- د لاندې مرکبونو په مالیکول کې د مرکزي ائومونو هلیبریدایزیشن روښانه کړئ :



8- په لاندې مالیکولونو کې به د اړیکو زاویه په تقریبي توګه خوړی؟



9- د اسپرن د مالیکول مودل چې لاندې لیکل شوی دی، په غور سره وګورئ، د هغه مالیکولي فورمول د خطي اړیکو په بنسټ رسم او د کاربن د اټومونو هلیبریدایزیشن په هغه کې وټاکئ.

(د اسپرن په مودل کې نصواري غونډاري د کاربن اټوم، سره غونډاري د اکسیجن اټوم او سور سپین ته ورته

غونډاري د هایدروجن اټومونه ښيي.

د اسپرن مالیکول




10- په لاندې مرکبونو کې خو د سګما اړیکې او خو د پای π اړیکې شتون لري؟ د هغوی د لیویس جوړښت

ولیکې اوهم د کاربن د ټولو اټومونو هلیبریدایزیشن روښانه کړئ

الف - 1, 3-butadiene ب 1-pentyne ج - 1, 2-propadiene

د مالیکول جوړښت او فورمولونه



دکېمیايي مرکبونو مالیکولونه د هغو له ډلو څخه دعضوي مرکبونو مالیکولونه د ځانګړو اړوند و جوړښتونو لرونکي دي او دعضرونو له اتومونو څخه په بیلا بیلو شکلونو او یا بیلابیلو قوو په تشکیل شوي دي.


د مرکبونو مالیکولونه دیلابیلو عنصرونو داتومونو د اړیکو له لارې په بیلابیلو شکلونو لیدل کېږي باید پوه شو چې مالیکول څه شی دی او د مالیکولونو جوړښت څه ډول دي؟ د مرکبونو مالیکولونه د کومو سمبولونو په واسطه ښودل کېږي؟ فورمول څه شی دي او د مالیکول کومه ځانګړتیا ښیي؟ فورمولونه په څرغوله دي؟ او څه رنگه لیکل کېږي؟ ایزومیري څه شی دي او د ایزومیريو مفهوم څرنگه روښانه کولای شو؟ د دې څپرکي په لوستلو کېدای شي چې پورتنیو پوښتنو ته ځوابونه وړاندې شي.



۲-۱: مالیکولي فورمول

تل یو کیمیايي مرکب دهغه دتشیکل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغو دنسېتي ضریبونو سره چې دسټیکېو مترې (Stoichiometry) ضریبونو په نوم هم یادېږي ، بنودل کېږي؛ دیلگې په ډول: NaCl د خوړو دمالگې بنودونکی او H_2O د اوبو بنودونکی دي چې دتشیکل کوونکو عنصرونو د سمبولونو دترتیب لاره د مرکبونو د نسېتي ضریبونو سره د مالیکولي فورمول په نوم یادېږي . یو مالیکول اوبه د دوو اتومو هایډروجنونو او یو اتوم اکسیجن څخه جوړې شوې دي، په دې بنسټ د اوبو مالیکولي فورمول H_2O دی

مالیکولي فورمول کېدای شي د کیمیايي تجزيې په واسطه وټاکل شي . د کیمیايي فورمولونو بل ډول د تجزيې فورمول څخه عبارت دی، په دې فورمول کې دیلایللو عنصرونو د اټومونو شمیر په یو مرکب کې بنودل کېږي، د تجزيې کلمه په دې ځای کې په دې معناه چې وړاندې شوی فورمول یوازې دیلنې او اندازه کولو پر بنسټ یعنې دتوصیفې او مقدارې تحلیل په واسطه ټاکل شوی دي، دگلوکوژمالیکول د C_6 اتومو کاربن ، 12 اتومونو هایډروجن او 6 اتومو اکسیجن څخه جوړ شوی دی او تجزيې فورمول یې CH_2O دی چې یوازې دکاربن د اټومونو ، د هایډروجن د اټومونو او اکسیجن د اټومونو نسبت دگلوکوژ په مالیکول کې ښیي ، څرنگه چې دا نسبتونه تل ډیروي مادي پورساده شکل ښکاره کوي؛ نو له دې کبله دا فورمول د ساده فورمول په نوم هم یا د پیري . په لاندې شکل کې دگلوکوژفورمولونه په خوساده شکلونو بنودل شوي دي:



(۱ - ۲) : شکل د گلوکوژ فورمولونه

تجزيې فورمولونه

په لاندې جدول کې دتجزيې او مالیکولي فورمولونو دیلگې وړاندې شوي دي.

(۱ - ۲) : جدول دتجزيې او مالیکولي فورمولونو دیلگې

مرکب	ساده فورمول	مالیکولي فورمول	مالیکولي کتنه	د بنودلو طرز
فارم الډیهایډ	CH_2O	CH_2O	30.03	
اسیتیک اسید	CH_2O	C_2H_4O	60.06	
گلوکوژ	CH_2O	$C_6H_{12}O_6$	180	

د دې لپاره چې د مرکبو ساده او ماليکولي فورمولونه مو په سمه توګه لیکلي اوموندلي وي؛ ښايي چې لومړی د مرکب توصیفي او مقادري تحليل باندې پوه شو، د مرکب توصیفي او مقادري تحليل په پوهیدلو سره کېدای شي چې هغه تجربی فورمول دلاندې موادو سره سم لیکلی اوتر لاسه شي.

1- هر عنصر مقادري کمیته چې دانالیز (د تجزیې) په واسطه لاس ته راغلي دي په مول بې بدلو و .
 2- د مرکب د تشکیل کونکو د هر عنصر د مولونو اندازه چې د لومړۍ مادې سره سم لاس ته راغلي ده، په پوره پام سره ګورو او دهغوی کوچنی کمیته په ګوته کوو، وروسته له دې دغو بنښنکو مرکب د ماليکول د تشکیل کونکو عنصرونو ټول مولی کمیته په همدې کوچني مولی کمیته باندې تقسیموو؛ نو رقمونه به پرته له قیاسي واحدو څخه لاس ته راشي .

3- هغه کمیته چې د (2) مادې سره سم حاصلېږي، په پاملرنې سره د مطالعې لاندې نيسو ، که چېرې نام عددونه وي د مرکب د ماليکول د تشکیل کونکو عنصر ونودونو ضربونه په ساده فورمول کې دي او که نام رقمونه نه وي ، هغوی د روندا ف په طریقه او یا د نام د ټیر کو چني عدد په ضربولو سره په نامو عددونو تبدیلوو، دا نام عددونه د عنصر ونو لومړني نسبت په ساده فورمول کې ښيي؛ د عنصرونو نسبتی رقمونه دهالیکولي فورمول دسم لیکلو د لارو په پام کې نیولو سره دکېمیایي عنصرونو د سمبولونو سره یوځای کوو چې ساده فورمول حاصلېږي.

4- د مرکب د ماليکولي فورمول د صحیح د لیکلو په غرض د توصیفي او مقادري تحليل سره بیده د مرکب ماليکول کتله هم معلومه وي، په دې بنسټ د توصیفي او مقادري تحليل په پام کې نیولو سره ساده فورمول ډېورتینو موادو سره سم لاس ته راوړو او د مطلوب مرکب ماليکولي کتله د ساده فورمول نسبتی ماليکولي کتلې باندې تقسیم اوتام عدد به حاصل شي چې دا عدد د عنصرونو په نسبت په ساده فورمول کې ضرور اوپه پایله کې د مرکب ماليکول فورمول حاصلېږي

$$X = \frac{\text{فورمولي کتله}}{\text{د تجربی فورمول کتله}}$$

لومړی مثال: 7.2g

یو عضوي مرکب ته دمس داکساید سره په ازمایښتي فل کې تو دوخه ورکړ شیده چې په پایله کې 10.52 کاربن ډای اکساید او 4.32 داوبو براس تر لاسه شوی دي، که چېرې د 1.8 په اندازه په 50g اوبو کې حل شي، لاس ته راغلی محلول 0.372g کې کنگل کېږي؛ دنوموړي مرکب ساده او ترکیبي فورمول ولیکۍ.

حل:

$$\begin{array}{rcl} 10.52\text{g CO}_2 & - & 7.2\text{g} \\ X & - & 100 \\ X = \frac{10.52\text{g} \cdot 100}{7.3\text{g}} = 146.11\% \\ \left. \begin{array}{l} 44\text{gCO}_2 - 12\text{gC} \\ 146.11\text{gCO}_2 - X \end{array} \right\} X = \frac{146.11\text{gCO}_2 \cdot 12\text{gC}}{44\text{CO}_2} = 40\% \text{C} \end{array}$$



$$\begin{array}{rcl} 4.32\text{g H}_2\text{O} & - & 7.2\text{g} \\ \text{X} & - & 100 \\ \text{X} = \frac{4.32\text{g} \cdot 100}{7.3\text{g}} & = & 59.2\% \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{rcl} 18\text{gH}_2\text{O} & - & 2\text{gH} \\ 59.2\text{gH}_2\text{O} - \text{X} & & \end{array} \right\} \text{X} = \frac{59.2\text{gH}_2\text{O} \cdot 2\text{gH}}{18\text{H}_2\text{O}} = 7\% \text{H}$$

$$\begin{array}{rcl} 6.6\text{g H}_2\text{O} & - & 7.2\text{g} \\ \text{X} & - & 100 \end{array}$$

$$\text{X} = \frac{6.6\text{g} \cdot 100}{7.3\text{g}} = 59.2\%$$

$$\left. \begin{array}{rcl} 18\text{gH}_2\text{O} & - & 16\text{gO} \\ 59.2\text{gH}_2\text{O} - \text{X} & & \end{array} \right\} \text{X} = \frac{59.2\text{gH}_2\text{O} \cdot 16\text{gO}}{18\text{H}_2\text{O}} = 52.6\% \text{O}$$

$$\text{C} = 40\text{g}/12\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 3.33\text{mol}$$


$$\text{H} = 7\text{g}/1\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 7\text{mol}$$

$$\text{O} = 52.6\text{g}/16\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 3.3\text{mol}$$

$$\text{C} = 3.33\text{mol}/3.33\text{mol} = 1$$

$$\text{H} = 7\text{mol}/3.33\text{mol} = 2$$

$$\text{O} = 3.3\text{mol}/3.33\text{mol} = 1$$



ساده فرمول

په یو لسم ټولګي کې مو زده کړي چې $\frac{m \cdot 1000\text{g} \cdot \text{molal}}{M \cdot m'}$ د $\Delta t = K \cdot C_m$ نېټه:

$$M = K \cdot \frac{m \cdot 1000\text{g} \cdot \text{molal}}{\Delta t \cdot m'}$$

$$M = 1.85^\circ \frac{\text{CKg}}{\text{mol}} \cdot \frac{1.8\text{g} \cdot 1000\text{g} \cdot \text{molal}}{0.37^\circ \cdot 50\text{g}} = 180$$

$$M = 180$$

$$M(\text{CH}_2\text{O})_n = 180$$

$$(12 + 1 \cdot 2 + 16)n = 180$$

$$(30)n = 180 \Rightarrow n = \frac{180}{30} = 6 \Rightarrow n = 6$$





مشق او تمرین و گری

دېرعضوي مرکب توصيفي اومقداري تحليل بنسټي چې دهغه په جوړښت کې $6g$ کاربن او $2g$ هایدروجن شامل دي، دهغه ساده فورمول وليکئ. که چېرې دهغه ماليکولي کتله 72 وي، ماليکولي فورمول يې پيدا کړئ.

دالکانونو ماليکولي فورمول

ماليکولي فورمول، مرکبه په کېميایي ژبه معرفي کوي فورمول نه يوازې په ماليکول کې داتومونو ډله بنسټي؛ بلکې داتومونوشمير اوډولونه هم بنسټي، ميتان دالکان هایدروکاربن ډير ساده مرکب دي اودالکانونو فورموله مرکبه دايان (C_2H_6) او پروپان (C_3H_8) دي C_nH_{2n+2} يا کولاي شئ په دهغه الکان فورمول چې دخپلورو کاربنونولرونکي وي وليکئ؟ د دې لپاره د لومړي الکانو دفورمول څخه کومک واخلئ دکاربن اوهایدروجن داتومونو دشمير ترمنځ اړيکه دهغوي په هريوکې پيدا کړئ، په دې فورمول کې n دکاربن داتومونوشمير په هر الکان کې بنسټي.

جدول ($3 - 2$) د الکانونو عمومي فورمول ټاکل C_nH_{2n+2}

CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}
شمير	شمير $C=2$	شمير $C=3$	شمير $C=4$
شمير $H=2(1)+2=4$	شمير $H=2(2)+2=6$	شمير $H=2(3)+2=8$	شمير $H=2(4)+2=10$

فعاليت

د دغو الکانو ماليکولي فورمولونه پيدا کړئ کوم چې دکاربن اتومونوشمير يې په لاندې جدول کې ليکل شوی ده:

د هر الکان د (n) دکاربن شمير	5	6	7	8	9	10
ماليکولي فورمول						

2-2: جوړښتي فورمولونه

د مرکبونو ماليکولي فورمولونه مونږ ته راښيي چې کوم عنصرونه ديو مرکب په جوړښت کې شامل دي او د هر مرکب په جوړښت کې د نوموړو عنصرونو داتومونوشمير په کوم تعداد ده؛ خو د دې لپاره چې پوه شو چې دعنصرونو اتومونه د مرکبونو په ماليکولونو کې څرنگه سره وصل شوي دي، بايد دهغوي جوړښتي فورمول وليکلی شو. جوړښتي فورمولونه د ماليکول په هکله زيات معلومات مونږ ته وړاندې کوي داتومونو ځايونه په ماليکول کې بنسټي.

د جوړښتي فورمولونو ډولونو څخه سره يره، د هر عنصر داتومونو شمير، داتومونو وصل له بويل سره بنسټي. ددوومرکبونو




(2-2) شکل : دهادبدروجن دمالیکول په شان دوه اتومي مالیکولونه

کثافت	دایسیدل و درجه	جوړېښتیز فورمول	مالیکولی فورمول	ساده فورمول	مرکب
0.816g/cm ³	78°C	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array} $	C ₂ H ₆ O	C ₂ H ₆ O	ایتانول
0.661g/cm ³	-24.5°C	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array} $	C ₂ H ₆ O	C ₂ H ₆ O	دای میتیل ایتیر

2-3: دجوړښتيزو فورمونو د ليکلو لاري

خزنگه کېدای شي د ماليکولونو د وړاند وړند وکړي شي او هغه وليکل شي ؟
 تراوسه مو ډير زيات مطالبونه د ماليکولونو د جوړښت په اړه زده کړي دي ؛ خو د ماليکولونو درې اړخيز لوري يا هندسي جوړښت مو نه دي مطالعه کړي ، د ماليکولونو هندسي شکلونه دهغوي ډکېميائي خواصونه ټاکلو کې ډير مهم عامل دي ، . ساده ماليکولونه د ساده هندسي شکلونو لرونکي دي ، دوه اتومي ماليکولونه ؛ لکه : دهايډروجن د ماليکول ډيو ساده شکل لرونکي دي ، په لاندي ډول ښودل شوي دي ؛ خو هغه ماليکولونه چې د دوو اتومونو څخه زيات اتومونه لري ، د هندسي پيچلو شکلونو لرونکي دي او په دې هکله بايد زيات معلومات وړاندي شي .

په عمومي ډول ډیو مرکب د مالیکولي فورمول او دهغه د هندسي شکل تر منځ روښانه اړیکه شتون نه لري ؛ دیلګې په ډول : د مرکبونو هریو کاربن ډاي اکساید (CO_2) اوسلفر ډاي اکساید (SO_2) دوه مالیکولونه په پام کې نیسو ، په دواړو مرکبونو کې د رې اتومونه شته دي چې دوه بې د اکسیجن اتومونه دي ، خود دې مرکبونو مالیکولونه بیلابیل هندسي شکلونه لري . د (CO_2) مالیکول خطي او (SO_2) مالیکول کورن دی ، ولې ؟ د دې پوښتنې ځواب کېدای شی د ولاسي الکترونونو په جوړښت کې ، په ځانګړې توګه دهغوی دانومونو په ازاو د جوړوالی الکترونونو کې ولټول شي :



شکل (2- 3) : کاربن ډای اکساید او سلفر ډای اکساید د مالیکولونه جوړښت

یوه نظریه چې د مالیکولونو د هندسي شکلونو د جوړښت لپاره یې وړاندوینه شوې ده، د ولاسي قشر جوړه الکترونونو د دافعه قوې (Valence shell Electron pairs Repulsion) له نظريې څخه عبارت ده چې په (VSEPR) سره ښودل کېږي . د دې نظريې سره سم ، دالکتروستیکې ډلرې قواو شتوالي په یو مالیکول کې د اړیکو اویا د نه اړیکو د جوړو الکترونونو تر منځ د دې لامل ګرځي ترڅو الکترونونه د امکان تر حله پورې یو له بل څخه فاصله نیولې وي اولوری و لري ؛ خو دا لوری نیول داسې دي چې ډیر کلک هندسي جوړښت مالیکول ته ور په برخه کوي . اود اتومونو ځانګړې جوړښت لامل ګرځي ترڅو د مالیکولونو د اړیکو اویا دننه اړیکو جوړه دالکترونونو تر منځ ډیر لږه ډلرې کولو قوه شتون ولري ، دالکتروني ساحې په نوم یالیري او مرکزي انوم د شواخوا ساحې څخه عبارت ده چې الکترونونه د شمیرنه پاملرنو سره په هغه ځای کې شتون ولري . د دې تعریف په پریښت یو ګونې ، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې هم یوه ساحه شمیرل کېږي .

فعالیت

د مالیکولونو د هندسي شکلونو د ښودلو لپاره کېدای شي د باد لرونکو پوکاڼیو څخه ګټه واخیستل شي . خو پوکاڼي په عین اندازه تیارې او لاندې تجربې ترسره کړئ :

1 - په لومړي سر کې دوی وویي پوکاڼي جاد څخه ډکې کړئ ، وروسته د نار څخه په ګټه اخیستلو سره د پوکاڼو سر و نه یو بدل سره داسې وتړئ چې سره تړدې وي ؛ خو ازادې دې وې . پوکاڼي د ورښیښې ټوټې مخ سره وموښي ترڅو د ښار چارج تر لاسه کړي ، وروسته بیا هغوي پر میز خوښی کړئ ترڅو ثابت حالت ځانته عوره کړي ، پوکاڼي دلاندې حالتونو څخه کوم یو ځانته عوره کړي ؟



شکل د تجربې لپاره (2-4)

2- که چیرې په پورتنۍ آزمایش کې درې پوړکلی و کارول شي ، هغوی ته به دلایلي کوم جوړښت مناسب وي ؟



شکل (5-2)

3- که چیرې په پورتنۍ آزمایش کې څلورپوړکلی و کارول شي ، هغوی ته به لاندې کوم جوړښت مناسب وي ؟



شکل (6-2)

4- څرنگه دمالیکولونوهندسي شکل د هغوی لیویس دجوړښت پر بنسټ ټاکل کېږي ؟ د دې موخې لپاره دلاندې لاروڅخه کار اخلو:


- 1 - دلیویس دمالیکول جوړښت رسم کېږي.
- 2 - دمرکزي اټوم په شاوخوا کې دالکتروني ساحو شمیر ټاکل کېږي .
- 3 - اړونده هندسي جوړښت دالکتروني ساحو دشمیر پر بنسټ وټاکي .

هغه زاویه چې درې نښلولي اټومونه یو دبل سره جوړوي د اړیکو د زاويې په نوم یا دېرې چې اکثر حد یې

180° درجې دي

دوه الکتروني ساحې : خطي جوړښت

د CO_2 مالیکول چې دلیویس جوړښت لري ، په پام کې نیسو:



دمرکزي اټوم په شاوخوا کې دوه الکتروني ساحې (کېن اوبښي) شتون لري .
یوازې دممکنه لوري نیول چې کولای شي دکاربن داتوم په شاوخوا دوه الکتروني ساحې د امکان ترحده پورې یوله بل څخه لرې وساتي ، له خطي جوړښت څخه عبارت دي. لاندې شکل وگورئ:




(2 - 7) شکل دخطي مالیکول جوړښت.

د (VSEPR) دنظریې سره سم ، هغه مالیکول چې دمرکزي اټوم په شاوخوا کې د دوه الکترونو ساحو لرونکی دي ، څرنکه چې په کاربن ډای اکساید کې لیدل کېږي ، خطي جوړښت لري او ولاسي زاویه یې 180° ده .




د دري الکتروني ساحي (دري ضلعي يا مسطح) جوړښت

په دې اړه دسلفر تراي اکسايډ (SO_3) جوړښت گورو:



په SO_3 کې د دري اړخيز الکتروني ساحي د مرکزي اټوم سلفر (S) په شاوخوا کې شتون لري . ددې ماليکول هندسي جوړښت چې دري ضلعي يا مسطح دي ، په لاندې ډول ليکل شوی دي :




(8-2) شکل د SO_3 د ماليکول مسطح جوړښت

د SO_3 په شان په ماليکولونو کې ، کله چې مرکزي اټوم دننږدري اټومونو په واسطه چاپير شوی وي او په هغوی کې الکتروني جوړې داړيکو الکترونونو جوړه يي ټولو څخه وي ، نو د ماليکول جوړښت مسطح دي او د هغه ولانسي زاويه 120° درجي ده .


څلور الکتروني ساحي (څلور مخه جوړښت)

دا الکترونونو څرنګوالی چې څلور الکتروني ساحي لري ، دهغوي ماليکولي جوړښت لږ څه پيچلې دی چې دهغوی بيلگه کېدای شی ميتان CH_4 وويل شی ؛ ځکه د يو مسطح شکل په عوض چې دکاغذ په يا نه کې ښودل کېږي ، يودري اړخيز شکل لري چې د څلور وجهي په نوم ياديږي . د ميتان د ماليکول دښودلو څو بيلابيلې لارې په (2-8) شکل کې ښودل شوي دي . شکلو نه کېدای شي د دري ستونو په ډول په بام کې ونيول شي چې دهغوی څلورمه ستنه په پورته لوري پرهغه باندې ټينګه ده ، په دې ډول جوړښت کې الکتروني جوړې يوه له بلې سره په 109.5° کې دي .




(2-9) شکل د ميتان ماليکولي فورمولونه

4- په ماليکولونو کې د جوړه الکترونونو نه اړيکو شتون په صورت کې د اړيکو زاويې داسي برابرې کړئ چې دنه اړيکو جوړو الکتروني ساحي لپاره اړونده لويه فضا پراخه شي . دسلفر اټوم د SO_2 په ماليکول کې گورو .



د دې انوم په شلو خوا کې درې الکتروني ساحې شته دي؛ له دې کبله د هغو جوړښت د مسطح درې ضلعي گروپ پورې اړه لري، په دې جوړښت کې الکتروني ساحې یوه له بلې سره 120° درجې زاویه لري؛ خو د یوې نه اړیکې الکتروني جوړې په پرتله ډیره فضا نیسي؛ ځکه د نه اړیکو الکتروني جوړې د یوې هستې د اغیزې لاندې دي، په داسې حال کې چې د اړیکو الکتروني جوړې د دوو هستو د اغیزو لاندې دي.

دلرې کولو قوه د نه اړیکو - اړیکو الکتروني جوړو ترمنځ لږ څه زیاته د اړیکو - اړیکو د الکتروني جوړو ترمنځ دلرې کولو له قوې څخه ده، د لري کولو د قواو د زیات والي له امله، د اړیکو الکتروني جوړې یوه له بلې څخه لږ څه لرې دي؛ نو د دې کبله د SO_2 د مالیکول د اړیکو زاویه چې باید 120° وي، 119.5° ته ټیټه شوې ده، د SO_2 په هکله باید وویل شي چې په هغه کې دوه گونې او درې گونې اړیکه هم همدا رنگه ده؛ ځکه دهغوي الکتروني ساحې د یوې گونې اړیکې د ساحې په نسبت ډیرې فضا ته اړتیا لري. لاندې شکلونه د ایتلین او اسیټیلین مالیکولي فورمولونه ښيي چې دهغوی په مالیکولونو کې د دوو کاربنونو ترمنځ په ترتیب سره دوه گونې او درې گونې اړیکې شتون لري:



(10-2) شکل داسیتیلین دمالیکول فورمول اوخطي جوړښت




(11-2) شکل داسیتیلین دمالیکول فورمول اوخطي جوړښت

دځینو الکانونو جوړښتنیز فورمول لاندې جدول کې لیکل شوی دي:

3-2 جدول دځینز الکانونونوم او د لیوس جورښت

د الکانونو نمونه	مالیکولي فورمول	دجورښتیز فورمولونه
پروپان	C_3H_8	$\begin{array}{c} H & H & H \\ & & \\ H-C-C-C-H \\ & & \\ H & H & H \end{array}$
بیوتان	C_4H_{10}	$\begin{array}{c} H & H & H & H \\ & & & \\ H-C-C-C-C-H \\ & & & \\ H & H & H & H \end{array}$
پنتان	C_5H_{12}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H \\ & & & & \\ H-C-C-C-C-C-H \\ & & & & \\ H & H & H & H & H \end{array}$
هگزان	C_6H_{14}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H \\ & & & & & \\ H-C-C-C-C-C-C-H \\ & & & & & \\ H & H & H & H & H & H \end{array}$
هپتان	C_7H_{16}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H & H \\ & & & & & & \\ H-C-C-C-C-C-C-C-H \\ & & & & & & \\ H & H & H & H & H & H & H \end{array}$
اوکتان	C_8H_{18}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H & H & H \\ & & & & & & & \\ H-C-C-C-C-C-C-C-C-H \\ & & & & & & & \\ H & H & H & H & H & H & H & H \end{array}$
نونان	C_9H_{20}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H & H & H & H \\ & & & & & & & & \\ H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H \\ & & & & & & & & \\ H & H & H & H & H & H & H & H & H \end{array}$
دیکان	$C_{10}H_{22}$	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H & H & H & H & H \\ & & & & & & & & & \\ H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H \\ & & & & & & & & & \\ H & H & H & H & H & H & H & H & H & H \end{array}$

که د پورتني جدول دالکانونوجورښت ته پاملرنه وشي، لیدل کېږي چې د دوی ترمنځ د یو میتیلین ($-CH_2-$) گروپ په اندازه یوله بل څخه توپیر لري، هغه مرکبه چې د یو ($-CH_2-$) په اندازه یوله بل څخه توپیر ولري، یوله بل د هومولوگ (Homolog) په نوم یادېږي:



څرنگه چې لیدل کېږي دالف اوب الکانونه دواړه دصین مالیکولي فورمول (C_4H_{10}) لرونکي دي ؛ خو دهغوی دکاربن دنڅڅیرجوړښت یوله بل څخه تومیرلري ، داسې چې الف فورمول نورمال نڅڅیر او د ب فورمول ښاخ لرونکي نڅڅیر دي ، دپورتنيو توضیحاتو څخه پایله اخیستل کېږي چې د مالیکول جوړښتیز فورمولونه دمرکب په مالیکولونو کې دشاملو اټومونو دایرېکو څرنګوالی په هکله مونږ ته معلومات وړاندې کوي .

مثال : داوبو او امونیا د مالیکولونو د هندسي ښې وړاندېز وکړئ او وښی لیکئ .

داوبو (H_2O) او امونیا د مالیکولونو د هندسي (NH_3) ښې وړاندېز وکړئ او وښی لیکئ .

حل :



2- دالکتروني ساحو شمیرد دواړو مالیکولونو دمرکزي اټوم په شاوخواکې شمیرو:

الف - په NH_3 کې دنایترون اټوم درې اړیکې دهیلدروجن د اټومونوسره تړلې دي اویوه جوړه ازاد الکترونونه لري ؛ پړدي ښست نو څلورالکتروني ساحې لري.

ب - په اوبو H_2O کې داکسیجن اټوم دوه اړیکې دهیلدروجن سره تړلې دي اودوه جوړې ازاد الکترونونه هم لري ؛ پړدي ښست دڅلوروالکتروني ساحولرونکي دي .

3- اړونده هندسي جوړښت د VSEPR د نظريې پریښست ټاکو :

الف - په اټومونوکې الکتروني ساحه به خامخا څلورمخیزه جوړښت ولري اوداړېکو زاویه ښې 109.5° درجې ده .

4 - دالکترونونود جوړې څرنګوالی ټاکو .

الف - دامونیا په اړه څلوروجهي درې ستنوپه شکل په پام کې نیسو چې دهغه څلورمه ستنه له پاس لوري پرې ټینګه ولاړه ده . که چېرې ازاده جوړه الکترونونه په څلورمې ستنې باندې ومنو ، لاس ته راغلي هندسي

شکل به دپوهرم درې ضلعي قاعدې ولري. (2-12 شکل)

ب - د اوبوپه اړه ، د اوبو د مالیکول شکل کوږدي ، دوه جوړې ازاد الکترونونه دڅلوروجهي دوه ستنې نیولې دي .

ج - د نه اړیکو - نه اړیکو ، نه اړیکو - اړیکو اوداړېکو د جوړه الکترونونو دشتون پریښست چې لري کوونکي قوه په ترتیب سره دهغوي ترمنځ کمېږي ، د اوبو اوامونیا په مالیکول کې دایرېکو زاویه د 109.5° دنورمال زوایي څخه لږه کوچنۍ ده ، د امونیا په مالیکول کې دایرېکو زاویه 107° او اوبوپه مالیکول کې 104.5° لاندې شکلونه وگوري:



(2-12) شکل د اوبو او

امونیا مالیکولي جوړښت

فعالیت




دلاندې مالیکولونو هندسي شکلونو وړاند وینه وکړئ او ونې لیکئ:



دجوړښت فورمولونو دساده کولو لاره



که په (2-3) جدول کې دالکانو جوړښتیز فورمولونو ته پام وکړو، و به مومو چې د دوي لیکل اورسمول ستونزمن، غیراقتصادي او مشکل دي؛ له دې کبله د جوړښتیز فورمولونو د ښودنې او لیکنې لپاره نورې لارې ټاکل شوې دي چې په لاندې ډول دي:

- دجوړښتیزو فورمولونو دلیکلو لپاره په لنډه ډول، دکاربونونو او هایدروجن ترمینځ اړیکې هم نه ښودل کېږي او ځینې وخت دکاربونونو د اټومونو اړیکې هم نه لیکل کېږي، دیلګې په ډول:



دکیمیایي علامو ښودل!


- په دې روش کې دکاربن او هایدروجن ټول اټومونه دجوړښتیزو فورمولونو څخه لرې کېږي او یوازې هغه اړیکې چې دزوايي لرونکو خطونو په واسطه وړاندې کېږي، ښودل کېږي، دا ډول جوړښت دسکلیټي جوړښت او یا دخطي - زوايي جوړښت په نوم یا دوي - په دې جوړښت کې یوازې دکاربن اړیکې (C-C) ښودل کېږي؛ داسې چې دکاربن داتومونو ځایونه دخطونو ډیرکړو ځایونو په سر او په پای کې په پام کې نیول کېږي او دC-H لیکلو څخه لاس نیونه کوي.



فعالیت

- 1- دلاندي مرکبزو نیښگری جورښنت ، ناقص مشرح اوسکلتي فورمولونه ولیکي:
 C_6H_{14} ، C_6H_{12} ، C_7H_{16} ، C_4H_{14}
 2- دلاندي مرکبزو بشپړه جورښتیز فورمول ولیکئ :
 $CH_3(CH_2)_4CH_3$ ، $CH_3COCH_2CH_2CH_3$ ، $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

داسپیرین کیمیايي نوم استایل سالیسیلیک اسید دي ؛ څرنگه چې دهغه د جورښتیز فورمول بشپړ ښودل ستونزمن دي ؛ نو پر دې بنسټ کیمیا پوهانو دهغه داسکلتي فورمول څخه گټه اخېستلې ده چې په لاندې ډول دي:




(2- 13) شکل اسپیرین او دهغه فورمول

ډیر پوه شی

دمرکبښود مالیکولونو دولانسي اړیکو ترمنځ نورماله زوايه °109.5 ده اوبه ټول مالیکولونو کې په همدې اندازه بېله وي ، له دې کبله د زنجیري هایډروکاربنو مالیکولونه درگراگ (کوپروډ) په بڼه لیدل کېږي

4-2 : ایزومیری (Isomers)

په کیمیا په تیره بیا په عضوي کیمیا کې ډیر مرکبونه شته چې دهغو مالیکولونه جورښتیز فورمولونه لري ؛ خو پومالیکولي ترکیبي فورمول لري ؛ ډیلاگي په ډول : ایټایل الکول اوډاي میتایل ایترعین مالیکولي فورمول لري ؛ نو د جورښتیز فورمولونه یې سره توپیر لري .



Ethanol

imethyleter


څرنگه چې لیدل کېږي ، په ایټانول کې ډاکسیجن اټوم ډیوانوم کارن اویوانوم هایډروجن سره اړیکه لري ؛ په داسې حال کې چې د ډاي میتایل ایتیره مالیکول کې ډاکسیجن اټوم دکاربن د دوو اټومونو سره اړیکه لري ؛ نو



Stereo يوناني کلمه ده چې دجامدو اوکلکو جسمونو په معنا ده؛ نو فضايي ايزومري (Stereo isomeris) کلاک فضايي جوړښت ولري او دهغوی هندسي شکل فضايي بدلون نه مومي .

د زیاتي پوهې په خاطر:

الکېنزنه دسا یکلو الکانونوسره ایزومیر دي او الکانیزنه دسایکلو الکېنونوسره ایزومیري دي؛ دیلگي په ډول : مرکب چې جمعي فورمول يې C_6H_6 دي، کېدای شي چې پروپین اوسي او یا دا چې سایکلوپروپان وي :



1 - propene

Cyclo propane

د دویم څپرکي لنډيز



* تل یو کیمیايي مرکب دهغه دتشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغوی دنسبتي ضریبونو سره چې دسټوکیومتری (Stoichiometry) ضریبونو په نوم هم یادېږي ، ښودل کېږي چې دتشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو دترتیب لاره د مرکبونو د نسبتي ضریبونو سره یې دمالیکولي فورمول په نوم یادېږي .

* مالیکولي فورمول کېدای شي دکیمیايي تجزيې په واسطه وټاکل شی . دکیمیايي فورمولونو بل ډول له تجربې فورمول څخه عبارت دي ، په دې فورمول کې دیالایلو عنصرونو دانومونو شمیر په یو مرکب کې ښودل کېږي ، تجربې کلمه په دې ځای کې په دې معاده چې وړاندې شوی فورمول یوازې دپلاندني او اندازه کولو پر بنسټ یعنې دتوصیفې او مقداري تحلیل په واسطه ټاکل شوی دی

* مالیکولي فورمول مرکبونه په کیمیايي ژبه معرفي کوي فورمول نه یوازې په مالیکول کې دانومونو ډولونه ښیي ؛ بلکې دانومونو شمیر او ډولونه هم ښیي ،

* جوړښتیز فورمولونه مونږ ته دمالیکول په هکله زیات معلومات وړاندې کوي دانومونو ځایونه په مالیکول کې ښیي .

* یو ه نظریه چې دمالیکولونو دهندسي شکلونو دجوړښت لپاره یې وړاندوینه شوې ده ، دولنسي قشر دجوړه الکترونونو د دافعه دقوې (Vaolence shell Elctron pairs Repulsion) دنظريې څخه عبارت ده چې په (VSEPR) سره ښودل کېږي . د دې نظريې سره سم ، دالکتروستاتيکي درې کولو قوا و شتوالې په یو مالیکول کې دارېکو او یا د نه اړېکو دجوړو الکترونونو ترمنځ د دې لامل گرځي ترڅو دغو الکترونونو د امکان تر حده پورې یو ډبل څخه فاصله نیولې وي اولوری و لري ؛ خو دا لوري نیول داسې دي چې ښیر کلک هندسي جوړښت مالیکول ته ور په برخه کوي .

*. هغه زاویه چې درې ښلولي انومونه یو ډبل سره جوړوي ، د اړېکو د زاوېي په نوم یادېږي چې اکثر حده یې




180° درجې ده .

* هغه مرکبه چې دپوشان ماليکولي فورمولونو لرونکې دي ، خو دهغوي جوړښتيز فورمولونه يوله بل څخه توپير و لري ؛ يعنې دهغوي په ماليکولونو کې د اټومونو داړيکو توپير څرگند شي ، يو بل د ايزومير (Isomers) په نامه يادېږي.

تمرین اود دوهم څپرکي پوښتي

- 1 - ماليکولي فورمول کېدای شي دکېميايي ---- پرېنست وټاکل شي .
الف - کيميايي تعاملونه ، ب - کيميايي ستيز ، ج - تجزيو ، د - هيڅ يو .
- 2 - دمرکبونو دساده اوماليکولي فورمولونو د پوهيدلو لپاره لازمه ده ترڅو د مرکبونوپه ---- تحليل پوه شي .
الف - توصيفي ، ب - مقداري ، ج - الف او ب د - هيڅ يو .
- 3 - جوړښتيز فورمولونه د ډولو څخه سر بيره ، دهرعنصر داتومونو دشمير ، اوداتومونو يول ته هم ښيي .
الف - داتصال لاره ، ب - داړيکو څرنگوالي ، ج - دماليکولونو شمير ، د - الف او ب دواړه سم دي .
- 4 - له اټومونو څخه جوړښت چې دماليکولونو د اړيکو او د نه اړيکو جوړه الکټرونونو ترمنځ دلري کولو لامل گرځي ډيره لږه قوه شتون ولري د ---- په نوم يادېږي .
الف - الکټروني مدار ، ب - الکټروني قشر ، ج - الکټروني فرعي قشر ، د - الکټروني ساحه
- 5 - دماليکولونو هندسي بنو ډير مهم لامل دهغوي د ---- په ټاکلوکې دي
الف - کيميايي خواص ، ب - فزيکي خواص ، ج - الف او ب دواړه د - هيڅ يو
- 6 - په څلورمخيز جوړښت کې الکټروني جوړې يوه له بلې سره ---- زويه لري .
الف - 120° ب - 109.5° ج - 309.5° د - 180°



الف - $\text{C}_4\text{H}_{14}\text{O}$ ب - $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ج - $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}$ د - هيڅ يو هم نه
8 - $\text{H}:\ddot{\text{N}}:\text{H}$ د ماليکول د بني جوړښت دلاندې کوم عالم په نوم يادېږي؟

الف - او گدرو ب - واندر والس ج - ماکسیویل د - لیویس

9 - هغه مرکبونه چې عین مالیکولي فورمول لرونکي وي؛ خو دهغوی جوړښتیز فورمولونه .

یې یو له بل توپیر ولري یو د بل ویل کېږي.

الف - ایزومیر ب - Isomers) ج - الف او ب دواړه د - هېڅ یو
10 - د مرکبونو ایزومیري د----- فزیکي خواص لرونکي دي .

الف - یو شان ب - مساوی ج - مختلف د - کیمیايي

تشرېحي پوښتنې

1- د ساده او مالیکولي فورمول ترمنځ توپیر څه دی ، هغه دیلگي په واسطه روښانه کړئ.

2- په 0.3 کسیت کې د یو عضوي مرکب $C_{12}H_{12}O_{0.02}$ کاربن او 0.02 هایدروجن شتون لري ، د دغه مرکب تجربی فورمول پیدا کړئ (د کاربن اټومي کتله C_{12} د هایدروجن 1 او کسینجن 16 ده

3 - د یو مرکب ساده فورمول CH_2O دي، د نوموړي مرکب مالیکولي کتله $180g/mol$ ده

دهغه مالیکولي فورمول پیدا کړي

4 - د عضوي مرکب مالیکولي کتله $180g/mol$ ده ، د نوموړي مرکب په ترکیب کې 55% کاربن 36% اکسیجن او 9% هایدروجن شامل دي، دهغه مالیکولي فورمول لاس ته راوړئ.

5 - د یو عضوي مرکب په ترکیب کې یوازې کاربن او هایدروجن شتون لري، چې $1.5g$ هایدروجن او $9g$ کاربن دهغه د تجزیې څخه لاس ته راغلي دي ، دهغه مالیکولي کتله $210g/mol$ ده، مالیکولي فورمول یې پیدا کړئ .

6 - دلاندې مرکبونه جوړښتی او اسکلیتي فورمولونه ولیکئ.

الف - 3-hexene ب - 1,1-dichloro-1-butene ج - 1,2-dibromoethene

7 - هغه مرکب چې د C_6H_{14} مالیکولي فورمول لرونکي دي ، څو ایزومرونه لري ؟


دهغه د ټولو ایزومرونو جوړښتیز فورمولونه ولیکئ

8 - هندسي ایزومیري څه رنگه ایزومیری ده ؟ په دې هکله معلومات ورکړئ.

9- د C_4H_8O د مرکب ټول ممکنه ایزومیري دهغوی د جوړښت او اسکلیتي فورمولونو سره ولیکئ.



د عضوي مرکبونو ډول بندي



عضوي مرکبونو د ښوولنې ، طب او اوسني صنعت بنسټ جوړ کړی دی . د ژوندپو موجوداتو د جوړښت بنسټيزه اجزاوي له اوبو سره ، عضوي مرکبونه دي ، داچې عضوي مرکبونه د کاربن د عنصر مرکبونو څخه عبارت دي ، نو ويلي شو چې مونږ د کاربن په عنصر کې ژوند کوو . ولي عضوي مرکبونه په ټولگيو ویشل شوي دي ؟ آيا د هر مرکب د خواصو زده کړه په ځانگړې توگه ساده کار دي ؟ د هومولوگ سلسله څه شي ده ؟ څرنگه چې عضوي مرکبونه په زياته پيمانه په طبيعت کې شته دي ، د هغوی د هريو مطالعه په ځانگړې توگه ستونزمن کار دی ؟ نو له دې کبله عضوي مرکبونه په بيالو ټولگيو ویشل شوي دي چې د عضوي مرکبونو د ډول بندي لاندې مطالعه کوو .

۳-۱: عمومي معلومات:

عضوي مرکبونه چې دهغوی شمیر له شل میلیونو څخه زیات دی، د کارني زنجیري جوړښت (دکارني اسکلیټ) اویا وظیفه یي گروپونو د شتون پر بنسټ ډلبندي کېږي ، د کاربن د اتومونو د اړیکو ډول یو ډل سره هم دعضوي مرکبونو په طبقه بندۍ کې بنسټیز رول لري .

د کارني اسکلیټ د جوړښت په پام کې نیولو سره عضوي مرکبونه په دوو ډولو دي چې د زنجیري اسکلیټ (*Acyclic*) کرښ (*Cyclic*) مرکبونه دي

زنجیري مرکبونه د مرکبونو له هغو ډولو څخه دي چې واز زنجیر لري او د هغوی بنسټ د الیفاتیک هایډروکاربنونو جوړښت تشکیل کړی دی .

1- هایډروکاربنونه: د دې مرکبونو مالیکولونه یوازې د کاربن او هایډروجن د اتومونو څخه جوړ شوي دي، دا مرکبونه کېدای شي مشبوع؛ لکه: الکانونه (*Alkanes*) او یا غیر مشبوع د دوه گوني (*Alkenenes*) او درې گوني (*Alkynes*) اړیکې او الکاډاینونه (*Alka dienes*) وي

2- ګره ییز (حلقوي) مرکبونه (*Cyclo alkanes*): دا مرکبونه په خپلو مالیکولونو کې تړلی زنجیري جوړښت لري او د ګرۍ په بڼه دي چې د ګرۍ د تشکیل کونکو اتومونو د ډولونو په پام کې نیولو سره په کاربوسکلیک (*Carbocyclic*)و هتروسکلیک (*Hetrocyclic*) تړلګیو ویشل شوي دي .

3- کاربوسکلیک (*Carbocyclic*): په دې ډول مرکبونو کې ګرۍ یوازې د کاربن له اتومونو څخه جوړه شوې ده او دهغوي د کیمیايي خواصو د توپیر په پام کې نیولو سره په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې د ایسکلیک (*Alicyclic*) او اروماتیک (*Aromatic*) مرکبونه دي .

د اروماتیک مرکبونو بنسټ د بنزین مرکبونو تشکیل کړی دی او عبارت له بنزین ، نفتالین ، انتراسین او د هغوي مشتقات دي .

د ایسکلیکونو مرکبونه د سایکلو الکانونو (*Cyclo alkanes*) او سایکلو الکینونو (*Cyclo alkenes*) په مرکبونو ویشل شوي دي .

د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړنی مرکب سایکلو پروپان دی او د دوي عمومي فورمول (C_3H_{2n}) دی چې د الکینونو سره ایزومیر دي . داسې سکلیکونه هم شتون لري چې په هغوی کې د کاربن د اتومونو شمیر له 30 اتومونو څخه هم زیات دی .

اروماتیک هایډروکاربنونه (*Arenes*)

دا هایډروکاربنونه په خپل ترکیب کې د بنزین ګرۍ لري، نفتالین ، انتراسین او فینانتین د دې مرکبونو له ډلې څخه دي چې د بنزین د څوکړو د تراکم څخه لاس ته راغلي دي.


هتروسکلیک (*Hetrocyclic*)

دا مرکبونه د کاربن د اتومونو سربیره ، په خپله ګرۍ کې د نورو عنصرونو یو یا څو اتومونه لري چې په ځانګړې توګه دا عنصرونه عبارت له: اکسیجن ، نایتروجن ،سلفر او نورو څخه دي. هتروسکلیک مرکبونه کېدای شي.



مشیوع، غیر مشیوع او یا اروماتیک وي.

ټول عضوي مرکبونه کېدای شي چې د پورتنیو نوموړو هایدروکاربنو مشتقات ومنل شي، ځکه دا عضوي مشتقات د هایدروکاربنونو ډیو او یا دخو هایدروجنو د اټومونو له تعویض څخه د وظیفه یي ګروپونو په واسطه لاس ته راځي. لاندې شکل په لنډه توګه د عضوي مرکبونو ټولګې ښيي:



۳-۲: د هایدروکاربنونو د ډلو ویشل:

هایدروکاربنونه هغه مرکبونه دي چې د کاربن او دهایدرجن د اټومونو د ترکیب له امله جوړ شوي دي، په هایدروکاربنونو کې د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکې لري چې دا اړیکې د کاربن د نورو اټومونو او د نورو عنصرونو د اټومونو سره تړل شوي دي. د هایدروکاربنونو ډلبندي په لومړي سر کې د شپږ کاربنه کړۍ دشتون او نه شتون پریښت یعنې ډبنزین پریښت په هایدروکاربنونو کې ترسره کېږي او دا کړۍ د وظیفه یي ګروپ په توګه شمیرل کېږي. د ډبنزین کړۍ لرونکي هایدروکاربنونه د اروماتونو د مرکبونو په نوم یادېږي او هغه هایدروکاربنونه چې په ترکیب کې یې د ډبنزین کړۍ نه وي، د الیفاتیک (تیل جوړونکي) په نوم یادېږي. الیفاتیک هایدروکاربنونه د کاربن-کاربن د اړیکو د ډولو په پام کې نیولو سره د مشیوع الیفاتیکو (Alkenes) سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، غیر مشیوع الیفاتیک مرکبونه په الکینونو (Alkynes) او الکانینونو (Alkynes) ویشل شوي دي.

الکانونه هغه مرکبونه دي چې د کاربن د اتومونو ټول ولاسونه يې د هايډروجن د اتومونو په واسطه مشبوع شوي دي او په هغوی کې د کاربن اتومونه يوه گونې اړیکې لري او الکينونه هغه مرکبونه دي چې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ يې دوه گونې اړیکه شتون لري او غير مشبوع دي . نور غير مشبوع هايډروکاربنونه الکانونه دي چې په دې مرکبونو کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې گونې اړیکې شتون لري او د الکانونو پرتله د هايډروجن خلور اتومونه او د الکينونو پرتله د هايډروجن دوه اتومه لږ لري .

فعاليات



زده کونکي دي، په اړوندو گروپونو ویشل شي ، هر گروپ دي د عضوي مرکبونو زيات شمير لست کړي او هغوی دي د پوهنيزو دليلونو د وړاندې کولو پرنسب ډلبندي کړي او د مرکبونو په ډلبندي کې دې د پورتني شکل څخه گټه واخلي .

3-3: په هايډروکاربنونو کې وظيفه يي گروپونه:

د هايډروکاربنو په بيلا بيلو ډلو کې وظيفه يي گروپونه شتون لري چې د هايډروکاربنونو بيلا بيل مرکبونه يې جوړ کړي دي، دا گروپونه د کاربن - کاربن داتومونو د اړيکو د څرنگوالي او وظيفه يي گروپ له امله مينځته راغلي دي چې په لاندې جدول کې ليکل شوي دي:

1-3 جدول د هايډروکاربنونو وظيفه يي گروپ

د هايډروکاربنونو گروپونه			
Alkanes	$CH_3 - CH_3$	ايټان	-
Alkenes	$CH_2 = CH_2$	ايټلين يا ايټيلين	الکټروفيلیک پاتې
Alkynes	$CH \equiv CH$	ايټاين يا استيلين	الکټروفيلیک پاتې
Alkadienes	$CH_2 = CHCH = CH_2$	1،3 - بيوتادين	الکټروفيلیک پاتې
Arenes		بنزين	داروماتيکو الکټروفيلیک بلرونه

4-3: د الکانونو هومولوگي سلسله:

هغه مرکبونه چې ډيو ميتلني گروپ ($-CH_2$) په اندازه يو ډبل څخه توپير ولري، يو ډبل د هومولوگ (Homologe) په نوم يادېږي ، هومولوگي سلسله په الکانونو ، الکينونو او الکانونونو کې موجود ده؛ څرنگه چې د الکانونو په ماليکولي فورمولونو کې ليدل کېږي، د ايټان مرکب د خپل مخکني مرکب يعني دميتان څخه ډيو ($-CH_2$) په اندازه توپير لري په همدې ترتيب پروپان د ايټان په نسبت او بيوتان د پروپان په نسبت ډيو ميتلني



(CH_2) - گروه په اندازه لوی دي . دا سلسله د هومولوگ سلسلې (Homologe) په نوم یا دوي .

2-3 جدول : د الکانونو د هومولوگی سلسله

د مرکب نوم	د مرکب فورمول
Methane	CH_4
Ethane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_3$
Propane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Butane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Pentane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Hexane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Heptane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Octane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Nonane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Decane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Undecane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Dodecane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Tridecane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

د هومولوگ په اصطلاح سربيره د ايزولوگ اصطلاح هم په عضوي کيميا کې په کار وړل کېږي، د دې اصطلاح مفهوم رسولي دي : د هايډروکاربنونو عضوي مرکبه دي چې د کاربن د عيني شمير د انومونو لرونکي وي يو ډبل د ايزولوگ په نوم يا دوي .

فعاليت

زده کوونکي دي په څو مناسبو گروپونو ویشل شي ترڅو هرگروپ په ځانگړي ډول په هايډروکاربنونو کې د هومولوگ د اصطلاح په اړه خبرې اترې وکړي، د ايتلين څخه تر هگزين او د استلين څخه تر او کتالين پورې دې ساختماني فورمولونه وليکي او هومولوگي شکلونه دې د نوموړو مرکبونو په فورمولونو کې روښانه کړي او دهر گروپ نماينده دې د هر گروپ کرڼه وړاندې کړي .

5-3: عضوي مرکبونه او وظيفه يي گروپونونه (د هايډروکاربنونو مشتقات)

عضوي کيميا د هايډروکاربنونو او د هغوی له مشتاتو څخه عبارت ده . که چيرې د هايډروکاربنونو يو يا څو اتومه هايډروجن دځانگړو گروپونو (Functional groups) په واسطه بې ځايه شي، هغه عضوي مرکبونه حاصلېږي چې د هايډروکاربنونو د مشتاتو په نوم يا دېرې وظيفه يي گروپونه بې ځايه شي، هغه عضوي مرکبونه حاصلېږي چې د هايډروکاربنونو کې د اتومونو او يا د انومونو له گروپونو څخه عبارت



جي ڇي خانگري او ٽاڪلي جو رڻسٺ لري او عضوي مرکونه د خانگري فزيڪي ، کيميايي خواصو دڻسودلو لامل گرڇي . هغه هايدروکاربنونه ڇي عين وظيفه يي گروپونه لري ، کيميايي خواص يي هم يوشان دي .

3-3 جدول وظيفه يي گروپونه .

د مرکبونو نومونه	مرکونه	د مرکبونو عمومي فورمول	د وظيفه يي گروپ نومونه	وظيفه يي گروپ
MethylChloride	$CH_3 - X$	$R - X$	هلايدها (Halids)	$(-F - Cl - Br - I)$
Ethano	$CH_3 - CH_2 - OH$	$R - OH$	Hydroxyl	$-OH$
Propanal	$CH_3 - CH_2 - \overset{O}{\parallel} C - H$	$\overset{O}{\parallel} R - C - H$	Carbonyl	$\overset{O}{\parallel} - C -$
Propanoi	$CH_3 - \overset{O}{\parallel} C - CH_3$	$\overset{O}{\parallel} R - C - R$ Ketones		
aceticacid	$CH_3 - COOH$	$R - COOH$ Acide	Carboxyl	$-COOH$
Dimethyleter	$CH_3 - O - CH_3$ Ethers	$R - O - R$	Oxy	
Dimethyleter	$H_3 - \overset{O}{\parallel} C - O - CH_3$	$\overset{O}{\parallel} R - C - O - R$ Ester	EsterGroup	$\overset{O}{\parallel} - C - O -$
Methylamines	$CH_3 - NH_2$	$R - NH_2$ Amines	$R - NH_2$ Amines	$-NH_2$
Methylamide	$CH_3 - \overset{O}{\parallel} C - NH_2$	$\overset{O}{\parallel} R - C - NH_2$	AmidesGroup	$\overset{O}{\parallel} - C - NH_2$
Marcapane	$CH_3 - CH_2 - S - H$	$R - S - H$	MarcapanGroup	$-S - H$
Dimethylthioether	$CH_3 - S - CH_3$	$-S - R$ Thioether	Thioether	$-S -$
BenzSulphonie-acid	$C_6H_5 - SO_3H$	Sulpho group $R - SO_3$	SulphoGroup	$-SO_3H$

هترواتومونو د چولونو له ڪبله ڇي د وظيفه يي گروپونو به ترڪيب ڇي شامل هي ، داگروپونه به لاندې چول ويشل شوي جي .

3-5-1: اڪسيجن لرونڪي وظيفه يي گروپونه : د دي گروپونو به ترڪيب ڇي اڪسيجن دهترو اتوم به توگه شتون لري

ڇي دهغوي بيلگه ڪيڏاي شي $\overset{O}{\parallel} - C - OH$ ، $-O -$ ، $\overset{O}{\parallel} - C - O -$ او نور وړاندې شي .

3-5-2: نائيتروجن لرونڪي وظيفه يي گروپونه : د دي گروپونو به ترڪيب ڇي د نائيتروجن اتوم د هترو اتومونو به توگه شتون لري ڇي دهغوي بيلگه ڪيڏاي شي $NO_2 -$ ، $-C - NH_2$ ، $-NH_2$ او نور وړاندې شي .




3-5-3: **سلفر لرونکي وظيفه يي گروپونه:** د دې گروپونو په ترکيب کې د سلفر اټوم د هترو اټوم په توگه د نوموړو گروپونو په ترکيب کې شته چې د دهغوی بيلگه کېدای شي $\text{H}-\text{S}-$ ، $-\text{S}-$ ، $\text{SO}_3\text{H}-$ او نور وړاندې شي

3-5-4: **فاسفور لرونکي وظيفه يي گروپونه** د دې گروپونو په ترکيب کې د فاسفور اټوم د هترو اټوم په توگه په نوموړو گروپونو کې شتون لري چې دهغوی بيلگه کېدای شي PH_2- ، PO_3H_2- او نور وړاندې شي .

د وظيفه يي گروپونو معلوم شمير په دې عصر کې ټير زيات دی چې د عضوي مرکبونو په مالیکولونو کې کېدای شي چې خړ وظيفه يي ټير لږ شمير له څيړني لاندې نيول شوی دی . د عضوي مرکبونو په مالیکولونو کې کېدای شي چې خړ وظيفه يي گروپونه هم شتون ولري ، که چيرې داگروپونه يوشان وي . (د بيلگې په ډول : د هلوجن دوه گروهه ، اوبه د هايډروکسيل دوه گروهه او نورو) د مرکبونه د خړ وظيفه يي گروپونو (Polyfunctional groups) په نوم يادېږي . هغه عضوي مرکبونه چې دهغوی په مالیکول کې خړ بيلابيل وظيفه يي گروپونه شتون لري ، د بيلابيلو گروپونو لرونکو

(Hetro Functional groups) مرکبونو په نوم يادېږي .

لاندې د مونو ، پولي او هترو وظيفه يي گروپونو لرونکو مرکبونو بيلگې درکړل شوي دي :




6-3: د وظيفه يي گروپونو سره عضوي مرکبونه

6-3-1: د ځينو وظيفه يي گروپونو ځانگړتيا

1- د هالايډونو گروپ: که چيرې د هلو جنونو د عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو اړيکه په هومولتيکي ډول پرې شي ، دهغوی رايکالونه تشکيلېږي چې د وظيفه يي گروپونو په بڼه د هايډروکاربونونو د هايډروجن د اټومونو ځای نيسي ، د بيلگې په ډول :



د هالايډونو وظيفه يي گروپونه د طاقه الکترون لرونکي دي او فعاله دي؛ نو له دې کبله په اسانۍ سره تعامل کوي او د هايډروکاربونونو هلو جني مشتقات تشکيلوي




(3-1) د بړومو کلوروميټان شکل

هغه ذرې چې د طاقت الکترولونو لرونکي دي ، د راديکالونو (Radical) په نوم يادېږي

2- د هايډروکسيل وظيفه يي گروپ

د هايډروکسيل گروپ د يو اتوم هايډروجن او يو اتوم اکسيجن څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې اکسيجن اتوم يو طاقت الکترول لري او د جوړښت فورمول يې په لاندې ډول دی:



(2-3) شکل د هايډروکسيل دگروپ مودل

هغه عضوي مرکبه چې د هايډروکسيل گروپ لري، د الکولونو (Alcohol) په نوم يادېږي، د الکولونو عمومي فورمول $R-O-H$ دی چې په دې فورمول کې R د هايډروکاربونونو راديکالونه ښيي دکاربن اتوم چې هغه سره د الکولو د هايډروکسيل گروپ (OH-) نښتی دی ، د دې گروپ سره يوځای د کاربينول $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{C} \end{array}$ (Carbinol) په نوم يادېږي د کاربينول گروپ د کاربن د اتومونو داپکوله کبله ، الکولونه د لومړني ، دويمې او درېيمې الکولو په نوم يادېږي: که چيرې د کاربينول گروپ د کاربن اتوم خپل يو ولاسي الکترول ته د کاربن يو اتوم ته داپکې د جوړېدو په غرض په مصرف رسولې وي ، دا ډول الکول د لومړي الکول په نوم يادېږي . همدارنگه که دوه وولايسي الکترولونه يې په کار وړي وي ، دويمې الکول او که درې وولايسي الکترولونه يې داپکو دجوړښت لپاره کارولې وي ، د درېيمې الکول په نامه يادېږي:

فعاليت



لاندې فورمولونو ته څيرشئ ، د لومړني ، دويمې او درېيمې الکولونو ډولونه په کې وپيژنئ او همدا رنگه روښانه يې کړئ چې څلورمې الکول او دهغه څخه په لوړه کچه هم شتون لري او يانه ؟




3- د الډيهايډونو او کيتونونو وظيفه يي گروپونه (کاربونيل)

کاربونيل گروپ د يو اتوم کاربن او يو اتوم اکسيجن څخه تشکيل شوی دی چې دکاربن او اکسيجن د اتومونو ترمنځ دوه گونې اړيکه جوړه شوېده . د کاربونيل په گروپ کې دکاربن - اکسيجن ترمنځ اړيکه دوه گونې ده چې دهغوی يوه اړيکه



سگما (σ) او بڼه يې پای (π) ده او ددې اړیکو ترمنځ زاویه 120° ده، د دوه گونې اړیکې اوږدوالی $1.24 \text{ \AA}$ دی، کاربن د کاربونیل په گروپ کې sp^2 هایبرید لري او د هغه جوړښت مسطح دی چې لاندې شکلونه دا جوړښت رانښيي:




(3-2) شکل د کاربونیل د گروپ جوړښت او فورمول يې

د $C=O$ دوه گونې اړیکه د $C=C$ دوه گونې اړیکې پر خلاف، د اکسیجن د الکترونیګاتیف عنصر دشتون پر بنسټ چې د π اړیکې الکتروني کثافت ځانته کشوي، زیاته قطبي ده، دې قطبیت د کاربونیل مرکبونو (الډیهایدونه او کیتونونه) په کیمیايي او فزیکي خواصو اغیزه اچولې ده چې ډیر زیات الډیهایدونه او کیتونونه په اوبو کې خورا ښه حل کېږي.

4- د کاربوکسیل وظيفه يې گروپ (Carboxylic Group) او د هغه مرکبونه

د کاربوکسیلیک تیز اونیو گروپ د کاربوکسیل په نوم یادېږي چې د هغه فورمول $COOH$ - او ساختماني فورمول يې په لاندې ډول دی:



(3-3) شکل د کاربوکسیل د گروپ لرونکي د اسید د مالیکول مودل

د کاربوکسیل گروپ له کاربونیل گروپ او د یو هایډروکسیل گروپ څخه جوړ شوی دی چې زیاتره $COOH$ - په بڼه لیکل کېږي؛ خو د $O-H$ ترمنځ اړیکه هیڅ وخت شتون نه لري. دا گروپ کېدای شي پروتون ورکړونکي (Proton - Donator) عمل وکړي او د کاربوکسیلات په آیون COO^- بدل شي، په دې آیون کې د اکسیجن دواړه لومړنۍ عین ارزښت لري؛ ځکه په هغه کې د (π) الکترون د ریزونانس په حالت کې دی:



ټول هغه مرکبونه چې په خپل مالیکولي ترکیب کې د کاربوکسیل گروپ ولري، د کاربوکسیلیک اسید په نوم یادېږي.


د کاربوکسلیک اسیدونو د اړیکو ځانګړتیاوي چي لاندې لیکل کيږي، د اکسیجن ، هایدروجن او کاربن د اټومونو شتون د بیلا بیلو الکترولیتونو سره ، د هغوی مالیکولونه قطبي کوي .

(3 - 4) جدول دښارونو فیزیکی ځانګړتیاوي



د ایشیدونکي	د ويلي کیدونکي	Pka_2	Pka_1	مروج نوم	فورمول
101C°	8°C		3.75	فارمیک اسید	H - COOH
118°C°	17°C		4.75	اسیتیک اسید	CH ₃ - COOH
189°C°	63°C		2.86	کلرواسیتیک اسید	CH ₂ Cl - COOH
141C	-21°C		4.87	پروپانویک اسید	CH ₂ - CH ₂ - COOH
249C	122°C		4.20	بنزویک اسید	C ₆ H ₅ COOH
	تخریب	190°C(d)	4.28	اکزالیک اسید	HOOC - COOH
	تخریب	136°C(d)	5.69	مالویک اسید	HOOC - CH ₂ - COOH

5- د ایتروکروپ (-O-)

هغه مرکبه چي په هغو کي د اکسیجن اټوم د هایدروکاربنونو د دوو پاتي شونو سره وصل وي د ایتروپه نوم یا ډیري او د دي ګروپ جوړښت (-O-) دي، د ایترونو عمومي فورمول په لاندې ډول دی:



که فرض کو چي الکولونه د اوبو له مالیکول څخه مشتق دي ، داسي چي د اوبو دمالیکول یو اټوم هایدروجن د عضوي پاتي شونو سره تعویض شوي وي، الکول لاس ته راځي او که بل دهایدروجن اټوم یي هم تعویض شي ، ایترو حاصلیږي ، د بیلګې په ډول :




(3 - 4) شکل د دای ایتایل ایترو مالیکول مودل

6- د امینونو وظیفه یي ګروپ (-NH₂)


د امین ګروپ (-NH₂) د هایدروجن دوو اټومونو او د نایترجن له یو اټوم څخه جوړشوی دی چي په رښتیا سره د امونیا دمالیکول یو اټوم هایدروجن له هغه څخه په هومولیتي ښه بیل اوبه پایله کي داګروپ حاصل شوی دی . که



چیري د دي گروپ اړيکه د هایدروکاربنونو د رادیکالونو سره جوړه شي ، د امینونو مرکونه تشکیلېږي . د امینونو عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي:



په ټولو حالتونو کې د امینونو مالیکول هریمي جوړښت د مثلي قاعدې لرونکی دی چې د نه اړیکې یوه جوړه الکترون د نایترون جن د SP^3 هایبرید اوریټال څخه دي چې دهغود زاویو سره توپیر لري ، زیاتره امینونه په طبیعي موادو او یا په ترکیبي محصولاتو کې موندل شوي دي او دهغوی ډیر مرکبونه وړان بوی لري، د عضوي موادو د پروټینونو په ترکیب کې نایترون جن شامل دی او امینونه هم د ژونديو موادو له تجزيه او وړانیدلو څخه وروسته د سلفر لرونکو مرکبونو سره وړان بوی منځته راوړي، د دوو ډولو مرکبونو نوم $\{\text{NH}_3(\text{CH}_2)_n\}$ پیوترسین (Putrescine) د تعفن (بدبوی) په معنا او $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_x\text{NH}_2$ کداوبرین (Cadaverine) د جسد بدبوی په معنا د قیقا د مرو جسدونو د تعفن څخه اخیستل شوی دی .



(3- 5) : شکل د امینونو جوړښت او مودل (a - امونیا b - میتیل امین

c - ډای میتیل امین d - ترای میتیل امین

فعالیت


زده کوونکي په اړونده گروپونو ویشی، هرگروپ دي د کاغذ خمیره، سربښت او د اړتیا نور مواد برابر کړي او ددې موادو څخه دي د ایترو، الډهایډونو، کیتونونو او امینونو مودلونه جوړ کړي او د هغوی په هکله دي د هرگروپ نماینده ټولگي کې توضیحات ورکړي .

7- د ټیول گروپ ، سلفایډونه

د ټیول گروپ (H-S-) دیو اتوم سلفر او یو اتوم هایدروجن څخه جوړ شوی دی چې د هایدروجن سلفایډ (H-S-H) دیو اتوم هایدروجن د اړیکې د پرې کیدو په پایله کې حاصلېږي ، دا پریکړه د هومولیتیکي په





بڼه ترسره کيږي، د دې مرکبونو عمومي فورمول $R-S-R$ دی چې الکولونو ته ورته دي. که چيرې د تيمول دگروپ دويم هايډروجن هم په عضوي پاڼې سره تعرض شي، سلفايډونه جوړيږي چې دهغوی عمومي فورمول (MercaptoGroup) دي، د مرکبونه ايترونو ته ورته دي او توپيري د ايترونو سره دادی چې په ايتروکسي اکسيجنې وظيفه يې گروپ شته، خو په تيمو ايترونو کې سلفر شتون لري، دا وظيفه يې گروپ د مرکبو گروپ (Mercapto Group) په نوم هم يا ډيري. د تيمول او تيماتيتر د مرکبونو ساده بيلگې لاندې ليکل شوي دي:



8- د ايترونو وظيفه يې گروپ

د ايترونو وظيفه يې گروپ $-C(=O)-O-$ دی چې په دې گروپ کې د اکسيجن د ائوم يو ازاد ولانسي الکټرون او کاربن د ائوم يو طاقه الکټرون د عضوي راډيکالونو د کاربن د ائومونو د يو ازاد الکټرون سره اړيکه تړلې ده او د ايترونو په نوم مرکبونه يې جوړکړي دي. په رښتيا که چيرې د کاربوکسيل د گروپ د هايډروجن ائوم د عضوي بڼو سره تعرض شي، ايترونه تشکيلېږي. د ايترونو عمومي فورمول عبارت له:



(3-7) شکل د ميتايل ايتايل ايسټر د مالیکول مودل

فعاليت

زده کوونکي په مناسبو گروپونو وروستی، هرگروپ دي د ايسټر د مالیکول مودلونه د لرگيو، درس د خاورې د خټو او يا کاغزو څخه جوړکړي دگروپ نماينده دې د خپل گروپ دگړي په هکله لازم توضيحات وړاندې کړي.



د دریم چیرکي لنډیز

- * عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن د مرکبونو او د هایدروکاربنونو د مشتقاتو څخه عبارت دي .
- * په عمومي ټول عضوي مرکبونه د کاربنې اسکلیټ او د وظیفه یي گروپونو د شتون له کبله ویشل شوي دي
- * په عمومي ټول هایدروکاربنونو په دوو ټولو ایسکلیک او کاربوسکلیک ویشل شوي دي
- * ایسکلیکونه زنځیري مرکبونه دي چې دهغوی زنځیر کېدای شي نارمل او یا ښاخ لرونکي وي
- * سکلیکونه په دوه گروپونو کاربو سکلیک او هتروسکلیک ویشل شوي دي .
- * کاربوسکلیک مرکبونه هغه مرکبونه دي چې د تړلي زنځیر (کری) لرونکي دي او په ایسکلیکونو او اروملونو ویشل شوي دي ، ایسکلیکونه هم په خپل وار په سایکلو الکانونو او سایکلو الکینونو ویشل شوي دي ، د هایدروکاربنونو هومولوگونه زیات د هایدروکاربنونو د مرکبونو څخه عبارت دي چې یو ډبل څخه ډیو میتلین $(-CH_2-)$ گروپ په اندازه توپیر لري .

* که چیرې د هایدروکاربنونو د هایدروجن یو لویا څو لټومونه د وظیفه یي گروپونو په واسطه یې ځایه شي ، نو هغه مرکبونه لاس ته راځي چې د هایدروکاربنونو د مشتقاتو په نوم یا ډیرې او عبارت له هلوچنې ، اکسیچنې ، نایټروجنې ، سلفرې ، فاسفورې او نورو عنصرنو مشتقات دي . دا عنصرونه د وظیفه یي گروپونو په بڼه د هایدروکاربنونو په مرکبونو کې شتون لري چې د نوموړو مرکبونو کیمیايي خواص ټاکي .

* وظیفه یي گروپونه د هلوچن لرونکي ، اکسیجن لرونکي ، نایټروجن لرونکي ، سلفر لرونکي او په نورو ویشل شوي دي

- * هغه مرکبونه چې اکسیجنې وظیفه یي گروپونه لري ، د الکولونو ، الیهایډونو ، تیرلونو ، ایترونو ، ایسترونو او نورو څخه عبارت دي چې په ترتیب سره یې فورمولونه
- $R-OH$ ، $R-C(=O)-H$ ، $R-C(=O)-R$ دي .
- * هغه مرکبونه چې نایټروجن لرونکي وظیفه یي گروپ لري ، امینونو ، امایډونو او نور دي چې د هغوی فورمولونه په ترتیب سره $R-NH_2$ ، $R-NH_2-C(=O)-R$ دي
- * هغه مرکبونه چې د سلفر لرونکي وظیفه یي گروپونه لري ، عبارت له $H-S-R$ ، $R-S-R$ او نورو څخه دي .

د دریم څپرکي پوښتي

څلور ځوابه پوښتي:

- 1- د لاندې عنصرونو له جوړو څخه د کومو شتون د عضوي مرکبونو په ترکیب کې حتمي دي ؟
 الف - کاربن او سلفر
 ج - کاربن او فاسفورس
 ب - سلفر او هایدروجن
 د - کاربن او هایدروجن
- 2- هغه هایدروکاربنونه چې نیو مستلین د گروپ ($-CH_3$) په اندازه یو له بل څخه توپیر ولري د----- په نوم یادېږي .
 الف - ایزولوگ ب - ایزومیر ج - هومولوگ د - غیر مشبوع
- 3- د لاندې فورمولونو څخه کوم یو د ایترونو عمومي فورمول دي ؟
 الف - $R-O-R$ ب - $R-C-H$ ج - $R-S-H$ د - الف و ج هر دو
 4- د تیولونو عمومي فورمول عبارت له :----- څخه دی .
 الف - $R-OH$ ب - $R-NH_2$ ج - $R-S-H$ د - $R-S-R$
- 5- په تیزابي مرکبونو کې وظیفه یې گروپ عبارت له ----- څخه دی .
 الف - $R-C-H$ ب - $R-C-O-H$ ج - $R-C-O-R$ د - $R-C-H$
- 6- ساده مرکبونه چې د کاربن سربیره او هایدروجن هم دهغو په ترکیب کې موجود وي د----- په نوم یادېږي
 الف - الکان ب - الکین ج - هایدروکاربنونه د - الکانونو مشتقات
- 7- د الکیل هایدونو عمومي فورمول عبارت د----- دی .
 الف - $R-OH$ ب - $R-X$ ج - $R-S-H$ د - $R-S-R$
- 8- وظیفه یې گروپونه عبارت له اتوم او یا د اتومونو له ډلو څخه عبارت دي چې د اړیکو په واسطه یوځای او د ټاکلي مرکب په یو مالیکول کې شامل دي او----- ټاکي
 الف - دمرکب ټولگي ب - مالیکولي ترکیب ج - دمرکب مشتقات د - الف او ج دواړه.
- 9- $R-OH$ د-----عمومي فورمول دی :
 الف - تیزاب ب - الفلی ج - الکل د - الدهاید
- 10- هایدروکاربنونه په عمومي ډول په-----ویشل شوي دي :
 الف - دوو ب - دریو ج - څلورو د - پنځو
- 11- هتروسکلیکونه هغه مرکبونه دي چې دهغوی په ترتیب کې بیګانه عنصرونه ؛ لکه :----- شتون لري :
 الف - سلفر، اکسیجن ب - نایترجن او نور ج - الف او ب دواړه د - هیلېج یو
- 12- تیو ایترونه الکلونو ته ورته دي ؛ خو دهغو توپیر د ایترونو سره په دې کې دی چې په ایترونو کې د اکسیجن وظیفه یې گروپ شامل دی ؛ لکن په تیو ایترونو ----- شتون لري .



الف- نایتروجن ب- فاسفورس ج- سلفر د- نایتروجن

13- د کیتونونو وظیفه یی گروپ د----- خخه عبارت دی .

الف- کاربونیل ب- کاربوکسیل ج- هایدروکسیل د- هیتچ یو
14- هغه هایدروکاربونونه چي د تولي زنجیر لرونکي دي ، د----- په نوم یا دیري :
الف - سکلیکو نو ب - الیسکلیکونو ج - اروماتونو د - ټول "

تشریحي پوښتنې:

1- د هایدرورکاربنونو د هومولوگ د سلسلې په اړه لنډه معلومات وړاندې کړئ.

2- وظیفه یی گروپونه په لنډه ډول توضیح کړئ

3- لاندې عمومي فورمولونه وگورئ او ولیکئ چي د کومو عضوي مرکبونو پورې اړه لري .




4- د کاربونیل وظیفه یی گروپ په لنډه ډول توضیح کړئ.

5- د کاربوکسیل د وظیفه یی گروپ په اړه لازم معلومات وړاندې کړئ.

څلورم څپرکی

الکانونه او سایکلو نونه




هغه مرکبه نه چې په هغو کې دکاربڼ اتومونه د زنځير يا کرۍ په بڼه يو له بل سره اړيکي لري او په هغو کې دکاربڼ ټول اتومونه د يوگونې سگما اړيکې (σ) لرونکي دي ، د الکانونو اویا د سایکلو الکانونو په نامه ياد شوي دي . په دې مرکبونو کې دکاربڼ اتومونه sp^3 هایدريد لري او دکاربڼ د اتومونو ترمنځ يوه گونې اړيکه شته ، الکانونه دکاربڼونو زنځيري ماليکولونو لرونکي او سایکلو الکانونه د تړلو زنځيرونو او کرپو لرونکي دي . په دې څپرکي کې به پوره شئ چې الکانونه او سایکلو الکانونه دکومو ډولونو مرکبونو لرونکي دي ؟ دهغوي طبيعي سرچينې کومې دي ؟ دکومو خاصو لرونکي دي ؟ په کومو برخو کې په کار ورل کيږي ؟ د الکانونو او سایکلو الکانونو ترمنځ توپير ونه کومو فکتورونو سره اړيکه لري ؟ په دې څپرکي کې به لومړي سر کې الکانونه روښانه کوو او وروسته د سایکلو الکانونو په څيړنو پيل کوو.



1-4 : الکانونه (Alkanes)

الکانونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی د کاربن د اتومونو ترمنځ یوه گونې ساده اړیکه شتون لري او د کاربن د اتومونو نورې اړیکې ولانسونه د هایدروجن داتومونو په واسطه ډک شوي دي . دهغو ساده مرکبونه میتان CH_4 او ایتان (C_2H_6) دي.

د میتان مالیکول د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دي او په هغه کې $C-H$ د کاربن د sp^3 هایدريد اوربیتال او هایدروجن s اوربیتال د نیغ پر نیغ د ننوتې په پایله کې جوړېږي او د اړیکې ډول یې مستحکمه σ ده .
(1-4) شکل کې زوایه ، د اړیکې اوږدوالی او هم د میتان د مالیکول څلور وجهي جوړښت ښودل شوی دی ، داسې چې د اړیکې اوږدوالی د پیکامتر $10^{-12} m$ په واسطه ښودل شوی دی .
په یو مالیکول کې د اړیکو د ښودلو لپاره نړیوالې تړون د (2-4) شکل سره سمون لري ، داسې چې نړي خطونه $C-H$ دهغو اړیکو ښودونکي دي چې په سطحه کې شتون لري ، مثلي علامه ($\blacktriangle$) د سطحې پرمخ اړیکه او مثلي ($\triangle$) علامه د سطحې د شا اړیکه ښیي :




(1 - 4) شکل د میتان د مالیکول د ښودلو دوه بیلا بیلې طریقې ښیي



(2 - 4) شکل د میتان او ایتان په مالیکول کې نړیواله تړون ښیي

د ایتان مالیکول د اړیکو ، ښودلو لپاره کېدای شي چې د میتیل CH_3 - دوو پاتو یو ډل سره د اړیکو د جوړښت په پام کې ونیول شي . د میتیل (CH_3 -) په گروپ کې د کاربن هر اتم د sp^3 آزاد هایدريد لري او یو ډل سره د تړون په وخت کې sp^3 - هایدريد اوربیتالونو نیغ برنیغه ننوتنه په سترگو کېږي چې د $C-C$ اړیکه جوړوي او په (4 - 3) شکل کې ښودل شوې ده:



(4-3) شکل د لرگړو مولدو په واسطه د ایتان د مالیکول فضایی ښودنه

د الکانونو عمومي فورمول ($C_n H_{2n+2}$) دی چې دهغوی د گروپ لومړنی مرکب میتان اودویم بې ایتان او داسې نور دي چې یو له بل څخه د یو میتلین گروپ $-CH_2-$ په اندازه توپیر لري. په (4-1) جدول کې د دې کورنۍ د یو شمیر مرکبونو نومونه ، ایشیدونکي او د هغوی یو ولانسه راډیکالونه ښودل شوي دي ، د یا دولورو ده چې ane ورسټاري (Alkane) د نوم سره اړیکه لري ، د هغه په راډیکال کې په Alkyl)بدلیږي .


(4-1) جدول د الکانونو نوم او دهغوی اړوند راډیکالونه ښیي

نوم	فورمول	د ایشیدونکي	راډیکال	فورمول
Alkane	$C_n H_{2n+2}$	-	Alkyl	$-C_n H_{2n+1}$
Methane	CH_4	$-161^\circ C$	Methyl	$-CH_3$
Ethane	CH_3-CH_3	$-89^\circ C$	Ethyl	CH_2CH_2
Propane	$C_3 H_8$	$-40^\circ C$	Propyl	$C_3 H_7-$
Butane	$C_4 H_{10}$	$-0.5^\circ C$	Butyl	$C_4 H_9-$
Pentane	$C_5 H_{12}$	$36^\circ C$	Pentyl	$C_5 H_{11}-$
Hexane	$C_6 H_{14}$	$68^\circ C$	Hexyl	$C_6 H_{13}-$
Heptane	$C_7 H_{16}$	$88^\circ C$	Heptyl	$C_7 H_{15}-$
Octane	$C_8 H_{18}$	$126^\circ C$	Octyl	$C_8 H_{17}-$
Nonane	$C_9 H_{20}$	$151^\circ C$	Nonyl	$C_9 H_{19}-$
Decane	$C_{10} H_{22}$	$174^\circ C$	Decyl	$C_{10} H_{21}-$




4-1-1: د الکانونو ایزومیری

په الکانونو کې ایزومیری د بیوتان د مرکب څخه پیل کېږي؛ د بېلګې په ډول: بیوتان دوه ایزومیري لري چې د هغوی ساختماني فورمولونه په لاندې ډول دي:



N-butane

Isobutan



(4-4) شکل د نارمل بیوتان او ایزو بیوتان د مالیکول د جوړښت مودل

د یادولو وړ ده چې د مرکبونو د ایزومیریو فزیکي خواص یو له بل څخه توپیر لري؛ د بېلګې په ډول: د نارمل بیوتان د ایشیدو تکی 0.5°C - او کثافت یې 0.106g/cm^3 دی؛ نو په داسې حال کې چې د ایزو بیوتان د ایشیدو تکی 11.6°C - او دهغه کثافت 0.549g/cm^3 دی.

په زنځیري الکانونو کې دهغوی په مالیکول کې کاربن د اټومونو د شمیر (n) په زیاتولو سره د ایزومیری شمیر هم زیاتیږي، لاندې جدول وگورئ:


(4-2) جدول د ځینو الکانونو ایزومیری

د کاربن د اټومونو شمیر	مالیکول فورمول	د ایزومیری شمیر
n=4	C_4H_{10}	3
n=6	C_6H_{14}	5
n=8	C_8H_{18}	18
n=10	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	75
n=20	$\text{C}_{20}\text{H}_{42}$	تقریباً 366 زره
n=40	$\text{C}_{40}\text{H}_{82}$	$6.0 \cdot 10^{13}$ په شاوخوا


4-1-2: د IUPAC د قاعدې پر بنسټ د الکانونو نوم ایښودنه :


د عضوي مرکبونو نوم ایښودنه د ځانګړې اهمیت څخه برخمنه ده، ځکه د مرکبونو ډیرو والي ته په پام سره (له شل ملیونو څخه ډیر) او د هغوی د ورځنۍ ډیرو والي له کبله نه شي کیدای چې د هغوی نوم ایښودنه د قاعلو څخه د باندې ترسره شي ، د IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) تجربې او خالصې کیمیا د نړیوالې اتحادې نوم ایښودنې لاره یې په پام کې نیولې ده چې د هغې پر بنسټ کیدای شي د عضوي مرکبونو نوم ایښودنه ترسره شي : د Metha، Etha، propa، Buta، penta، د الکانونو لومړني مرکبونه دي ، بلیاست ؛ اوهم Butane ، propane ، Ethane ، Methane چې د الکانونو لومړني مرکبونه دي ، بلیاست ؛ څرنگه چې لیدل کېږي د (ane) وروستاړی د نومونو رقمونو د نوم په پای کې لیکل شوي دي چې د مرکب د ټول ټاکوونکي دي او دا رقمونه په مطلب مرکب کې د کاربن د اتومونو شمیر ټاکي. (4-1) جدول د ځینو الکانونو نومونه نښتي .

څه چېرې د الکانونو د مالیکول څخه د هایدروجن یو او یا څو اټومه لرې کړې شوې وي او د مالیکول څخه داسې ذرې چې طاقه الکترونونه ولري ، جوړې شوې وي ، داسې ذرې د رادیکال (Radical) یاد فعاله عضوي پاتې په نوم یا دوي، که دا د پام وړ مرکبونه الکانونه وي او د هغوی په مالیکول کې د کاربن د اتوم یو ولاسي الکترون پرته د جوړه کیدلو پاتې وي ؛ د الکیل (Alkyl) په نوم یا ډیري . په دې مرکبونو کې د ane وروستاړی د یو طاقه الکترون د لرلو په ښه په yl تعویض او د هغوی د رادیکال نوم لاس ته راځي ؛ دیلګې په ډول :




د ښاخ لرونکي زنځیري الکانونو نوم ایښودنه داسې ترسره کېږي چې لومړی د الکانونو په مالیکول کې اوږد زنځیر ټاکل کېږي او د کاربن په اتومونو یې نمبرونه وهي او د زنځیر نمبرونه د هغې خواړې څخه پیل کېږي چې ښاخونه یې ورته نژدې وي ؛ نو په دې صورت کې لومړی د هغو کاربنونو نمبر 1، 2، 3، ---- چې هغه سره معارضه نښتي ده ، لیکي او ورپسې یې د معارضو نومونه لیکل کېږي ، د پاتې (بقیې) او اړوند کاربن نمبر ترمنځ د (-) علامه لیکل کېږي . د پاتې شونو د نوم لیکنه په نوم ایښودنه کې د کوچنیوالي او غټوالي پر بنسټ او یا په انګرېزي الفبا کې د هغو نوم د لومړي توري د مخکې والي پر بنسټ ترسره کېږي او په پای کې د اوږد زنځیر لرونکي الکانونو نوم په مرکب کې لیکل کېږي . کله چې ورته پاتې شونې په اوږد زنځیر کې شتون ولري ؛ نو د هغوی شمیر په Tetra ، Tri ، Di او نورو ټاکل کېږي ؛ دیلګې په ډول :






2,2,4,4-tetramethylpentane



2-methyl-3-ethyl-4-isopropyl hexane


4-1-3: د بناخ لرونکو الکانونو اشتقاقی نوم ایښودنه

په دې ډول نوم ایښودنه کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل شي چې د لومړني ، دویمي ، دریمي او څلورمې کاربن څخه عبارت دی . د کاربن اتومونه چې د عضوي مرکبونو په مالیکول کې خپل یو ولاسني الکترون د بل کاربن داتوم سره د اړیکې د جوړولو لپاره کارولي وي ، د لومړني کاربن (primary carbon) په نوم یادېږي، که چېرې د کاربن د اټوم دوه الکترونونه د کاربن دوه نور اتومونه سره د اړیکې د جوړېدو لپاره کارولي وي ،د دویمي کاربن (carbon secondary) په نوم یادېږي او همدارنگه که د کاربن درې ولاسني الکترونونه د کاربن د درې نورو اتومونو سره د اړیکې د جوړېدو لپاره کارولي وي ، د دریمي کاربن (Tertiary carbon) او که د کاربن د اټوم څلور واړه ولاسني الکترونونه د کاربن د څلورو نورو اتومونو سره د اړیکې د جوړېدو لپاره په کار وړي وي ،د څلورمې کاربن (quaternary carbon) په نوم یادېږي؛ لکه:




لومړني P =
دویمي S =
دریمي T =
څلورمې Q =

په اشتقاقی نوم ایښودنه کې هغه کاربن چې د کاربن د نورو ټیرو اتومونو سره اړیکه ولري ،د مرکز په توګه منل شوی دی او د Methane په نوم یا د شوی دی او هغه پاتې شوني چې له همدې کاربن سره اړیکه لري ، د رادیکالونو (الکایلونو) په توګه منل شوي دي ، په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شوو، وروسته د منځنیو او بیا د لویو پاتې شوو نوم لیکل کېږي او د نوم په پای کې د (Methane) کلمه ذکر کېږي .



Dimethyl methane Methyl dieyl methane



Dimethyl ethyl isopropyl methane



4-1-4: د الکانونو فزیکي خواص

په لاندیني جدول کې د الکانونو ځینې فزیکي خواصو لیکل شوي دي
(3-4) جدول د الکانونو ځینې فزیکي خواصونه

نوم	فورمول	دوبلې کیدونکې $^{\circ}\text{C}$	د ایشیدونکي	ځانګړې کثافت
Methane	CH_4	-182.5	-161.5	0.424
Ethane	C_2H_6	-183.7	-88.6	0.546
Propane	C_3H_8	-187.6	-42.2	0.585
Buhane	C_4H_{10}	-138.3	-0.5	0.579
Penhane	C_5H_{12}	-129.7	+36.1	0.626
Hexane	C_6H_{14}	-95.3	68.8	0.659
Hephane	C_7H_{16}	90.6	98.4	0.684
Decane	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	-30.0	173.0	0.730
Tetradecane	$\text{C}_{13}\text{H}_{28}$	+5.5	253.0	0.764
Pentadecane	$\text{C}_{15}\text{H}_{32}$	10.0	270.5	0.769
Hexadecane	$\text{C}_{16}\text{H}_{34}$	18.1	287.5	0.775
Eicosane	$\text{C}_{20}\text{H}_{42}$	36.5	344.0	0.778
pentacontane	$\text{C}_{50}\text{H}_{102}$	93.0	421.0	0.942
Hectane	$\text{C}_{100}\text{H}_{202}$	115.5	-	-

څرخګه چې په جدول کې لیدل کېږي، د دې کورنۍ د هومولوګ لومړي څلور مرکبونه په ټاکل شوو شرایطو کې د گاز په حالت موندل کېږي او د 5 تر 16 کاربنونو لرونکي بې د مایع په حالت او د 16 څخه لوړ کاربن لرونکي الکانونه په جامد حالت دي. د الکانونو په هومولوګي سلسله کې د ایشیدونکي، ولیدکیدو ټکي او مخصوصه کثافت په پرله پسې توګه زیاتوالی مومي. د الکانونو په ایزومېرو کې هم د ایشیدو درجه توپیر لري، داسې چې د نارمل ایزومېرو د ایشیدونکي لوړ او هغه ایزومېری چې ډیر پښاخونه ولري، د ایشیدو ټکی بې ټیټه دی؛ ځکه په پښاخ لرونکو الکانونو کې د واندروالس قوه ډیره لږ او د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیر ټیټه ده، نو له دې کبله په لږه تودوخو باندې ایشیږي.

فکر وګړۍ




د لاندې جمعې فورمولونو لرونکي نارمل زنجیري الکانونو د مرکبونو څخه کوم یو په چټکۍ سره وېلي کېږي؟ $\text{H}_{92}\text{C}_{45}$ او $\text{H}_{66}\text{C}_{32}$ د مایع الکانونو سرېښاکوالی د هغوی د کاربن د لومونو د شمیر په زیاتوالي (نسبتي مالیګول کتنه) ډیر پورې





فعالیت

لاندې شکلو نه وگورئ وړایئ چې کوم الکانون له بل څخه په چټکتیا په پیالو کې تو سیري؟



(4-5) شکل : الف - د $C_{12}H_{26}$ د حرکت چټکتیا ، ب $C_{16}H_{34}$ د حرکت چټکتیا

4-5-1: د الکانونو کیمیايي خواص

د الکانونو کیمیايي فعالیت ډیر لږ دی ، له دې کبله هغوی د پارافین (Paraffins) یعنې د لږ میل لرونکي په نوم یا دوي . څرنگه چې د الکانونو په مالیکولونو کې ټولې اړیکې یو گوښې او (δ) له ډول څخه دي ؛نو له دې کبله یوازې تعویضي تعاملونه تر سره کولی شي .


الکانونه د اکسیجن سره تعامل کوي عضوي اکسیجن لرونکي مرکبونه جوړوي. لاندې د الکانونو ځینې تعاملونه مطالعه کوو :

4-5-1: د الکانونو اکسیدیشن

الکانونه په عادي شرایطو کې د هوا د اکسیجن او اکسیدانتونو په مقابل کې کلک دي ، که چېرې پارافینونه په هوا کې وسوزول شي ، دا مرکبونه په اوبه رنگه لمبه سوزي چې کاربن ډای اکساید ، او به او انرژي تولید وي:



الکانونه د سون بڼه توکي دي او د هغوي له سوزولو څخه ډیره انرژي تولیدیږي ؛ د بیلګې په ډول :




د یو کیلوګرام میتان له سوزولو څخه 57000 کیلو ژول انرژي ازاد دیږي ، سون د پارافینو د ډیروځانګړو تعاملونو له ډلې څخه دي چې په عملي چارو کې له هغو څخه ګټه اخېستل کیږي . طبیعي ګاز د هایدروکاربنونو مخلوط دی ، د اګاز 90% له میتان څخه تشکیل شوی دی .

د الکانونو له اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کیدای شي الکولونه ، الیهایدونه او تیزابونه لاس ته راوړل شي چې د پورتنیو مرکبونو د لاس ته راوړلو په اړه به معلومات وړاندې شي ، په دې برخه کې به د ځینو عضوي مرکبونو سون مطالعه کوو.

کله چې میتان د هوا د اکسیجن په واسطه د کتلست په شتون کې اکسیدیشن شي ، میتانول ، فارم الیهاید او



فارمیک اسید تولیدیږي:



(4-6) شکل د طبعي گاز سوزول

4-1-5-2: ډګر ګڼګ (Cracking) تعامل


کله چې الکانونو ته له 400 څخه تر 600 پوري تودوخه ورکړل شي، په دې صورت کې د الکانونو د ماليکولونو ډګارین - کارین د اړيکو متجانسه پریکړه ترسره کېږي چې دې عمليې ته د ماتېدنې (Cracking) عمليې وایي. Cracking انګلیسي کلمه ده چې د ماتولو یا د څیړولو په معنا ده، په دې ځای کې هم په همدې مفهوم په کار وړل شوی ده او په مشبوع او غیر مشبوع کوچنیو هایدروکاربنونو د لویو هایدروکاربنونو له ماتېدلو څخه عبارت ده:

$$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3 - \text{CH}_3 + \text{CH}_2 = \text{CH}_2$$

په صنعت کې د ماتېدنې تعامل بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخو په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته د اومو نفتو څخه قیمتي کوچنۍ اجزايې؛ لکه: پترول، دیزل، د خاوروتیل او نور لاس ته راوړي

4-1-5-3: هلوچښن

هلوچښن د الکانونو د ډیرو مهمو تعاملونو له ډلې څخه دي، د هلوچښن په بهیر کې له کلورین سره، فلورین هم په کار وړل کېږي، ایردین د الکانونو د هایدروجن په نیغ (مستقیم) تعرض باندې قادر نه دي، خو فلورین په چټکۍ سره اغیزه اچوي چې باید د فلورینشن په عملې کې پاملرنه ورته وشي. د الکانونو کلورینشن د تودوخې په 300°C کې ترسره کېدای شي، د میتان د کلورینشن بهیر په خوږ اوزونو کې کېدای شي چې لاندې لیدل کېږي:



4-1-6: د الکانونو لاس ته راوړنه

الکانونه په نفتو کې په زیاته کچه د مخلوط په بڼه شته چې کیدای شي هغه له نفتو څخه جلا شي ، همدارنگه طبيعي گاز د گازي الکانونو مخلوط دی ؛ خو الکانونه کیدای شي په لاندې لارو هم په لاس راوړل شي :

1 - **د ورتس سټیز په طريقه** : د الکانونو د لاس ته راوړلو ډیره مهمه طريقه د ورتس طريقه ده ، په دې طريقه کې د هایدروکاربنونو هلايدونه د فلزي سوډيم سره تعامل کوي ، په پایله کې الکان لاس ته راځي :



Alkylhalide Alkane




Methylchloride Ethane

فعاليت

د الکان کوم هلايد ته د سوډيم سره تعامل ورکړل شي چې هگران تشکیل شي ؟
که چېرې *Iodobutane* - 2 ته د سوډيم سره تعامل ورکړل شي ، کوم الکان به حاصل شي ؟ د دهغوی د تعامل معادله ولیکئ .

2 - په 1901 کال کې د ګرينارډ (Victor Grignard) په نوم یو عالم د مګنیزیم هلايد عضوي مرکب د لاندې معادلې سره ترلاسه کړ :





فعاليت


د ګرينارډ د تعامل پر بنسټ د لاندې مرکبونه لاس ته راوړئ او دهغوي کيميايي معادلې ولیکئ




3 - د الکیل هلايدونو د ارجاع کولو څخه هم کیدای شي الکانونه لاس ته راوړل شي ، دا سې چې الکیل هلايدونه د جستو د فلزونو سره تعامل وکړي ، په پایله کې د الکان او جستو هلايد حاصلېږي :



4- د کاربوکسیلیک اسیدونو د فلزني مالګو د سولایم (سولیم هایدروکساید او د چوړني مخلوط) د تودوخې ورکولو څخه کېدای شي الکانونه لاس ته راوړل شي:



5- د نیکل ، پلاتین او نورو کتلستونو په شتون کې د الکینونو او الکانونو له هایدروجنشن څخه د هغوی ایزولوګ الکانونه حاصلېږي



1-4-7: میتان (Methane)

د پارافینو هایدروکاربنونو ډیر ساده مرکب، میتان دی چې په بیلابیلو نومونو یادېږي اودنومونه یې د پیدایښت بیلا بیلو بڼو سره اړیکه لري ، څرنگه چې داګاز د عضوي توکو د خوساکیلو له امله په خنډونو کې لاس ته راځي ؛ له دې کبله د خنډ د ګاز په نوم یادېږي ، همدا رنگه داګاز په کانوونو کې هم پیدا کېږي ، پردې بنسټ د کانونو دګاز په نوم هم یاد شوی دی ، په کانونو کې د میتان د ګاز تراکم د وړونکو او خطرناکه چاودنولامل کېږي ، له دې کبله نوم هم یا د شوی دی ، په کانونو کې د میتان د ګاز تراکم د وړونکو او خطرناکه چاودنولامل کېږي ، له دې کبله (Firedamp) یعنې د اور منځته راوړونکي ګاز په نوم هم یادېږي .

د لویو سیارو اتموسفیر (زحل او مشتري) هم د میتان ګاز لري ؛ دا امر په دې دلالت کوي چې میتان په طبیعي شرایطو کې د حیاتي قوو څخه پرته هم تشکیلېدای شي .

د ځمکې په دنده کې د اور اخیستونکو ګازونو ډیرې زیاتې ذخیرې شته چې هغوی په ازاد حالت کې طبیعي ګازو په بڼه (د ځمکې د پنډ قشر دننه د خیرۍ) ، د محلول په حالت په نفتو او د ځمکې د لاندې اوبو دګازونو په توګه دنفطوسره یوځای موندل کېږي . په طبیعي ګازونو کې 98% د میتان ګاز شتون لري او ایټان ، پروپان او نور هم د مخلوط په بڼه شتون لري . د تیلو سره یوځای ګازونه ډیره لږه اندازه میتان لري چې له 30 څخه تر 80% پورې دي ، خو د هغه هومولوګ مرکبونه یعنې ایټان له 20% څخه تر 4% پورې شته ، پروپان د 5% څخه تر 22% پورې ، بیوتان د 5% څخه تر 20% پورې شته . نور ګازونه هم په دې ګازونو کې مخلوط دي . عالي الکانونه د نفتو په جوړښت کې شامل دي په منځني ډول د یو متر مکعب طبیعي ګاز څخه 46000 کیلو ژول تودوخه تولیدېږي چې د 30kg چدن ډولې کولو لپاره کافي ده .

1-4-1: د میتان فزیکي خواص

د میتان ګاز بې بوږه ، بې خوښه اوبې رنگه دی چې د هوا په نسبت سپک دی . د هغه دروند والی د هوا په نسبت د میتان ګاز بې بوږه ، بې خوښه اوبې رنگه دی چې د هوا په نسبت سپک دی . د هغه دروند والی د هوا په نسبت

$$\frac{M}{29} = \frac{16}{d}$$



اولندن قوه دهه، دا قوه د میتان د مالیکولونو د کوچنیوالي په نسبت ډیره ضعیفه ده؛ له دې کبله د هغه د ویلي کیدو او ایشیدونکي څیرې ښکته دي. میتان په اوبو کې نه حل کیږي.

فعالیت

دیوالکان مخصوصه کثافت 1.52 دی، دهغه فورمول اومالیکولي کتله په لاس راوړئ.
2- د دیوالکان مالیکولي کتله 62، ده، د هغه مخصوصه کثافت پیدا کړئ


4-1-2: د میتان کیمیايي خواص

طبیعي گاز چې 98٪ د میتان گاز دی، له هغه څخه د خامې کیمیايي مادې په توګه د لاندې موادو د لاس ته راوړلو لپاره کار اخېستل کیږي:



دوده د زیاتې مادې په توګه د ربړ په خامو موادو کې کاروي اوهم د څرومنو په جوړولو کې درنګ په توګه ترې ګټه اخېستل کیږي.

2- د اسیټیلین د لاس ته راوړلو لپاره له میتان څخه ګټه اخېستل کیږي:





3- میتان او اوبو د بړا سونو د تعامل له امله د کاربن مونو اکساید او هایدروجن ګازونه لاس ته راوړي:




په دې بنسټ له پورتنیو لاس ته راغلو محصولونو څخه میتیل الکول لاس ته راوړل کیږي.




4- د میتان د اکسیدیشن له تعامل څخه، میتیل الکول، فارم الډیهایډ او فارمیک اسید لاس ته راځي:



5- د میتان او امونیا د پیاوړتیا څخه د اکسیجن په شتون کې هایدروجن سیاناید حاصلیږي:



6 - د مېټان د کلورونېشن څخه مېټايل کلورايد ، کلوروفارم او کاربن تتراکلورايد حاصلېږي :



فعاليت




د مېټان لاس ته راوړنه

د اړتيا وړ مواد : دوه عدده تست تيوب ، له گير ا سړه دوه عدده ستين پاڼي دونه ، کورنل ، سوري لرونکي کارک ، د اوبو څخه ډک تش ، د تودوخې سرچينه ، سودالاييم (د سويډ هایدروکسايډ اوکسيمي مخلوط) ،

سويډم استيات

کړنلاره : د (4 - 7) شکل سړه سم ، لږ څه سويډم له استيات د سودالاييم سړه په پوست تيوب کې واچوئ ، د سوري لرونکي کارک سړه يې وتړئ ، د کارک د سوري څخه يو کورنل د بل تست تيوب سړه چې له اوبو څخه په ډک تش کې سرچينه شتون لري ، وردننه کړئ ، وروسته د تست تيوب توکو د تعامل معادله وليکئ او وړياست چې په نسکوري تست تيوب چې د اوبو ډک تش کې شتون لري ، ټول شوي گاز کوم گاز دی ؟




(4 - 7) شکل د مېټان د لاس ته راوړلو دستگاه



2-4: گروه مینره مرکبونه (سایکلو الکانونه):


د سایکلو پارافینونو د هومولوگ سلسلې عمومي فورمول $C_n H_{2n}$ یا $(CH_2)_n$ دی چې په دې ترتیب د سایکلو پارافین مالیکول د هغه د ایزولوگ الکان په نسبت د هایدروجن دوه اتومه لږ لري .

په یوه سلسله مشبوع هایدروکاربنونو کې د کاربن دوه اتومه کولای شي چې په خپل منځ کې یوه گونې اشتراکي اړیکه (کتب متب د دوو منځنیو کاربنونو sp^3 هایدريد واریکو ته ورته چې د هغوی په منځ کې یو یا څو د $CH_2 -$ گروهونه شتون ولري) په حلقه کې جوړه کړي ، دا ډول مرکبونه د سایکلو الکانونو (Cycloalkanes) په نوم یا ډیري چې دهغوی لومړنی مرکب $C_3 H_6$ د لاندې مشرح فورمول سره دی :



Cyclopropane

د دوي نور مرکبونه عبارت له . Cyclohexane ، Cyclopentane ، Cyclobutane او نورو څخه دي . سایکلو هگزان چې جمعې فورمول یې $C_6 H_{12}$ دی ، د لیریس د قانون سره سم په یوه سطحه کې د ساده شپږ ضلعي په بڼه لیکل کېږي ، خو په ریښتیا سره چې د کاربن اتومونه دې مرکب کې څلور وجهي جوړښت لري ، مسطح نه دی ، په عادي شرایطو کې هغه فورمول چې د سایکلو هگزان د مالیکول ډیر ثابت حالت رابښي ، د څوکۍ په بڼه دی (د هغه څوکۍ په بڼه چې د سیندونو په غاړو کې ترې گټه اخېستل کېږي) په (4 - 8) شکل کې د سایکلو هگزان فضايي جوړښت د څوکۍ په بڼه ښودل شوی دی :



2-4-1: د سایکلو الکانونو پیدایښت

سایکلو الکانونو په طبیعت کې په ډیره کچه پراختیا موندلې ده او نوموړي مرکبونه د ځینو نفتو د جوړښت له بنسټیزو اجزاو څخه دي (د باکو او اکراین په نفتو کې زیات پیدا کېږي) سایکلو الکانونه د لومړي ځل لپاره په نفتو کې د مارکوف نیکوف (Markovnikov) روسي عالم په واسطه کشف شول ، نوموړی عالم دا هایدروکاربنونه د نفتین (Naphthenes) په نوم یاد کړي دي . نوموړي وموندل چې په طبیعت کې پنځه ضلعي او شپږ ضلعي سایکلو الکانونه ، یعنې سایکلو پنتان او سایکلو هگزان او د هغوی مشتقات ډیر زیات خپاره شوي دي . سایکلو الکانونه په نباتي ایتري غوړونو کې شتون لري . دسایکلو هگزان د هومولوگ د کاربنی


اسکلیت (Terpenes) بنسټ
 1-methyl-4- isopropyl cyclohexane) د ډیرو ترپینونو
 تشکيلوي چې د طبیعت د مهمو مرکبونو له ډلو څخه دي .

لا زیات پوه شی

ترپینونه (Terpenes) له عطري او فرار کوونکو هایدروکاربنونو څخه دي چې د هغوي بسپټ فورمول $C_{10}H_{16}$ دي . ترپینونه په عملي او صنعتي چارو کې له ډیر اهمیت څخه برخمن دي او د زیاتو نباتاتو بنسټ تشکیلونکي دي . ترپینونه د ښه بوی لرونکو موادو جزونه دي او د عطرو په جوړولو کې په کار وړل کېږي ، د امرکوبه کیدای شي چې له نباتاتو څخه په لاس راوړل شي .

1-1-2-4 : فزیکي خواص

د سایکلو الکانونو د ویلي کیدلو تودوخه د هغوي د ایزولوگ الکانونو په نسبت لوړه ده ، لاندې جدول وگورئ :
 (3-4) جدول د ایزولوگو الکانونو سره د سایکلو الکانو د ویلي کیدو د درجو پرتله د هغوي

نارمل الکانونه او سایکلو الکانونه	فورمول	د ویلي کیدو درجه	د ایشېدو درجه
پروپان سایکلو پروپان	$CH_3-CH_2-CH_3$ 	-187	-42
بیوتان سایکلو بیوتان	$CH_3-(CH_2)_2-CH_3$ 	-127	-33
پنتان	$CH_3-(CH_2)_3-CH_3$	-135	-0.5
سایکلو پنتان		-90	13
هگزان	$CH_3-(CH_2)_4-CH_3$	-130	36
سایکلو هگزان		-94	49
		-95	69
		7	81

سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د گاز په بڼه او سایکلو الکانونه چې د کاربن د اتومونو شمیر یې له 30 څخه پورته وي په جامد حالت موندل کېږي




2-1-2-4: د سایکلو الکانونو کیمیايي خواص

دکوچنی کړۍ لرونکي سایکلو الکانونه جمعي تعاملونه ترسره کوي چې دهغوی کړۍ خلاصیږي، الکانونه او دهغوی مشتقات جوړیږي چې د الکینونو خاصیت له ځان څخه ښيي. هغه کړۍ چې له 5 څخه تر 7 پورې د کاربن اتومونه ولري ثبات یې ډیر دی چې د مشبوح هایلروکاربنونو غوندې تعویضي تعاملونه ترسره کوي.

1 – په سایکلو الکانونو باندې د هلو جنونو عمل


دکوچنی کړۍ لرونکي سایکلو الکانونه او دهغوی مشتقات د برومین سره په اسانۍ تعامل کوي، په پایله کې کړۍ خلاصه او د الکانونو برومیني مشتقات 1,3 dibrom alkanes جوړیږي.



پورتنی تعامل د پرومیشن په نسبت وړ دی او دسایکلو بیوتان پرومیشن دسایکلو پروپان په نسبت چټک دی. د سایکلو بیوتان د برومیشن تعامل په لوړه تودوخه کې ترسره کیږي او وړو دی او د 1,4 dibromo butane جوړیږي





د هلو جنو د عمل په اثر دسایکلو پنتان اوسایکلو هکزان کړۍ نه خلاصیږي بلکه دهغوی د هایدروجن د اتومونو تعویضي هلو جنوسره ترسره کیږي:



2 – د سایکلو الکانونو اکسیدیشن


دسایکلو پروپان او د هغه مشتقات په عادي تودوخه کې د پوټاشیم پرمنگنات د محلول په واسطه په خټی یا القاي محیط کې په وړو ډول اکسیدي کیږي او دقوي اکسیدانتونو او زیاتې تودوخې په واسطه نورسایکلو الکانونه هم اکسیدي کیږي، داسې چې کړۍ خلاصه او دوه قیمت ته تیرلونه د کاربن د عین شمیر سره لاس ته راځي:



2-2-4: د کړه ییز مرکبونو جوړښت او نوم ایښودنه

د کاربن اتومونه د کړه ییزو مرکبونو په مالیکولونو کې د الکانونو په شان د یوې ګونې اړیکې په واسطه یو له بل سره نښت دي چې د سګما (σ) د اړیکې په نوم یادېږي او د کاربن اتومونه د sp^3 هایبرید لري.

د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کې د سایکلو *Cyclo* د مختاړې (Prefix) په زیاتولو سره د هغه ایزولوګ الکان په نوم ترسره کېږي، زیاتره د سایکلو الکانونو د فورمولونو د لیکلو لپاره د هغوی له شرطي فورمولونو څخه ګټه اخیستل کېږي چې په هغوی کې د عنصرونو سمبولونه نه لیکل کېږي؛ د بیلګې په ډول:



فعالیت


لاندې دسایکلو الکانونو شرطي فورمولونه لیکل شوي دي، تاسې د هغوی مشرح فورمولونه ولیکئ

او نوم ایښودنه یې وکړئ:



2-2-3: د سایکلو الکانونو ایزومیري


د سایکلو الکانونو ساختماني ایزومیري د کړې په جسامت، د جانبې زنځیر جوړښت او د هغو د زنځیر په موقعیت پورې اړه لري، لاندې د C_5H_{10} مرکب ایزومیري د پنځو فورمولونو سره او د هغوي نومونه لیکل شوي دي چې پورتنۍ مطلب توضیح کوي:




سایکلو پارافینونه فضالو *dd* ایزومیري هم لري او د ایزومیري هغه وخت لیدل کېږي چې مواد د یو ډول ساختماني فورمول لرونکي وي؛ خو د اتومونو دفضا ځایرنه یو له بل څخه توپیر لري. فضايي ایزومیري په سایکلو



الکانونومي د جانبي زنځير موقعيت په فضايي ايزومري، پوري اړه لري ، دا ډول ايزوميري د هندسي ايزوميري (Geometric isomerism) او يا د ترانس اوسيس ايزوميريو (Trans, cis isomerism) په نوم يا ډيري، که چيري په سایکلو الکانونو پاتي شوني د کربو په يوه سطحه کې شتون ولري ، دا ډول ايزوميري د سيس (Cis) په نوم يا دوي ، او که چيري پاتي شوني د کړۍ په بيلا بيلو سطحو کې شتون ولري ، د ترانس (Trans) په نوم يا ډيري ، د بيلگي په ډول :



Trans-1,2-dimethylcyclopropane



Cis-1,2-dimethylcyclopropane

د سيس او ترانس ايزوميري د بيلا بيلو فزيکي او کيميايي خواصو لرونکي دي .




فعاليت


د لاندي سایکلو الکانونو د ساختماني او فضايي ايزومرونو فورمولونه وليکئ او نوم اېښودنه يې وکړئ:
Diethylcyclopentane , Dichlorocyclo butane, trimethyl cyclo hexane

4-2-4: د سایکلو الکانونو لاس ته راوړل

د سایکلو الکانونو د لاس ته راوړلو عمومي طريقه د فلزونو اغيزه د الکانونو د ډای هلايدونو مشتقاتو باندې ده . د بيلگي په ډول : که چيري 1,3- di bromo butane د جستو د فلز سره تعامل ورکړل شي ، سایکلو پروپان حاصلېږي:



له 1,6-dibromobutane مرکب څخه کولای شو چې سایکلو بيوتان په لاس راوړو.



1,4-dibromobutane

cyclobutane

4-2-5: د سایکلو الکانونو مهم مرکبونه:

سایکلو پنتان په نفتو کې موندل کېږي او هغه د موټرو د سون مهمې مادې د کيفيت د لوړولو په غرض په کار ول کېږي ، همدارنگه نوموړي مرکبونه په بيلا بيلو سنتيزونو کې په کار وړل کېږي . نفت هم شتون لري چې د سایکلو پنتان لرونکي د کاربوکسيل د مشتقاتو لرونکي دي يعنې سایکلو پنتان کاربوکسيلک اسيد او د هغه هومولوگونه چې د نفتينک اسيد Naphthene acide په نوم يا ډيري، په نفتو کې شتون لري .



د څلورم څپرکي لنډيز



* الکانونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی د کاربن د اتومونو ترمنځ یوه ګونډې ساده اړیکه شتون لري او د کاربن د اتومونو نور پاتې ولانسونه د هایډروجن داتومونو په واسطه ډک شوي دي .

* د الکانونو د هومولوګ لړمړي څلور مرکبونه په ټاکل شوو شرایطو کې د ګاز په حالت موندل کېږي او له 5 څخه تر 16 کاربن لرونکي یې د مایع په حالت او د 16 څخه لوړ کاربن لرونکي الکانونه په جامد حالت دي .

* د الکانونو کیمیايي فعالیت ډیر لږ دی ، له دې کبله هغوی د پارافین (Paraffins) یعنې د لږ میل لرونکي په نوم یادوي .

* په یوه سلسله مشبوع هایډروکاربنونو کې د کاربن دوه اټومه کولای شي چې په خپل منځ کې یوه ګونډې اشتراکي اړیکه (کټ مټ د دوو منځنیو کاربنونو $sp^3 - hybrid$ هایبریدو اړیکو ته ورته چې د هغو په منځ کې یو یا څو د CH_2 ګروپونه شتون ولري) په حلقه کې جوړه کړي ، دا ډول مرکبونه د سایکلو الکانونو (Cycloalkanes) په نوم یادېږي چې دهغو لومړنی مرکب $H_6 C_3$ دی :

* سایکلو الکانونه په نباتي ایتري غوړونو کې شتون لري . د سایکلو هګران د هومولوګ د کاربنې اسکلیټ (isopropyl cyclohexane - 1-methyl) د ډیرو تریپنونو (Terpenes) بنسټ تشکیلوي .

* د سایکلو پارافینونو د هومولوګ د سلسلې عمومي فورمول $C_n H_{2n}$ یا CH_2 د n چې په دې ترتیب سایکلو پارافین مالیکول د هغه د ایزولوګ الکان په نسبت د هایډروجن دوه اټومه لږ لري .

* سایکلو الکانونه د کوچنۍ کړۍ لرونکي جمعې تعاملونو ته میل لري چې د هغوي کړۍ خلاصه شوي الکانونه او د هغو مشتقات جوړوي چې د الکینونو خاصیت ښکاره کوي له 5 څخه تر 7 پورې کاربن لرونکي کړۍ د ډیر ثبات لرونکي دي چې د مشبوع هایډروکاربنونو په شان تعویضي تعاملونه سرته رسوي .

* سالي کلو پنتان په نفتو کې پیدا شوی او هغو په موټرونو کې په ډیرې مهمې مادې کې د هغې د کیفیت د لوړولو لپاره ورزیاتوي زیاتوي ، همدارنګه ذکر شوي مرکبونه په بیلا بیلو سنتیزونو لاس ته راوړي .

د څلورم څپرکي پوښتي

څلور خوا به پوښتي

1- الکانونه هغه مرکبونه دي چې دهغو د کاربن د اتومونو ترمنځ د----- اړیکه شتون لري .

الف - ساده ب - یوه گونې ج - دوه گونې د - الف او ب دواړه سم دي

2- الکانونه دلاندې کوم یو عمومي فورمول لرونکي دي ؟

الف - $C_n H_{2n}$ ب - $C_n H_{2n+2}$ ج - $C_n H_{2n-2}$ د - $C_n H_{2n+1}$

3- د $CH_3 - CH_2 - CH - CH - CH_3$ مرکب نوم عبارت دي له :
 CH_3 CH_3

الف - 4,3 dimethylpentane ب - 2,3 - dimethyl pentane ج - 3,3 dimethyl pentane د - 1,3 dimethyl pentane

4- دا لکان (Alkane) د *ane* وروستاړی د هغه په اړوند رادیکال کې په کوم وروستاړي تعویض کېږي؟

الف - ene ب - yne ج - yl د - yne

5- له 5 څخه تر 16 پورې کاربنو لرونکي الکانونه په کوم حالت پیدا کېږي ؟

الف - جامد ب - گاز ج - مایع د - پلازما

6- د الکانونو کیمیایي فعالیت لږ دي ؛ له دې کبله هغوی د----- په نوم یا دوي .

الف - پارافین ب - Paraffins ج - الف وب دواړه د - هېڅ یو

7- د یو کیلو ګرام میتان له سوزولو څخه----- انرژي ازاد کېږي .

الف - 57000 کیلوژول ب - 57000 ژول ج - 57000 میګاژول د هېڅ یو .

8- د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کې د----- د هغه د ایرولوګ الکان په نوم مختاړي (prefix) په زیاتولو

ترسره کېږي .

الف - سایکلو ب - Cyclo ج - الکیل د - الف او ب دواړه سم دي .

9- روسي عالم (-----) په نوم سایکلو الکانونه د لومړي ځل لپاره په نفتو کې کشف کړه .

الف - مارکوفیکوف ب - Markownikov ج - الف او ب دواړه د - زایسلف

10- په ټولو الکانونو کې د C-C د اړیکې د محور په شاوخوا ازادانه حرکت شته ترڅو د هغو د اړیکو زاویه له----- څخه لوړه شي .

الف - 109 او 28 دقیقې ب - 90 او 30 دقیقې ج - 60 درجې ، د - 65 درجې ،



- 1 - لاندې مطلبونه تعريف او توضيح كړئ ؟
 - الف - پارافين ب - هومولوگ ج - ايزومير د - ايزولوگ
- 2 - د مشبوع هايډروكاربونونو په سلسله كې د كاربن د اټومونو د شمير و په زياتولو كوم بدلونونه د هغو په فزيكي خواصو كې ليدل كېږي ؟

الف - $C_{14}^{H_{26}}$ ب - $C_{26}^{H_{50}}$ ج - $C_{20}^{H_{40}}$ د - $C_{50}^{H_{100}}$

[illegible]

الف - 1,2 - dichloropropane - 1 - ethyl - 2 - laopropylbutane - ب

- 6- ديو مشبع هايدروكاربن 2.26 g/L دی، ده ذکر شوي ماليکول کنده دهغي دفورمول سر پيدا کړي.
- 7- د ميتال سيکلونيزو، پروان دفورمول وليکي، او دهغي دکاربونونو تولونه مشخص کړي او نوم ايښودنه يې هم وکړي.
- 8- دلاندې هايدروکاربونونو د يونگ نوم وليکي.



9- د لاندې سایکلو الکانونو فضايي جوړښت وليکئ


Trans-1-bromo-3-chlorocyclopentane-2, Cis-1,3-diethylcyclobutane-2

الکینو نه او الکاینو نه




د هایدروکاربنونو له مهمو توکو څخه ، یو هم د غیر مشبوع مرکبونو د الکینونو او الکاینونو ډلې دي چې زموږ په ورځني ژوند کې بنسټیز رول لوبوي ، دا مرکبونه په خپلو مالیکو لوړو کې دوه ګوني او درې ګوني اړیکې لري ، داسې چې په الکینونو کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه ګوني او په الکاینونو کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې ګوني اړیکه شتون لري .

په دې څپر کې کې د دې څپر کې په لوستلو به زده کړئ چې الکینونه او الکاینونه څه ډول مرکبونه دي ؟ د اړیکو څرنگوالی په الکینونو او الکاینونو کې په څه ډول دي ؟ د ژوند په کومو برخو کې په کارېږي ؟ څرنگه او له کومو سرچینو څخه کیږي شي ؟ په طبیعت کې د هغوی خپریدل په څه ډول دي ؟ د دې څپر کې په لوستلو به پورتنیو پوښتنو او هغوی ته ورته نورو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ :




5-1: الکینونه

د الکین د کورنۍ د غیر مشبوع هایډروکاربنونو ډیر ساده مرکب ایټیلین دی چې د هغه فورمول $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ دی، د ایټیلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه گونې اشتراکي اړیکه شته ده چې د هغه یوه اړیکه سگما (σ) او بله یې د پای π اړیکه ده، (د ایټیلین دایکونو ځانګړتیاوې زاویې او دایکونو اوږدوالي، د الکینونو د جوړښت په مبحث کې وړاندې شوي دي) د الکین د مرکبونو د هومولوګ سلسله د یو میتلین ګروپ ($-\text{CH}_2-$) په اندازه یوله بل څخه توپیر لري چې د هغوی عمومي فورمول C_nH_{2n} دی، په دې فورمول کې n 2 سره مساوي او له هغه څخه پورته نام قیمتونه هم ځانته غوره کولای شي. د ایټیلین دوه گونې اړیکه په یوه سطح کې واقع ده او په پایله کې د $\text{C} - \text{C}$ په شاوخوا په ازاده توګه تاویدل په کې امکان نه لري. د هغوی دوهم مرکب propene ($\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$) دی، د دوه گونې اړیکې شتون د الکینونو د مرکبونو فعالیت د الکانونو په نسبت ډیر کړی دی، له دې کبله د هغوی شتون په نفتي موادو کې ډیر لږ دی. الکینونه په پتروشیمي کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. د نفتي محصولاتو (د الکانونو) د کیمیايي بدلونو په لومړي پړاو کې الکینونه تر لاسه کېدای شي؛ داسې چې له الکانونو څخه دوه هایډروجنونه جلاکړي او د هغوی ایزولوګ الکین لاس ته راځي:



که چیرې الکایل برومایدونو او القیو ته تر 550°C تودوخه ورکړل شي، الکینونه لاس ته راځي:




الکینونه د اولفینونو (Olefines) په نامه چې د تیلو جوړوونکو معنا ورکوي، هم یادېږي؛ ځکه د تیلو په مرکبونو کې هم شته دي

5-1-1: د الکینونو جوړښت

د الکینونو یوه ساده ځانګړتیا دا ده چې د هغوی په مالیکولي جوړښت کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه گونې اړیکې شتون لري، دوه گونې اړیکه د دوو جوړوګډو الکټرونونو په مرسته (له څلورو الکټرونونو څخه) جوړېږي، د کاربن اتومونه چې په خپل منځ کې دوه گونې اړیکه لري، د sp^2 هایبرید پزیشن په حالت کې شتون لري او دنوموړو کاربنونو هر اتوم درې سگما اړیکې چې په یوه سطحه کې شتون لري او 120° درجه زاویه یې جوړه کړې ده، ترلې دي، د دې دوو اتومونو د کاربنونو یو، یو نه هایبرید شوي د P اوربیتالونه چې دسگما په سطحه په عمودي بڼه شتون لري او یوله بل سره موازي دي، په پایله کې یو له بل سره څنګ پر څنګ نښته تر سره کوي او د پای (π) اړیکه (دویمه اړیکه) جوړوي. د π د اړیکو جوړوونکو الکټرونونو ته د π الکټرونونه بنسټ دوه جوړو الکټرونونو جوړه ییزه اړیکه جوړه کړې ده. جوړییزه اړیکه عبارت له سگما (σ) او د پای (π) اړیکې (π -bond) مجموعه ده. د P نه هایبرید شوي اوربیتالونو د الکټروني وریځو څنګ پر



څنگ نښته چې د π اړيکه منځ ته راوړي ، د کاربن اتومونه يو له بل سره نژدې او د هغوی ترمنځ فاصله لنډوي ؛يعني $C \equiv C$ د دوه گونې اړيکې اوږدوالي د 0.33 نانومتر ته نژدې کېږي ، په داسې حال کې چې د $C - C$ ساده اړيکې اوږدوالی د 0.154 نانومتر دي . (5 - 1) شکل ته وگورئ:



(ب)

(الف)


(5 - 1) شکل په ایتیلین کې د اړیکې بندول ، د هغې زاویه او د اړیکو اوږدوالي

5-1-2: د الکینونو نوم ایښودل


د الکینونو په نوم ایښودنه کې د ene وروستاړي د هغوی د ایزولوګو الکانونو د ane وروستاړي پر ځای وړ زیاتېږي . د الکینونو په مرکبونو کې هم ټیږ اوږد د زنځیر ټاکل کېږي ، دلته هم د هغو کاربنونو شمېر چې په هغوی باندې بقیه او یا ښاخونه شته دي ، 1 ، 2 ، 3 اوداسې نور رقمونه لیکل کېږي او له دې - علائې څخه وروسته بیا د بقیو نوم د هغوی د نوم د لومړي توري پر بنسټ کوم چې د انګلیسي الفبا په تورو: چې مخکې وي ، په پام کې نیولوسره لیکل کېږي وروسته د اوږد زنځیر نوم د ene وروستاړي سره لیکل کېږي. د کاربن داتومونو شمېر وهل د بنسټیز زنځیر له هغه نوکې څخه پیل کېږي چې جوړه ییزه اړیکه هم په هغه کې شتون ولري ، خود اوږد زنځیر شمېر وهل له هغه نوکې څخه پیل کېږي کوم چې جوړه ییزه اړیکه هغه سر ته نژدې وي ، د بیلګې په ډول :



2-butene



1-butene



4-methyl-2-heptene

که چېرې خوده گونې اړیکې په دې مرکبونو کې شتون ولري ، د ene له وروستاړي څخه وړاندې د *Tri* ، *Di* ، او نور رقمونه لیکل کېږي چې دا رقمونه د جوړه ییزو اړیکو شمېر وښيي ؛ د بیلګې په ډول :



2,4-hexadiene



5-1-3: د الکینونه ایزومیری

الف: د جوړښت ایزومیری او د دوه گونو اړیکو ځای لاندې مرکبونه په پام کې ونیسئ:



1-butene




2-butene

د پورتنیو دواړو مرکبونو ټولیز فورمول C_4H_8 دی؛ خو د دې د دواړو مرکبونو د مالیکولونو د جوړښت فورمولونه یو له بل څخه توپیر لري، د دوه گونې اړیکې ځای په دې مرکبونو کې بدلون موندلی دي. د ایزومیرۍ د جوړونکې ایزومیری په نوم د دوه گونې اړیکې د ځای له کبله یاد وي.

ب - فضايي ایزومیری (Stereo isomeris)

Stereo یوناني کلمه ده چې د جامد او کلکو جسمونو په معناه ده، پردې بنسټ دا ایزومیری پر هغو مرکبونو پورې اړه لري چې کلک فضايي جوړښت ولري او د هغوي هندسي بڼې په فضا کې بدلون ونه کړای شي؛ د بیلگې په ډول: د 2-Butene مرکب په پام کې نیسو او د لرگړو مولونو په واسطه د هغه ممکنه بڼې جوړوو، دا مرکب د (5-2) شکل سره سم د دوو ایزومیریو حالتونه لري؛ څرنگه چې لیدل کېږي د 2-Butene د مرکب په مالیکول د میتیل د ګروپونو ځای پر ځای کیدل مکمل توپیر لري چې په عادي تودوخه کې د مالیکولونو حرکي انرژي د هغه د میتیل د رادیکالونو د تاویدولو او بدلون توان نه لري؛ ځکه په دې مرکب کې د π -اړیکې انرژي د دې رادیکالونو د تاویدولو او بدلیدلو څخه ګرځي، د ځنډه انرژي له منځه وړلو لپاره باید فعالوونکې انرژي (activation Energy) شتون ولري، پردې بنسټ په عادي تودوخه کې کیدای شي چې دا دوه ډوله ایزومیری یو له بل څخه جلا کړای شي؛ ځکه د هغوی د ایشیدونکې یو له بل څخه توپیر لري.



(5-2) الف - شکل د 2-بیوتین د مالیکول دوه فضايي ساختمانونه




1- Cis او Trans پخوانیو طریقو نوم ایښودنه چې یوازې په دې ځانګړي حالت کې ، 2-Butene او

د هغه هندسي شکلونه سره ورته دي ، په دې ډول :

یو نیغ خط دکاربن ددو اتومونو له مرکبونو څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکې باندې رسم کړی، که چېرې د میتیل دواړه ګروپونه د نیغ خط لاندې په یوه لوري یعنې په یوه مستوي کې ځای ولري ، دا جوړښت د Cis په نوم یا ډیرې . که چېرې د میتال یو ګروپ پاس او بل بې د نیغ خط لاندې وي ؛ یعنې په دوه بیلابیلو مستویو کې شتون ولري، د Trans ایزومیري په نوم یا ډیرې .

2 – هغه نوي کړنلاره چې د فضايي ایزومیریو په هکله په کار ورل کېږي ، نوموړي ایزومیرۍ د Z او E په تورو راښيي، دی کړنلاری سره سم هغه ایزومیري چې په هغې کې د میتیل دواړه ګروپونه د نیغ خط په یوه خوا کې یو ځای کې شتون ولري ، دارنگه جوړښت ته Z ایزومیري وايي (دالماني کلیمې Zusammen لومړۍ توری دی چې معنایي سره یو ځای ده) هغه ایزومیري چې د میتیل دوه ګروپونه د خط په دوو بیلابیلو لورو یعنې په بیلابیلو سطحو کې ، په بیلابیلو لورو سطحو کې شتون ولري، په E ټاکل کېږي . (E د الماني کلمې Entgegen لومړي توری دی چې یو بل سره د مخالف معنا لري)؛ د بیلګې په ډول :





جوړښت (Z) (Cls)

جوړښت E (ترانس)

(E) 2-butane)

(Z



Cis Isomery (Z)

) E (Trans Isomer

4-1-5 : د الکینونو خواص

4-1-5-1 : د الکینونو فزیکي خواص

د الکینونو فزیکي خواص د هغوی ایزولوګو الکانونو سره شباهت لري ؛ خو د الکینونو د ایشیدو درجه د هغوي د ایزو لوګ الکانونو څخه ډیره ښکته او د هغوی کثافت لوړ دی . د دې مرکبونو درې غړي (C₂ – C₄) ګاز حالت لري ، هغه الکینونه چې (C₅ – C₁₈) کاربن اتومونه لري ، د مایع حالت او له C₁₈ څخه پورته د موم یا جامد حالت لرونکي دي . د الکینونو د کاربن داسکلیت او فضايي ایزومیریو جوړښت، دهغوی په فزیکي خواصو باندې اغیزه لري . لاندې جدول وګورئ:

(5 - 2) جدول د الکینونو فزیکي ځانګړتیاوې

نوم	فورمول	^0C دوولې کیدو درجه په	دایښدو درجه په ^0C کثافت	مخصوصه کثافت
Ethylene	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	-169	-105	0.570
propene 1-	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$	-185.2	-47.8	0.610
butene- 1	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	-130.0	-6.3	0.595
butene- 2	$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$	cis 138.9 (-105.5) trans	+3.5 0.9	0.621 0.604
Iso-butene	$\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)_2$	-140	-6.9	0.594

د ټولو اولفینونو مخصوصه کثافت له یوه څخه لږ دي او د ځانګړي پورې لرونکي دی . په اوبو کې ښه نه حل کېږي ؛ خو په اوبو کې د هغوي حلیدل د هغوي د ایزولوګو الکانونو په نسبت زیات دي .

1-3-2: د الکینونو کیمیايي خواص

د الکینونو کیمیايي خواص دوه ګونه اړیکي ، د سګما او پاي د اړیکو فضايي ځایونه ټاکي ، د سګما د اړیکې د الکترون وړنځې کثافت د هغه خط له پاسه چې د دو اړو اتومونو هستې نښلوي ، را ټول شوي دي او د پاي د اړیکې د الکتروني وړنځې کثافت له دې چاپیریال څخه د باندي شتون لري چې د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. هغڅو ته پای د اړیکې بنسټیزه ځانګړتیا ده چې د دې الکترونونو اړیکه له هستې سره د سګما د الکترونونو د اړیکې په نسبت ضعیفه ده ښو له دې کبله په اسانۍ سره قطبي کېږي او الکترون خونېوزنکو (Electrophilic) ذرونو ته د حملي زمینه برابروي ، له دې امله د پای اړیکه د هترو لیکي په ښه پری جمعې تعاملونه تر سره کېږي . سګما او پای د اړیکې ترمنځ د انرژۍ توپیر 270kJ/mol دي ، د الکینونو ځنې تعاملونه په لاندې ډول دي :

1 - د الکین هایډروجنیشن

که چیرې ایټیلین د نیکل د کتلاست په شتون کې هایډروجنیشن شي ، ایټان لاس ته راځي :





د ایټیلین مالیکول په یوه سطحه کې شتون لري ؛ یعنې سطح دی ؛ خو دایټان مالیکول څلور وجهي ښه لري



2- د الکینونو هلو جیښ

او لښیزنه په عادي شرایطو کې هلو جنونه، په ځانګړې توګه کلورین او برومین په ځان پورې نښلوي او دپارافینونو ډای هلو جنیدونه جوړوي ؛ د بیلګې په ډول : د ایتیلین تعامل له کلورینو ، برومینو او هایدروجن کلورایدو سره و گورئ چې تعامل اګزوترمیک دي ، د هغوی تعامل په لاندې ډول دی :



د هلو جنونو تعامل له الکینونو سره د Halogenation په نامه او حاصل شوي مرکبونه یې د الکال هالایډونو په نوم یادېږي. د برومین د اوبو بې رنگه کول ، د دوه ګونې اړیکې د توصیفې تعاملونو له ډلې څخه دي . د دې موخې لپاره د برومین محلول د کاربن تتراکلورایډ یا کلور فارم سره جوړوي او ترې ګټه اخستل کېږي . د دې تعامل پر بنسټ د مایع تیلو د مشبوعیت درجه ټاکل کېږي .

3- د الکینونو اکسیدیشن

الکینونه په اسانۍ سره د بیلا بیلو اکسید انتونو تر اغېزې لاندې راځي ، د همدې ځانګړتیاوو په واسطه له پارافینونو او سایکلو پارافینونو څخه توپیرېږي . د شرایطو په پام کې نیولو سره د الکینونو له اکسیدیشن څخه بیلا بیل مرکبونه حاصلېږي :




د الکینونو د سوزېدو په پایله کې کاربن ډای اکساید ، اوبه او انرژي لاس ته راځي . په عادي شرایطو کې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکې په ځای کې ترسره کېږي ، که چېرې الکینونو په پوره پاملرنې سره د پوښتنې پر منځګات د القلي محلول په واسطه اکسیدیشن شي ، دوه قیمته الکولونه لاس ته راځي :



د قوي اکسید انتونو (د پوښتنې پر منځګت تیزابي محلول او د کرومیک اسید محلول) د عمل په پایله کې د الکینونو دوه ګونې اړیکه پرې او دهایډروکاربنونو اکسیجن لرونکي مرکبونه حاصلېږي ، د بیلګې په ډول : د




بیوتین د دری ایزومیری اکسیدیشن گورو:



فعالیت



د قوي اکسید انټونو په واسطه په پوره پاملرنې سره د لاندې الکینونو د اکسیدیشن د تعامل محصول د کیمیايي معادلو په واسطه روښانه کړئ:




4- د الکینونو پولی میزایش

الکینونه یو له بل سره جمعي تعاملونه تر سره کوي او په پایله کې پولی میرونه جوړوي؛ بیلګې په ډول: د ایتیلین یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره او همدا رنگه د ایتیلین څو مالیکولونه یو له بل سره جمعي تعامل ترسره او د ایتیلین پولی میز جوړوي. لومړني الکین د مونومیر (Monomer) په نوم یا ډیری، (Monomer) یوناني کلمه ده چې د یوې برخې مفهوم لري). د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړشوی زنجیر د پولی میز (polymer) په نوم یا ډیری چې د هغوي ډیر ساده د ایتیلین پولی میز دي، د هغه فورمول $-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n -$ دی چې اوږده زنجیرونه جوړوي. د پلاستیک جوړونې په صنعت کې پولی میرونه د مونومیرونو د یوځای کولو چې عمومي فورمول یې $-(\text{CHX} - \text{CH}_2) -$ دی، لاسته راوړي، په دې مونومیر کې X دهلوجنونه ښکارندوي دی او په دې مرکبونو کې کیدای شي چې د X برخې د $\text{CH}_3 -$ ګروپ وي، که چېرې X کلورین وي؛ نو د پولی میز عمومي فورمول $-(\text{CHCl} - \text{CH}_2) -$ دی او P V C (Polyvinyl Chloride) یو $-(\text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2)_n -$ فورمول د پولی پرویلین په نوم یا ډیری


5-4-1: د الکینونو لاس ته راوړنه

الکینونه د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې لږ موندل کېږي، کوچني اولفینونه په لږه کچه د نفتو گازونو په مخلوط کې موندل کېږي او لوی اولفینونه په نفتو کې موندل کېږي. که چېرې نفت ټوټه او پارالیز شي، الکینونه حاصلېږي، د دې تعامل میخانیکیت داسې دی چې لږو الکانونو ته له 400-700 سانتي ګراد پورې تودوخه ورکوي؛ په پایله کې د الکانونو راډیکالونه لاس ته راځي او د تعامل په بهیر کې د الکینونو راډیکالونه هم لاس ته راځي:



[illegible]


پرې کيږي او په پايله کې کوچني الکانونه او الکينونه جوړيږي.



له ډلې څخه ايتلين لاس ته راځي:



ترسره کیری:



ایتیلین او اوبه لاس ته راحی:




د ایتلین لاس ته راوړنه

توده‌خی منبه، تست تیمونه، کاره نلونه، دری سستی لرونکی (سه پایه) اوله ایوبو خخه چک تست

ليديني وليکي او لاندو پوښتونو ته حواب ورکړي.


1- دگو گرو تیزاب پہ دی تعامل کی کوم رول لریوی؟

2- د تعامل میخانیکیت یې د کیمیايي معادلې پرنسب روښانه کړئ.



(5 - 3) له ایتایل الکولر څخه د ایتیلین د لاس ته راوړلو د دستگاه

د الکایل هلاکیدونو د دې هایدرو هلو جنش له تعامل څخه هم د هغوی ایزولوګ الکنونه لاس ته راځي ، په دې تعامل کې د قلوبو د الکولي محلول څخه ګټه اخېستل کېږي ؛ د بېلګې په ډول :



1-2: ځینې مهم الکنونه

1- ایتیلین

ایتیلین د ګاز حالت لري ، په اوبو کې په لږه او په الکولو کې په زیاته کچه حل کېږي . څرنگه چې ایتیلین له میتان څخه یو اتوم کاربن کم لري ، نو ځکه په روښانه وړانګو سوځي . د ایتیلین او د هوا مخلوط چاودیدونکي ځانګړتیا لري ، نو باید له هغه سره په زیاته پاملرنه کار وشي .

ایتیلین د عضوي مرکبونو له وچ تقطیر څخه لاس ته راوړل کېږي او تل روښنايي لرونکي ګازونه ایتیلین ګاز هم لري . ایتیلین د نفتو په ګازونو کې موندل کېږي .

2- پروپیلین (C_3H_6)

پروپیلین د ګاز په حالت پیدا کېږي او په صنعت کې هغه د کرکڼګ په طریقه د نفتو د ګازونو او د پروپان د دې هایدریشن څخه لاس ته راوړي:




۳- بیوتیلین (C_4H_6)

بیوتیلین د ډیرو ایزومیرونو لرونکی دی چې عبارت دي له 1-butene ، 2-butene او Isobutene دا مرکب او د هغه ایزومیرونه د ګاز په حالت پیدا کېږي چې د الکانونو له فرکشن څخه حاصلېږي، بیوتان د کرکڼګ فرکشنی تعامل پرنسب حاصلېږي، د بیوتان د دې هایدریشن څخه 2- بیوتین، یا ډای میتیل وینایل




(Dimethylvinyl) لاس ته راځي.



4 - سایکلوپنتین C_5H_8 (Cyclopentene)

په عادي شریطو کې سایکلوپنتان مایع حالت لري او په 44°C په ایشیدو راځي ، دامرکب کیدای شي چې له سایکلوپنتان څخه په لاندې توگه په لاس راشي:



ځانونه وازموي؟

له 9.2 ایتانول څخه ، ایتیلین تر لاسه شوی دی :

الف - څو موله ایتیلین لاس ته راغلی دی ؟

ب - څو لیټرو هایدروجنو ته د ایتیلین د هایدروجنیشن لپاره اړتیا ده؟

2-5: الکاینونه (Alkynes)


الکاینونه غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي چې د هغوی د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې گونې اشتراکي اړیکه شته . د الکاینونو لومړي مرکب استیلین دی؛ نو له دې کبله هغوي د استیلین د کورنۍ په نوم هم یاد شوی دی ، د دې هایدروکاربنونو زنځیر هم واز دی او په خپل مالیکول کې یوه یا څو درې گونې اړیکې لري . که چېرې له الکاینونو څخه د هایدروجن دوه اتومه جلا شي ، د هغوی اړونده الکاینونه لاس ته راځي . الکاینونه چې یوه درې گونې اړیکه لري ، عمومي فورمول یې $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ دی چې په دې فورمول کې کیدای شي $n \geq 2$ وي او ډیر کوچنی مرکب د هغوی استیلین دی چې د سیستماتیک نوم یې Ethyne دی ؛ که چېرې yne وروستایي لابین رقمونو ته چې د کاربن د اتومونو شمیر رانښيي ، ورزیات کړای شي ، د هغوی اړونده الکاین لاس ته راځي .

5-2: د الکاینونو جوړښت

په الکاینونو کې بنسټیز لامل د هغوي په مالیکول کې د دری گونو اړیکو ($\text{C} \equiv \text{C}$) شتون دي . درې گونې اړیکې په جوړښت کې درې جوړې گډ شوي الکټرونونه (شپږ الکټروني اړیکه) برخه لري . د کاربن هغه اتومونو چې درې گونې اړیکه جوړوي ، د sp - هایلبرینډیشن په حالت شتون لري ، هر یو یې د سگما یوه ، یوه اړیکه لري چې 180° درجې زاویه یې د اړیکو ترمنځ شته ده ، د کاربن د اتومونو د P دوه نه هایلبرید شوي اوربیتالونه د SP په اوربیتالونو باندې عمود ولاړ دي چې 90° زاویه یې جوړه کړی ده او د دویم کاربن د اتوم له P اوربیتالونو سره موازي دي ، ددې اوربیتالونو هره جوړه څنګ پر څنګ ننوتنه کوي او دوه د پاي (π) اړیکې جوړوي . درې گونې اړیکه د یوې سگما (σ) اړیکې او دوه د پاي (π) له اړیکې څخه جوړه شوي



ده ، د(4-5) شکل د اړیکو ځایونه د استیلین په مالیکول کې ښیي:




(4 - 5) شکل په استیلین کې د اړیکو ځای او څرنگوالي

2-2-5: د الکایینونو ایزومېرونه

د الکایینونو ایزومیري د کاربنې زنځیر په جوړښت او په زنځیر کې د درې گونې اړیکې ځای پورې اړه لري چې د الکینونو له ایزومیریو سره لږ څه ورته دی ؛ خو د سیس او د ترنس ایزومیری نه لري . ځکه د سگما دوه اړیکې چې د کاربن د دوو اتومونو په واسطه جوړې شوي دي ، د sp هلیبرند په حالت کې د 180° درجې زوایي سره په یوه مستقیم خط کې ځای لري ، پر دې بنسټ د استیلین مالیکول خطي دی .

استیلین او پروپاین ایزومیري نه لري ؛ خو دپروپان ایزومیري په لاندې ډول دي :




1 - butyne 2 - butyne

فعالیت

د C_5H_8 ، C_6H_{10} ، C_7H_{12} جمعې فورمول لرونکو مرکبونو د ساختماني ایزومیري گانې او د هغوي د درې گونې اړیکې ایزومیری ولیکئ.

5-2-3: د الکایینونو نوم ایښودنه

د الکایینونو د نوم ایښودلو کړنلاره د الکینونو په شان ده ، په اشتقاقې (Rational) نوم ایښودنه کې د الکاین گروپ د استیلین مشتق ګڼل شوی دی چې د هغوی دا لاندې بېلګې مطلب روښانه کوي:



Ethylacetylene Dimethyl acetylene



Methyl ethyl acetylene

Methyl isopropyl acetylene



فعالیت



د هغه مرکب ایزومیري ولیکئ، کوم چې د C_8H_{14} جمعې فورمول لرونکي دي او په اشتقاقې طریقه بې نوم ایښودنه وکړئ. د (IUPAC) په لاره د الکانونو نوم ایښودل د الکانونو په شان، داسې ده: چې د درې گونې اړیکې ځای د کاربن په نمبرونو سره ټاکل کیږي. د بنسټیز زنځیر نمبر وهل د زنځیر له هغه لوري څخه ترسره کېږی، کوم چې درې گونې اړیکه ورته نږدې وي؛ دیلگې په ډول:



3 - methyl - 1 - butyne

2 - butyne

فعالیت

الف - دلاندې فورمول لرونکو مرکبونو نومونه د (IUPAC) په سیستم ولیکئ:



ب - د لاندي مرکبونو نه مشرح فورمولونه ولیکئ.

a. 4,4 - dimethyl 1 - pentyne b. 4 - methyl - 2 - pentyne

c. 3 - methyl 2 - hexene d. 3,3,3 - trifluoro - 1 - butyne

3-2- د الکانونو فزیکي خواص

د الکانونو فزیکي خواص د الکانونو خواصو ته ورته دي، هغه الکانونه چې له دوو څخه تر څلورو دکاربونو اتومونه لري، د گاز حالت لري. له پنځو څخه تر شپاړسو دکاربن اتومونولرونکي دمایح حالت او له 16 څخه پورته دجامد حالت لري. ایټیلین په $103^\circ C$ -تودوخه کې په ایشیدو راځي خو ایستیلین په $83.5^\circ C$ - کې په ایشیدو راځي.

په اویو کې د کوچنیو الکانونو د حل کیدلو قابلیت د هغوي د ایزولوگ الکانونو په نسبت زیات دي، خو سره له دې هم په اویو کې لږ حل کیږي. (4 - 5) جدول د ځینو الکانونو فزیکي خواص ښیي.




(4-5) جدول شمېنې الکاینونه او د هغوی فزیکي ځانګړتیاوې .

نوم	د کاربنونو شمېر	جوړښتي فورمول	د ویلي کېدو درجه	د اېشېدو درجه	کثافت g/L
Eccetylene	2	$\text{CH} \equiv \text{CH}$	-80.8°C	-75°C	
Propyne	3	$\text{CH} \equiv \text{CCH}_3$	-103°C	-23°C	
butyne 1-	4	$\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$	-125.7°C	8°C	
butyne 2-	4	$\text{CH}_3\text{CH} \equiv \text{CCH}_3$	-32.3°C	27.0°C	0.691
1-pentyne	5	$\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-106°C	40°C	0.69
2-pentyne	5	$\text{CH}_3\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$	-109°C	56°C	711.0
1-hexyne	6	$\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-132°C	71°C	716.0
2-hexyne	6	$\text{CH}_3\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-89°C	84°C	0.73
3-hexyne	6	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$	-101°C	84°C	0.723
1-heptyne	7	$\text{CH} \equiv \text{C(CH}_2)_4\text{CH}_3$	-81°C	100°C	0.738
1-octyne	8	$\text{CH} \equiv \text{C(CH}_2)_5\text{CH}_3$	-79°C	126°C	0.747
1-nonyne	9	$\text{CH} \equiv \text{C(CH}_2)_6\text{CH}_3$	-50°C	151°C	0.758
1-decyne	10	$\text{CH} \equiv \text{C(CH}_2)_7\text{CH}_3$	-44°C	174°C	0.767

5-4-2: د الکاینونو کیمیايي خواص

د الکاینونو کیمیايي خواص د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا او د کاربن د اترومونو sp^2 هلیبرید ځانګړتیاوې سره اړیکه لري. د نه مشبوع هایدرو کاربنونو د تعاملونو ځانګړتیا د هغوی له ډلې څخه د الکاینونو ځانګړتیا دا ده چې جمعي تعاملونه ترسره کوي؛ خو د الکاینونو تعاملونه په دوو پړاونو کې ترسره کېږي. په لومړي پړاو کې جمعي تعامل په درې ګونې اړیکه کې ترسره کېږي چې الفین او دهغه مشتقات لاس ته راځي، په دویم پړاو کې اولفینونه او د هغوی تشکیل شوي مشتقات په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو بدلون مومي. د هایدروجن برونمایه سره د استیلین د تعامل میخانیکیت په لاندې ډول مطالعه کوو:





درې گونې اړيکه د دوه گونې اړيکې په نسبت د تودوخې په مقابل کې کلکه ده ، دا مطلب د استيلين لاس ته راوړنه د ميتان او د هغه له هومولوگو څخه د تودوخې ($1200^{\circ}\text{C} - 1500^{\circ}\text{C}$) د انشقاق په واسطه ډيرزېنه توضيح کېږي ، د S د اوريتال د برخې زياتوالي د اوريتالونو د هابرېد په حالتونو کې د کاربن د اتومونو برېښنايي منفيت زيات وي ، د کاربن او هايډروجن ترمنځ اړيکه ډيره قطبي کېږي:

جدول د کاربن د هابرېد ډول او د هغې برېښنايي منفيت

برېښنايي منفيت (EN)	په هابرېد اوريتالونو کې د S د اوريتال برخه	هابرېد ډلښ
2.5	$\frac{1}{4}$	sp^3
2.62	$\frac{1}{3}$	sp^2
2.75	$\frac{1}{2}$	sp

د استيلين د تيزايي خاصيت لامل هم په ماليکول کې د C-H اړيکې په څرگنده قطبيت پورې اړه لري، د اړيکې هوموليتيکي برخې کېدل او د راډيکال جوړېدل ستونزمن دی؛ خود اړيکې هتروليتيکي برخې کېدل په آساني سره ترسره کېږي:



د الکايونونو ځنې تعاملونه لاندې مطالعه کوو:


5-2-4-1: جمعې تعاملونه

الف - د هلو جنونونښتل: د هلو جنونو نښته په الکايونونو کې ، د الفينونو په نسبت ستونزمنه ده او ورو ، ورو ترسره کېږي. د برومين د اوبو له رنگ له منځه تلل د څو گونې اړيکې توصيفي تعامل روښانه کوي.



1,2 - dibromoethene


ب - په الکايونونو باندې د هايډروجن هلايدونو نښلول: هايډروجن هلايدونه د درې گونې اړيکې د پاسه د هغوي د نښلولو د دوه گونې اړيکې په پرته له ستونزو سره ترسره کېږي:



Vinyl fluoride

5-2-4-2: د الکايونونو هايډروجنين

د الکايونونو هايډروجنين د الکينونو په نسبت ورو ورو ترسره کېږي:



Ethene



5-4-3: د الکایونو هایدریشن


د الکایونو هایدریشن د الکینونو په نسبت په اسانۍ تر سره کېږي؛ خو د کلتستونو لکه د گوگرد تیزاب او د سیمابو دوه ولانسه مالګې شتون حتمي دي. په لومړي پړاو کې، بې ثباته مرکب جوړېږي؛ څکه د هایدروکسیل د ګروپ شتون په هغه کاربن کې چې دوه ګونې اړیکه ولري، د امکان دي؛ نو له دې کبله د هغه بڼه بدلون مومي؛ یعنې ایزومر ایزیشن یې ترسره کېږي او الیهیلونه جوړېږي، که چیرې استیلن هایلریشن شي، استیت الیهیلید جوړېږي:



Vinyl alcohol Acetaldehyde

د پورتنۍ تعامل پر بنسټ په صنعت کې استیت الیهیلید لاس ته راوړي.

د هایدریشن په پایله کې د استیلن له هومولوګونو څخه د هغه ایزولوګ کیتونونه جوړېږي:




5-4-4: د الکایونو اکسیدیشن

الکایونه په اسانۍ سره اکسیدي کېږي او د اکسیدیشن عملیه د زنجیر د درې ګوني اړیکې له برخې څخه په پری کېدو سره یو ځای ترسره کېږي:


$$\text{R} - \text{C} \equiv \text{CH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4, \text{O}_3} \text{R} - \text{COOH} + \text{CO}_2$$

الکایونه د پرتاشیم پرمنگانات اولین محلول بې رنگه کوي چې له دې تعامل څخه د درې ګوني اړیکې د توصیفې پیژندنې لپاره کېدای شي ګټه واخیستل شي. لاندې معادله پورتنۍ مطلب روښانه کوي:




5-4-5: د الکایونو پولیمر ایزیشن

الکایونه کولای شي چې د کلتستونو په شتون کې یو له بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیولو سره بیلابیل مرکبونه جوړ کړي:




که چیرې استیلن د تودوخې او سکرو په شتون کې ترلري میر ایزیشن شي، بنزین لاس ته راځي:



2-4-6: د الکایینونو تعویضي تعاملونه

د استیلین د مالیکول او د هغه د مونو الکایال مشتقاتو ($\text{CH}\equiv\text{CH}-\text{R}$) د هایډرورجن اتومونه ددې قدرت لري چې دفلزونو په واسطه تعویض شي، د استیلین او د هغه د مونو الکایال مشتقاتو ($\text{CH}\equiv\text{C}-\text{R}$) د هایډرورجن اتومونه د قوي القلیو د اغیزې له امله ؛ یعنې د القلي فلزونو امایډونه په منع امونیا کې د القلي فلزونو په واسطه تعویض کېږي او استیلایډونه (acetylide) جوړ وي .



په پورتنۍ تعامل کې الکایینونه د تیزابو په توګه عمل کړی او قوي القلیو ته یې پروتون ورکړی دی ، استیلایډونه د مالګو په شان مرکبونه دي او د اوبو په واسطه هایډرولیز کېږي. د استیلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف دي ؛ خود ایتیلین او ایتان په نسبت ډیر دی . د ګرینارډ معرفت ($\text{R}-\text{MgX}$) له الکایینونو سره تعامل کوي ، استیلایډونه جوړوي :






سودیم استیلایډ اومګنیزیم استیلایډ په بیلا بیلو سنتیزونو کې په کار وړل کېږي . کلسیم کار باید هم یو استیلایډ دی، که چېرې د سینټروزو نایتریت او د مسویو ولائسه نایتریت امونیا یې محلول ته له استیلین سره تعامل ورکول شي ، په ترتیب سره سپین او خرمایي رنګه رسوب حاصلېږي چې په وچ حالت کې د چاودیدنې ځانګړتیا لري:



فعالیت



د لاندې تعاملونو معادلې بشپړې کړئ :




3-5: استیلین

خالص استیلین بوی نه لري ، د استیلین بد بوي چې له کلسیم کار باید څخه لاس ته راځي په هغه کې د هایډروجن سلفایډ او فاسفین د مخلوطو په شکل شتون لري ، استیلین په اوبو کې منحل دي ، د استیلین مخلوط له هوا سره د چاودیدونکي خاصیت لرونکي دي ، په دې بنسټ د استیلین سره د کارکولو په وخت باید ډیر



احتياط وشي د استيلين له سوځيدو څخه په ډيره اندازه تودوخه (1300KJou/mol) توليد پري. استيلين چې د الكاينونو لومړی مرکب دی ، په ډیره گرمه لمبه په هوا کې سوزېږي او °C 3000 تودوخه توليد وي، چې د فلزونو په پري کولو او ولدينگ کولو کې ترې گټه اخيستل کېږي . دا مرکب د اوبو او کلسيم کاربايد له تعامل



د استيلين ځينو فزیکي خواص (3 - 5) جدول کې ذکر شوي دي



3-1: د استيلين کيميايي خواص

۱- د استيلين دا احتراق تعامل: استيلين په ازاده هوا کې احتراق کوي لویه ، کاربن ډلي اکسايډ او انرژي توليدوي :



2- د استيلين جمعې تعاملونه

الف - استيلين له هایدروجن سره تعامل کوي ، په لومړي پړاو کې ايتيلين او په دوهم پړاو کې ايتان تشکيلوي :



ب - استيلين د هلو جنونو سره تعامل کوي د الکينونو هلايد او الکانونو هلايد جوړوي



هغه ټول تعاملونه چې الکاينونه چې سرته رسوي، استيلين هم سرته رسوي .

3-2: د استيلين لاس ته راوړنه

1 - له کلسيم استيلايد هایدروليز څخه




فعاليت

د کلسيم کاربايد څخه د استيلين لاس ته راوړنه .

د اړتيا وړ مواد او لوازم : د کاربايد تيره ، مقطرې اوبه ، کورنل ، بنسټه يي تست تيوب ، له اوبو څخه ډک تش ، سوری لرونکی کارکي سيوېش او ايرلين ملير .


ګولاره : لږ څه کلسيم کاربايد په يوه ايرلين ملير کې واچوئ او د هغه سر په سوري لرونکي کارکي سيوېش سره و تري ، وروسته د کارکي سيوېش له سوريو څخه کورنل او پوقيف ايرلين ملير ته وده دننه کوئ او د قيف د لارې کلسيم کاربايد باندې او په ور زياتې کوئ کورنل تست تيوب چې د اوبو ډک تش کې سرچپه اېښودل شوی دی، رهبري کړي ، خپلي ليدني وليکئ .





(5-5) شکل له کلسیم کارباید څخه د استیلین دلاس ته راوړنې دستگاه

2- له چیرې ډای برومایتان ته د پوتاشیم هایدروکساید له الکولي محلول سر د تودوخې په شتون کې تعامل ورکړل شي ، استیلین لاس ته راځي:



3- که چیرې کاربن او هایدروجن د برېښنایي قوس له لارې د برېښنا په بهیر کې واچول شي ، استیلین لاس ته راځي



نومړۍ مثال که چیرې 5g کلسیم کارباید په اوبو کې واچول شي ، په STP شرایطو کې 1.12L استیلین حاصلېږي ، د کلسیم کارباید فیصدي په دې تعامل کې پیدا کړي .

حل: په لومړي پړاو کې د کلسیم استیلاید او اوبو د تعامل کیمیاوي معادله لیکو:



$$22.4\text{L} \quad - \quad 1\text{mol}$$

$$1.12\text{L} \quad - \quad n$$

$$n = \frac{1.12\text{L} \cdot 1\text{mol}}{22.4\text{L}} = 0.05\text{mol}$$

$$n_{\text{CaC}_2} = \frac{m}{M} \Rightarrow m_{\text{CaC}_2} = n \cdot M = 0.05\text{mol} \cdot 64\text{g/mol}$$



$$m_{\text{CaC}_2} = 3.2\text{g}$$

$$\text{W}\%_{\text{CaC}_2} = \frac{3.2\text{g} \cdot 100}{5\text{g}} = 64\%$$

دوهم مثال: د CaCO_3 د تعامل له بهیر څخه لاندې مرکبونه په لاس ته راوړئ:

الف - استیلین ب - ایتیلین ج - ایټان

حل: الف - $\text{CaCO}_3(s) \longrightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$





د پنځم څپر کی لنډیز

* د الکینونو د مرکبونو د هومولوګي سلسله د یو میتلین ګروپ ($-\text{CH}_2$) په اندازه یو له بل څخه توپیر لري چې

د هغوی عمومي فورمول C_nH_{2n} دی.

* که چیرې له الکانونه څخه دوه اتومه هایډروجن لرې شي ، د هغوی ایزولوګ الکین لاس ته راځي

* فضايي ایزومیري (Stereo isomeris) یوناني کلمه ده چې د جامد او کلکو جسمونو په معناده ، پر دې بنسټ دا ایزومیري هغو مرکبونو پورې اړه لري چې کلک فضايي جوړښت ولري او د هغوی هندسي بڼې په فضا کې بدلون ونه کړي.

* د الکینو کیمیايي خواص دوه ګوني اړیکي د سګما او پایي د اړیکو فضايي ځایونه ټاکي ، د سګما د اړیکې د الکتروني وړيځې کثافت د هغه خط له پاسه چې د دواړو اتومونو هستي سره نښلوي ، راټول شوی دی او د پایي د اړیکې د الکتروني وړيځې کثافت له دې چلېر بال څخه د باندې شتون لري چې د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. هڅونه د پایي د اړیکې بنسټیزه ځانګړتیا ده چې د دې الکترونونو اړیکه له هستي سره د سګما د الکترونونو د اړیکې په نسبت ضعیفه ده ، نو له دې کبله په اسانۍ سره قطبي کېږي او الکترون خوښوونکو ذرو (Electrophilic) ته د حملهې زمینه برابروي ، پر دې بنسټ د پایي اړیکه د هترولیکي په بڼه پري او جمعې تعاملونه ترسره کېږي. سګما او پایي د اړیکې ترمنځ د انرژۍ توپیر 270kJou/mol دی.

* الکینونو یو له بل سره جمعې تعاملونه سرته رسوي او په دې ترتیب پورې تړلې جوړوي .

* الکانیزونه غیر مشبوع هایډروکاربنونه دي چې د هغوی د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې ګوني اشتراکي اړیکه شته . د الکانیزونو عمومي فورمول یې $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ دی په دې فورمول کې کېدای شي چې $n \geq 2$ وي او ډیر کوچني مرکب د هغوی استیلین دی چې د هغه سیستمایټیک نوم Ethyne دي . که چیرې ynes وروستاوي لاین رقمونو ته چې د کاربن د اتومونو شمیر راښيي ، وزیات کړای شي ، د هغوی اوړنده الکانین لاس ته راځي.

په اوبو کې د کوچنیو الکانیزونو د حل کیدلو قابلیت د هغوی له ایزولوګ الکینونو او الکانونو څخه زیات دی ، خو سره له دې هم په اوبو کې لږ حل کېږي.

* د استیلین د تیزابي خاصیت لامل هم په مالیکول کې د $\text{C}-\text{H}$ اړیکې په څرګنده قطیت پورې اړه لري ، د



اړیکې هومولیتیکې پرې کېدل او د رادیکال جوړېدل ستورمن دی؛ خود اړیکې هترولیتیکې پرې کېدل په



* استیلین له سوزېدو څخه ډېره زیاته تودوخه (1300kJ/mole) تولیدېږي چې د فلزونو د پریکېدو په موخه ترې ګټه اخیستل کېږي.

د پنځم څپرکي پوښتنې او تمرین : څلور خواږه پوښتنې :

- 1- د ایتیلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري ؟
الف - یوه ګونې ب - دوه ګونې ج - درې ګونې د - اړونې
- 2- دوه ګونې اړیکه له ----- څخه جوړه شوې ده:
الف - یوه د سګما σ اړیکه او یوه د پای اړیکه π ب - دوه سګما اړیکې ، ج - دوې ډیلي اړیکې د - هېڅ یو
- 3- د کاربن هغه اتومونه چې په خپل منځ کې دوه ګونې اړیکه لري ، د هایدربنډ نریشن په کوم حالت شتون لري ؟
الف - sp^3 ب - sp^2 ج - sp د - sp^3d^2



الف - Iso octane ، ب - 4-Methyl-2-Heptene ج - الف او ب دواړه د هېڅ یو

۵- دوه ګونې اړیکې د درې ګونې اړیکې په نسبت په ----- اکسیدي کېږي .

الف - ورو ب - چېکښا ، ج - یوشان د - نه اکسیدي کېږي .



7- الکانیزنه د یوې ----- اړیکې لرونکي وي

الف - درې ګونې ، ب - دوه ګونې ، ج - یوه ګونې ، د - هېڅ یو .

8- C_nH_{2n} عمومي فورمول په کومو هایدروکاربنونو پورې اړه لري ؟

الف - الکانز نه ب - الکانیزنه ج - سایکلو الکانیزنه د - ب او ج دواړه سم دي .

9- په الکانیزنو باندې د هلو جنونو ټینسیدل له الفینونو څخه په ----- ترسره کېږي.

الف - سست او ورو ب - چټکتیا ، ج - په اساني د - تعامل نه کوي

10 - که چېرې YMe وروستاړي په لاندو رقمونو کې چې دکاربن د اټومونو شمیر په یو مرکب کې نښتي، وړ زيات شي، د هغه د اړوندې نوم حاصلېږي.

الفذ - الکانونو ب - الکینونو ج - الکاینونو د - سایکلو الکینونو.

11 - د برومین د اوبو د رنگ له منځته تلل د ----- اړیکې توصیفې تعامل ښکاره کوي:

الف - خو گوښي ب - خو گوښي ج - الف اوب دواړه د - هېڅ یو .



الف - $2\text{H}_2\text{O}$ ب - 2KBr ج - $\text{CH} \equiv \text{CH}$ د - هېڅ یو "

13 - د اسیتلین د تیزايي خاصیت د لرلو علت په مالیکول کې د ----- اړیکې په ښکاره قطعیت پورې اړه لري .

الف - $\text{C} - \text{C}$ ب - $\text{C} - \text{H}$ ج - $\text{C} = \text{C}$ د - $\text{C} = \text{C}$

14 - $\text{CH} \equiv \text{CH} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{CH} \equiv \text{CH} + \text{CH}_2$ تعامل محصول له----- څخه عبارت دی :


الف - $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ ب - $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ ج - $\text{CH} \equiv \text{CH}$ د - هېڅ یو

15 - د sp حالت لرونکي کاربن د الکترونېگانډيټي درجه له لاندې رقمونو څخه کوم یو ښکاره کوي.

الف - 2.75 ب - 2.5 ج - 2.65 د - 2.3

تشریحي پوښتنې

- 1 - د هغه الکاین مالیکولي فورمول تر لاسه کړئ چې د هغه په 0.63 گرامه کتله کې، 0.07 گرام هایدروجن شامل وي.
- 2 - دکاربن د ټولو اټومونو د هلیپرېد حالت چې په $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$ شتون لري، وټاکئ.
- 3 - د لاندې مرکبونه د IUPAC په لارې نوم ایښودنه وکړئ.





4 - د لاندې مرکبونو د جوړښت فورمولونه وليکئ


a- 1,2 -dichloro ethene b- 2,3 - dimethyl -2-pentene
c - 1,3- dibromo cyclo hexene d- Cis 3,4 dibromo -3-hexene
-pentyne e- 4 -methyl 2-pentyne f-2-
g-3-chloro-2-ethyl-1-pentyne h-1,3-pentadiene

5 - د لاندې کيميايي معادلې د مارکوف نیکوف د قاعدې په پام کې نيولو سره بشپړې او توضیح کړئ:




6 - د الکایینونو د تعريضي تعاملونو په اړه خپل معلومات وليکئ:

7 - کوم یو له لاندې مرکبونو څخه د سیس او ترانس ایزومیري لرونکي دي؟ هغه وليکئ:



اروماتيکي مرکبونه (Arenes)




د 19 پیړۍ د دویمې نیمایي په پیل کې هغه مرکبونه د اروماتیک په نامه یادیل کوم چې د طبیعي عطري مواد وڅخه په لاس راتلل ، اروماتیک مرکبونه د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکبونو څخه توپیر لري ، په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم دکیما له لحاظه دیوې سره هیتخ اړیکه نه لري . د دې کورنۍ مرکبونه په خپل مالیکول کې باثباته کاربنې کړۍ لري چې دځانگړو اړیکو لرونکي دي. په دې څپرکي کې د اروماتیک مرکبونو په اړه معلومات وړاندې شوي دي او دهغه په مطالعې به پوره شی چې اروماتیکونه کوم ډول مرکبونه دي ؟ د دې کورنۍ لومړني مرکب کوم دی ؟ زموږ په ژوند کې کوم ډول لوبوي ؟ څرنگه کولای شو چې دا مرکبونه په لاس راوړو ؟

6-1: د بنزين جو بنسټ

دارو مالیکو مرکبونو لومړنی مرکب بنزين دی چې په 19 پیړۍ کې د انګلیسي فزیک یوه مایکل (Myral Faraday) په واسطه د عضوي مرکبونو څخه لاس ته راغلي دي.


له څه مودې وروسته د ارومالیک بیلابیل مرکبونه په عطرونو کې تر لاسه او څرګنده شوه چې د اړوندو کیمیايي تعاملونو په واسطه کیدای شي دامرکبونه په بنزين بللون ومومي . په لومړي سر کې دا مرکبونه د بنزين د مستقلاتو په نوم او وروسته د ارومالیک مرکبونو یا عطري موادو په نوم یاد شوي دي ؛ ځکه د دوي زیاتره غښتلی او په زړه پوري بڼې لري .

د بنزين په کچه چې یو ساده ارومالیک مرکب دی، نور مرکبونو دومره د علماوو پام ځان ته گرځولی نه ؛ له دې کبله علماوو د بنزين لپاره د فیروزیانو جوړښتیو فورمولونو وړاندیز کړی دی چې د هغوی له ډلې څخه د کیکولي وړاندې شوی فورمول په 1865 کال کې د بنزين لپاره ثبت برابر دی، د کیکولي له فورمول سره سم بنزين سایکلو هگزا تراین (1,3,5-cyclohexatriene) دی چې یو هایدروکاربن د شپږ کړیزه اضلاعو د درې مزدجو اړیکو لرونکی مرکب دی.



د کاربن او هایدروجن د ټولو اتومونو دا جوړښت یو شان ارزښت او د بنزين ځنې نورې ځانګړتیاوې روښانه کوي؛ خو دا فورمول نه شي کولای روښانه کړي چې ولې بنزين د غیر مشبوع هایدروکاربنونو خواص نه لري؟ بنزين د غیر مشبوع مرکبونو د تعاملونو ځانګړتیاوې له ځان څخه نه ښکاره کوي ؛ یعنې د برومین اوبه او د پوټاشیم پرمځګات د القلي محلول رنګ ته بدلون ورکولی نه شي؛ بنزين له برومین سره د جمعي تعاملونو پر ځای تعویضي تعاملونه ترسره کوي ؛ کله چې د بنزين د مالیکول د هایدروجن اتومونه د برومین په واسطه تعویض شي ، د C_6H_5Br مرکب تشکیلېږي .


د بنزين د جمعي تعاملونو امکان په ځانګړو شرایطو کې شته دی او د هغه له هایدروجنیشن څخه د کلسټ په شتون کې سایکلو هگزان لاس ته راځي:



له پورتنۍ څیړنې څخه معلومېږي چې بنزين غیر مشبوع خواص له ځان څخه ښکاره کوي ؛ خو په عادي شرایطو کې یې دا ځانګړتیا کمزوري ده، د بنزين د تودوخې مقاومت تر $900^\circ C$ پورې دی .

د کیمیايي اړیکو په اړه د الکتروني نظریاتو پر اختیا او د میخانیک کوانت نظریو د ارومالیکو مرکبونو د ځانګړتیاو د روښانولو امکان برابر کړی دی . د بنزين د مالیکول انرژي کیدای شي چې په بیلابیلو لارو وټاکل شي ، د هغوی پايلي ښکاره کوي چې د بنزين رښتیايي مالیکول ، له سایکلو هگزا تراین څخه لږه انرژي لري ، کوم چې د هغوی اړیکو ښودلې ده . د سایکلو هگزا تراین د مالیکول دسوزیدو تودوخه 3453 kJ/mol ده؛ خو د بنزين د مالیکول دسوزیدو تودوخه چې په تجربې ډول لاس ته راغلي ، 2303 kJ/mol د سایکلو هگزين

هایدوجنیشن د انرژي د ازایدو سره ترسره کېږي؛ په داسې حال کې چې د بنزین هایدروجنیشن د انرژي له جذب سره یوځای ترسره کېږي. د بنزین او هغه ته د ورته مرکبونو کیمیايي خواص ډیر حیرانوونکي دي، سره له دې چې د بنزین مرکبونه غیر مشبوع دي، الکینونو او الکینونو ته ورته دي؛ خو جمعې تعاملونه په دې مرکبونو کې ډیر لږ ترسره کېږي، برعکس تعویضي تعاملونه په ښه توګه ترسره کوي، له دې امله اروماتیک مرکبونه له عادي غیر مشبوع مرکبونو څخه توپیر لري او د هغوی ځانګړي خواص د بنزین په ګډه او هغه مرکبونو پورې اړه لري. د بنزین جمعې فورمول C_6H_6 دي او له هګزان (C_6H_{12}) څخه، د هایدروجن اتومه او له هګزین څخه د هایدروجن 4 اتومه کم لري. په بنزین کې دایرېکو اوږدوالي 140 پیکامتر او جوړښت یې د ریزونانس په حالت اړیکو لرونکي دي کوم چې په لاندې شکل کې لیدل کېږي:




(ب)

(الف)






(6-1)، شکل طول او په یې اړیکې ښي زاوړي، ب - د بنزین په مالیکول کې د π اړوپیټالونو ښودل څرګه چې اروماتیک هایدروکاربنونه غیر مشبوع دي؛ نوله دې کبله هغوی د ene په وروستایي، الکینونو ته ورته او د Ar مخایي چې له ارومات (Aromate) څخه مشتق شوې دي، نوم ایښودنه شوي ده؛ پر دې بنسټ د هغوی سیستماتیک نوم Arene ایښودل شوی دی. د اړین مرکبونه د بنزین په ساده بڼې سره ډیر د څو کربونو مرکبونو په ښه هم شته؛ دیبلګې په ډول: د بنزین د دوو یا څو کربونو د یو ځای کیډلو له امله بیلابیل مرکبونه جوړېږي. نفتالین $C_{10}H_8$ او انتراسین $C_{14}H_{10}$ څو کربونو ډیر مهم مرکبونه دي، د هغوی فورمول د بنزین دکربو او له C_2H_2 - (ایټلین) ګروپونو څخه جوړ شوی دی.

د اروماتونو د ککړ په اړه د هیوکل (Huckel) په نوم عالم یوه قاعده منځ ته راوړه چې د دې قاعدې په بنسټ هغه کړی د اروماتیک ځانګړتیا لري چې د هغوی د پلې (π) الکترونونو شمیر د $(4n+2)$ سره سمون ولري، په دې فورمول کې n د کربو شمیر ښکاره کوي. د اروماتیکو سیستمو بیلګې چې د 10 او 14 الکترونونو لرونکي دي، عبارت دي له:




په (6-1) جدول کې د بنزین د مشتقاتو ډولونه د هغود سیستماتیک او مروج نومونې سره وړاندې شوي دي، نوموړي مرکبونه د ډبرو سکرو له تقطیر څخه حاصلېږي.

(6-1) جدول د بنزینو د مشتقاتو له سیستماتیک او مروج نومونو سره

فرمول	سیستماتیک نوم	مروج نوم	د استعمال ځایونه يي
	هایدروکسي بنزین	فینول	د پوړۍ میرونو برابرولو لپاره
	متیل بنزین	تولین	د رنگونو خلا او د لاکو جوړولو کې
	1,2Dimethyl Benzene	اورتو کازلین	د رنگونو خلا او حشر وژونکو موادو کې
	Metal,3- dimethyl Benzene	میتاکرلین	
	Para 1,4- dimethyl benzene	پارا کرلین	
$CH_3 - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$	ethylene phenyl	استادین	پوړۍ میرونه جوړوي
	Naphthalene	Naphthalene	د کوبی وژل
	Anthracene	انتراسین	د مرکبونو له مرصونو څخه مخنیوی
	Di phenyl	Biphenyl	له ځینو ناروغیو څخه د مخنيوي لپاره
	Amino Benzene	انیلین	پوړۍ میرونه اورنکه مواد
	Benzoic acid	بنزوېک اسید	
	بنزالدیهاید	بنزالدیهاید	
	الکایل بنزسلفونات	الکایل بنزین سلفونات	په 1440 کال کې د کالو مینځلو پودر کشف شو


2-6: د اروماتیک مرکبو نو نوم ایښودنه

زیاتو اروماتیک مرکبو خپل هغه مروج نمونه ساتلي دي کوم چې د هغوی اصلي پیاښت پوری اړه لري ؛ دیلگي په ډول : ټولین Toluene ($C_6H_5 - CH_3$) د فو له کڼه څخه چې د (Baumde Tolu) له ډول څخه دي او په جنوبي امریکا کې موندل کېږي ، لاس ته راغلي دي ؛ خود هغه سیستماتیک نوم Methyl benzene دی ؛ ځکه د بنزین د مالیکول د هایدروجن د اتومونو څخه یو CH_3 - پاتې شوني په واسطه تعویض شوي دي ، که چېرې څو پاتې شونو د بنزین د هایدروجن اتومونه تعویض کړي وي ، تر لاسه شوي مرکب بیلابیلې ایزومیري لري چې د هغوی بیلگه کیډای شي ، ډلي میتیل بنزین (Dimethylbenzene) وړاندې کړای شي :



درې پورتنی ایزومیري د مروجو نومونو د (Xylene) په نامه یادېږي ؛ ځکه دوی د لرگیو له تقصیر څخه حاصل شوي دي چې د لرگی یوناني نوم (xulon) دی ، *ortho* ، *Meta* او *Para* مختاړي هم پخوانی یوناني کلمې دي چې په ترتیب سره له نیغ ، وروسته د مخامخ په معنا دي . که چېرې دواړه پاتې شوني بیلابیل ترکیبونه ولري ، همدا مختاړي د هغوی په نومونو کې ور زیاتېږي .

که چېرې د بنزین ډکری ، څو اتومونه هایدروجن په بیلابیلو گروپونو تعویض شوي وي ، د هغوی سیستماتیک نوم ایښودنه له پورتنیو څرگندونو سره سم ترسره کېږي ؛ دیلگي په ډول :



3-6: د اروماتیکو هایدرو کاربنو نو تعاملونه

1-3-6: جمععی تعاملونه

سره له دې چې ټول اړینونه (Arenes) له غیر مشبوع هایدرو کاربنونو له ډولو څخه دي ؛ خو د جمععی ترکیبي میل له ځانه ښکاره کوي ، په ځانگړو شرایطو کې چې د تودوخې درجه $200C^\circ$ وه د Pt او Ni د کلسټ په شتون او لوړ فشار کې کیډای شي چې د هایدروجن درې مالیکوله په بنزین وزیات او Cyclo Hexane






تر لاسته شوي:

په دې صورت کې د بنزين درې د π اړيکې پرې کېږي. دا اړيکې په (6 - 1) شکل کې وړاندې شوي دي چې د بنزين وړانديس په ښه شتون لري او د π د الکتروني ورېځې کثافت د کاربن په ټولو اټومونو باندې په يو ډول خپور شوي دي، په همدې دليل جمعې تعامل د بنزين په گرې کې له ستونزو سره ترسره کېږي. سايلکلو هگزان د بنزينو پر خلاف مسطحه نه دي او د څوکۍ په شان فضايي جوړښت لري، د کاربن 6 واړه اټومونه څلور مخه جوړښت لري چې هغه مو په (6 - 1) شکل کې وليدل.


6-3-2: د بنزين سره د کلورين جمعې تعاملونه

د (6 - 1) شکل سره سم د کلورين گاز په ډک بالون کې څو څاڅکي بنزين ورزيات کړئ، وروسته هغه د لرگي سر پوښ او پښې په واسطه وتړئ او ټکان ورکړئ چې ټول زيات شوي بنزين په براس تبديل شي، د رڼا په نشتوالي کې تعامل نه ترسره کېږي، کله چې بالون د رڼا په مخامخ واقع شي، تعامل پيل کېږي او د کلورين شين رنگ له منځه ځي چې سپين رنگي لوگي د بالون په دننه کې ليدل کېږي، د حاصل شوي دود تحليل او تجزيه ښکاره کوي چې له بنزين سره کلورين جمعې تعامل ترسره کړی دي چې دهغه د تعامل معادله په لاندې ډول ده:



حاصل شوي مرکب Hexa Chloro Cyclohexane - 1,2,3,4,5,6 دي او دهغه جوړښت


سايلکلو هگزان ته ورته او د چوکۍ په شان دی. لاندې شکل د نوموړي تعامل بهير راښيي



(6 - 2) شکل د بنزين سره د کلورين تعامل

6-3-3: په ارومانونو کې تعويضي تعاملونه

په الکينونو او الکانونو کې جمعې تعاملونه د تعويضي تعاملونو په نسبت په اسانۍ سره ترسره کېږي؛ د بېلگې په ډول: الکينونه په اسانۍ سره د برومين اټومونه په خپلو دوو کاربنونو کې چې دوه گونې اړيکه لري، ښکېلي او په ډای هلايد الکانونو (ډای برومو الکانونو) بې بدلېږي؛ خو د بنزين په گرې کې، فلورين د بنزين ډکړې د کاربنونو د هلايدروجن اټومونه تعويض وي او دا تعويض هم دکتلستونو (FeF_3) په شتون کې ترسره کېږي:




د بنزين او دفلورين تعامل چاودېدونکی تعامل دی؛ خو د بنزين او دکلورين تعامل د ليريس تيز اټونو ($\text{AlCl}_3\text{FeCl}_3$) په شتون کې ترسره کېږي:




دالکایل اونورو پاتې شونو په واسطه دبنزین په مالیکولو کې د هایدروجن د اټومونو تعویض د فریدل (Friedel Charles) اوکرفت (1832 – 1899) (James Craft م) په نوم پوهانو په طبقه ترسره کېږي چې د هغوی بیلګې په لاندې ډول دي:

1 – د اروماتونو نایتریشن

د اروماتونو په کېږو کې د نایتروجن (NO_2) د ګروپ دننه کول د نایتریشن (Nitration) د تعامل په نوم یادېږي، نوموړی تعامل د غلیظو ګوګرو تیرابو او غلیظو بنوري تیرابو د مخلوطولو په واسطه لاس ته راځي. د نایتریشن کولو عامل د NO_2^+ ایون دي چې په دې مخلوط کې په لاندې ډول تشکیلېږي:




په وروستي پړاو کې د نایترو کیتون د اړیکو د الکترونونو ورېځو په ساحه کې د اروماتیک کړۍ د حملې لاندې نیسي چې په پایله کې په لومړي سر کې پایي کامپلکس او بیا د سګما کامپلکس دبنزین د کړۍ د کاربن د اټوم او نایترو ګروپ ترمنځ د کووالنټ اړیکو په لرلو سره منځ ته راځي، په وروستي پړاو کې داروماتونو کړۍ د هایدروجن اټوم جلا او له HSO_4^- سره تعامل کوي چې H_2SO_4 بیرته جوړېږي:



2 – د اروماتونو هلوچښن

د بنزین د هستې هلوچښن د هلوچنونو په کومک د کتلستونو په شتون کې ترسره کېږي، په ډیره کچه د کتلست په توګه د المونیم او اوسپنې د هلایدونو؛ لکه: FeBr_3 ، FeCl_3 ، AlBr_3 ، AlCl_3 او نورو څخه ګټه اخیستل کېږي، کتلستونه دخپل عمل په واسطه د الکتروفيلي ټوکې د هلوچن اټومونو د اړیکې د قطبي کولو په پایله کې منځته راوړي؛ د بیلګې په ډول: په المونیم کلوراید کې د المونیم اټوم شپږ الکترونه په خپل ولانسي قشر کې تر لاسه کړي دي؛ خو بیا هم د هغه او کټیت پوره نه دی، نو دخپل او کټیت د پوره کولو لپاره د کلورین د مالیکول د اټوم دوه الکترونه دخان خواته کش کوي، د الکتروني ورېځې کشولو په پایله کې د کلورین د مالیکول دویم اټوم لږ څه مثبت چارج تر لاسه کوي او د الکتروفيلي ځانګړتیا له ځانه ښيي:



لاندې سلسله د هلوچنونو کیمیايي فعالیت ښيي:




هایدروجن د اټومونو تعویض د سلفونیشن په نوم یادېږي . د سلفونیشن تعامل تل دارو متیک هایدرو کاربونونو ته د تودوخې په ورکولو سره د غلیظو گوگردیزو په شتون کې ترسره کېږي.




د الكايليشن تعامل په نوم يادېږي. الكايليشن په دوو طريقو تر سره کېږي:

الف - د اوبو نه لرونکي المونيم هلايد د کنست په شتون کې په بنزين باندې د الکايال هلايدونو د عمل په واسطه،

دفریدل (Friedel-Crafts): به طریقہ



د دې تعامل په پايله کې کيټونونه جوړېږي، داستينز د فريډل – کرفټ په طريقه د اساليشن په نوم يادېږي چې د تعامل ميخانيکيت يې په لاندې ډول دی :



اور اللہ کے رسولؐ کی غیبی وحی کی سلسلہ

کے لئے کہیں کوئی اور جگہ نہ ملے تو یہاں ہی رہنا پڑے گا۔

علیٰ بن ابی طالبؑ کی بیعت کی خبر پر حضرت علیؑ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیعت ہے

کتابخانه


تیسری شہرکیجین صدارت لکھی کہ (N₂O₅)
ایک شہر کا گلاب چھٹی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(400°C)




د بنزين په هومولوگونو باندې د اکسیدانتونو د اغيزې له امله ، د هغوی د الکایل څنګیز زنځیر اکسیدیشن او تخریب کېږي ، چې یوازې کړۍ ته نژدې کاربن په کاربوکسیل گروپ تبدیلېږي (د بنزين کړۍ پورې ټول تړلي زنځیرونه په کاربوکسیل گروپ تبدیلېږي) :



د پورتنۍ تعامل یو واسطه ډیول لاس ته راغلو داروماتیکو تیزلونو په پام کې نیولو سره کیدای شي چې دهغوی د څنګ (جانبی) زنځیرونو ځای او تعداد وټاکل شي . د بنزين د څو کړیو مهم مرکبونه په لاندې ډول دي:

نفتالین Naphthalene

د نفتالین مالیکولي فورمول C_{10}H_6 دی ، د مرکب 1819 م کال کې د ډیرو سکرو د قیر له کنډه څخه تر لاسه شوي او د هغه جوړښت د وسکر سینسکي (A.A. Voskresensky) په واسطه ټاکل شوی دی ، نفتالین کرسټلي جامده ماده ده او ټاکلي بوي لري ، د ویلې کیدو درجه یې 80°C او د هغه د ایشیدو درجه 218°C ده، نفتالین رنگه ماده ده ، په اسانۍ سره الوڅي او حتی په عادي تودوخه کې براس کېږي ، نفتالین په اوبو کې نه حلېږي ؛ خو په عضوي حل کوونکو کې حل کېږي . له نفتالین څخه ډکوری ضد درمل په توګه کار اخیستل کېږي . د نفتالین د مالیکول کاربنی اسکلیټ د بنزين له دوو هستو څخه جوړ شوی دی چې د کاربن د دوو اتومونو په واسطه شریکي او متراکم شوي دي ، د نفتالین په مالیکول کې د بنزين په شان نه مطلق دوه ګوني اړیکې اونه یوه ګوني اړیکې شتون لري . د پلې (π) الکترونونه په ټولې کړۍ کې د ډیلو کالیزیشن په حالت کې شتون لري ، د نفتالین د جوړښت فورمول او موډل په لاندې ډول دی :




(3-6) شکل د نفتالین موډل او فورمول


د نفتالين په ماليکول کې د کاربن ټول اتومونه يو شان ارزښت نه لري ،د الفا کاربنونه (Carbons) $\alpha - 1, 4, 5, 8$ په ځايونو سره يو له بل څخه توپير لري د نفتالين د کرستلونو راډيو گرافي څيړنې رانښيي چې د نفتالين ماليکول مسطح جوړښت لري او د کاربن - کاربن د ټولو اړيکو اوږدوالی د يو گونو اړيکو او د دوو گونو اړيکو ترمنځ قيمت لري.

د نفتالين تعويضي تعاملونه

سلفونيشن: د نفتالين له عمده ځانگړتياوو څخه يو د هغه سلفونيشن تعامل دی، دا تعامل د شرايطو په پام کې نيولو سره کيږي شي الفا- نفتالين سلفونیک اسيد او يا بيتا - نفتالين سلفونیک اسيد په جوړولو پاتی ته ورسېږي:



د نفتالين اکسیديشن: نفتالين له بنزين څخه په اسانۍ سره اکسیدي کېږي چې په دې عملیه کې د هغه له کړيو څخه يوه تخریب او د هغه له الفا کاربنونو څخه د کاربوکسيل په گروپونو تبديليږي چې په پايله کې دوه قيمته تيراب نفتالیک اسيد جوړېږي:




Naphthalene

Phthalic acid

انتراسين (Anthracene)

د انتراسين ماليکولي فورمول $C_{14}H_{10}$ دی ،دا مرکب د قير په کنډ او د انتراسين په غوړيو کې شتون لري چې له هغوي څخه د تېلو په طريقه جلاکيږي ،انتراسين د الوتني په طريقې سره جلاکوي، خالص انتراسين يو جامد کرسټلي او بې رنگه ماده ده او د لاجوردي فلورسنس لرونکي دي، د هغه د ويلي کيلو درجه $217^{\circ}C$ او د ايشيلو درجه يې $354^{\circ}C$ ده. انتراسين په اوبو کې غير منحل او په تودو بنزينو کې په اسانۍ سره حل کېږي. انتراسين له خو هستو لرونکو اروماتيک هايډروکاربنونو څخه عبارت دي چې د خطي بنزين له دريو متراکرم هستو څخه جوړ شوی او دهستو جوړښت يې مسطح دی. د هغه اسکلتي جوړښتي فورمول په لاندې ډول دی:




د انتراسين په ماليکول کې د کاربن ټول اتومونه د نفتالين د ماليکول په شان يوشان ځای نه نيسي. د الفا ځايونه (1-، 4-، 5-، 8)، او بيتا β (2، 3، 6، 7) (او ميزو (meso) 9-10) دي چې په دې ځايونو سره يو له بل څخه توپير کيږي او په دې بنسټ د انتراسين د يو تعويضه مشتق د الفا - بيتا او ميزو (meso) ايزومرونو لرونکي دي ، همدا رنگه د انتراسين په فورمول کې يې اړيکو برابر والي نه په سترگو کېږي.

د انتراسین کیمیايي خواص: د انتراسین کیمیايي خواص او بنترین خواصو ته ورته دي؛ خو د

هغوی په نسبت زیات فعال دي، انتراسین تعویضي تعاملونو نه (هلو جنش، تاثیرش، سلفونیشن ترسره کوي، او له خان څخه ارومالیک خواص ښيي چې جمعي تعاملونه په اسانۍ سره ترسره کوي. 9- 10 - meso) ځایونه د کیمیايي فعالیت د لرلو په بنسټ له نورو ځایونو څخه زیات توپیر لري؛ له دې امله تعویضي تعامل او جمعي تعامل په منځنۍ هستې کې ترسره کېږي، په 9- 10 - ځایونو کې د جمعي تعاملونو ترسره کېدلو په پایله کې دواړو څنګونو کربون په ارومالیکي سیګسټ (Sextet) ثابت حاصل کړي دي.


د انتراسین تعویضي تعامل:

1- **هلو جنش:** په لومړي سر کې کلورین او برومین د تودوخې په 0°C کې 9 او 10 ځایونو کې ښلول کېږي، دای کلوریا یا دای بروموانتراسین جوړوي او وروسته له دې د لږې تودوخې په واسطه هایدروجن هالاید له دې ځایونو څخه جلا او د تعامل محصول 9- کلورو انتراسین لاس ته راځي:



2- **د انتراسین نایتریشن:** د ښورې د تیزابو د عمل په پایله کې لومړی ېې ثابته جمعي محصول

تولیدېږي او وروسته د اوبو د جلا کېدلو د انتراسین تعویضي محصول یعنې 9- نایټرو انتراسین تشکیلېږي:





د شپږم څپرکي لنډيز

- * اروماتيک مرکبونه په خپل ماليکول کې ټينگې کارني کړی لري چې دځانگړو اړيکو لرونکي دي.
- * دارومليکو مرکبونو لومړنی مرکب بنزين دی چې په 19 پيړۍ کې د انگليسي فزيک پوه مايکل (Mycal Farady) په واسطه له عضوي مرکبونو څخه لاس ته راوړل شو.
- * بنزين د نا مشبوع مرکبونو د تعاملونو ځانگړتياوې له ځان څخه نه ښکاره کوي ؛ يعنې د برومين اوبه او د پوټاشيم پرمنگنات د القلي محلول رنگ ته بدلون نه شي ورکولی ، بنزين له برومين سره دجمعي تعاملونو پرځای تعويضي تعاملونه ترسره کوي ؛ کله چې د بنزين د ماليکول د هايدروجن اتومونه د برومين په واسطه تعويض شي د C_6H_5Br مرکب تشکيلېږي .


* بنزين او هغه ته د ورته مرکبونو کيميايي خواص ډير حيرانوونکي دي ، سره له دې چې د بنزين مرکبونه نا مشبوع د او الکينونو او الکيلينونو ته ورته دي ؛ خو جمعي تعاملونه په دې مرکبونو کې ډير لږ ترسره کېږي او برعکس تعويضي تعاملونه په ښه توگه تر سره کوي ، له دې امله اروماتيک مرکبونه له عالي غير مشبوع مرکبونو څخه توپير لري او د هغوی ځانگړي خواص د بنزين په گړۍ او دهغه په مرکبونو پورې اړه لري .

* څرنگه چې اروماتيک هايدروکاربونونه نا مشبوع دي ؛ نو له دې کبله هغوی د ene په وروستياي ، الکينونو ته ورته او د Air دمختاری چې له ارومات (Aromate) څخه مشتق شوی دی ، نوم ايښودنه شوی ده؛ پر دې بنسټ د هغوی سيسټماتيک نوم Arene ايښودل شوی دی .

- * د اروماتونو د کرکټر په اړه د هيوکل (Huckel) په نوم عالم قاعده يې منځ ته راوړه چې د دې قاعدې په بنسټ هغه کړۍ د اروماتيک ځانگړتيا لري کوم چې د هغوي د پلې (π) د الکټرونونو شمير له $(4n+2)$ سره سمون ولري
- * په الکينونو او الکيلينونو کې جمعي تعاملونه د تعويضي تعاملونو په نسبت په اسانۍ تر سره کېږي ؛ د بېلگې په ډول : الکينونه په اسانۍ سره د برومين اتومونه په خپلو دوو کاربنونو کې چې دوه گونې اړيکه لري ، نښلوي او په دای هلايد الکانونو (دای برومو الکانونو) بې بدلوي ؛ خو د بنزين په کړۍ کې ، فلورين د بنزين دکړۍ د کاربنونو د هايدروجن اتومونو نه تعويضي او دا تعويض هم دکنسلتونو (FeF_3) په شتون کې تر سره کېږي .
- * اروماتونه داکسيداتونو په مقابل کې غښتلي دي ،اکسيداتونه لکه : نايټريک اسيد ، د کروميک اسيد محلول ، د پوټاشيم پرمنگنات محلول او د هايدروجن پراکسايډ محلول په عالي شرايطو کې په بنزين اغيزه نه کوي ، د اروماتونو ثبات د قوي اکسيداتونو په مقابل کې د پارافينونو په نسبت زيات دی .

* د نفتالين په ماليکول کې دکاربن ټول اتومونه يو شان ارزښت نه لري ،د الفا کاربنونه ($\alpha - Carbon$) په 1،4،5،8، ځايونو سره او د بيتا کاربنونه ($\beta - Carbon$) په 2،3،6،7 ځايونو سره يو له بل څخه توپير لري


* انټراسين له څو هستو لرونکو اروماتيکو هايدروکاربونو څخه عبارت دی چې د خطي بنزين له دريو متر اکم شوهستو څخه جوړوي او هستوي جوړښت يې مسطح دی . د هغه د اسکلېي جوړښتي فورمول په لاندي ډول دی :



د شپږم څپر کې پوښتنې او تمرین

څلور څو ابه سوالونه

- 1- دارو مالونو لومړنۍ مرکب یعنې بنزین د کوم عالم په واسطه له عضوي مرکبونو څخه استحصال شو؟
الف - مایکل فارادی ب - Mycal Farady ج - کیکولی د - الف او ب دواړه سم دي
- 2- له لاندې مرکبونو څخه کوم یو اروماتیک دی؟



III



II



I

- الف - لومړی فورمول ب - دوهم فورمول ج - دریم فورمول د - دوهم او دریم دواړه سم دي
- 3- له لاندې مطالبو څخه کوم یو د بنزین د مالیکول به اړه سم دي؟
الف - 62 الکترون ب - 6 الکترون ج - 12 الکترون د - 16 الکترون
 - 4- د بنزین حرارتي مقاومت څومره دي؟

الف - تا 700°C ب - تا 1900°C ج - تا 900°C د - تا 920°C

- 5- هغه کړۍ د اروماتیک خاصیت لرونکي ده چې ددغې د پلي π الکترونونو شمیر د..... سره سمون ولري.

الف - $(4n+2)$ ب - $(2n+4)$ ج - $(3n+2)$ د - هېڅ یو

- 6- په 200°C تودوخه، Pt او Ni د کنسټ په شتون او لوړ فشار کې کیدای شي چې د هایدروجن درې مالیکوله پر بنزین وزنات او په لاس راوړشي:

الف - Cyclo Hexene ب - Cyclo Hexane ج - Hexane د - بنزین جمعوي تعامل سرته رسولی نه شي.

- 7- د اروماتونو په کړۍ کې د نایټرو د گروپ (NO_2 -) داخلول د تعامل په نوم یادوي:

الف - نایټریشن ب - Nitration ج - الف او ب دواړه د- هېڅ یو.

- 8- د بنزین په کړۍ او د هغه په مالیکولونو باندې د الکیل د گروپ نېټول د په نوم یادېږي.

الف - هایدریشن ب - الکالایشن ج - Alkylation د - ب او ج دواړه.

- 9- کومې لاندې جملې د نفتالین په هکله صحیح دي؟

لومړی: د امرکب د H_{10} مالیکولي فورمول لرونکی دی.







دویم: ذکر شوی مرکب له هایدروجن سره دکوټې په تودوخه کې تعامل کوي:

دریمه: یو الفاتیک مرکب دی:

الف - یوازې لومړۍ جز، ب- یوازې دوهم جز، ج- یوازې دریم جز، د- لومړی او دویم جز، ه- لومړی او دریم جز

تشریحي پوښتي :

- 1 - د بنزین په مالیکول کې د اړیکو د څرنگوالي په اړه توضیحات وړاندې کړئ
- 2 - د لاندې مرکبونو نوم ایښودنه وکړئ:



- 3 - د لاندې اروماتیک مرکبونو جوړښتیز فورمولونه رسم کړئ:

(a) nitro benzen , b) m-chlorophenol , c) p-chlorophenol

d) o-ethyl nitro benzene,e) 1-bromo-2-methyl -3- phenyl cyclohexane

- 4 - C_8H_{10} د مالیکولي فورمول لرونکي اروماتیک مرکب د ایزومریو جوړښتیز فورمولونه ولیکئ.

- 5 - د لاندې مرکبونو د سون تعاملونو (Combustion) معادلې ولیکئ :

الف - بنزین ب - تالوین ج - نفتالین د - انتراسین

- 6 - د بنزین له لاندې تعاملونو څخه کوم یو درلودکس د تعاملونو له ډولونو څخه دی ؟ په دې اړه توضیحات ورکړئ:

الف - نایتریشن ب - سلفونیشن ج - برومینیشن د - الکالایشن

- 7 - څو لیتره هایدروجن ته اړتیا چې ترڅو 15.6 بنزین مشوع کړي (په STP شرایطو)

- 8 - د فیلر گرفت د تعامل د میتود پر بنسټ ، له 26.5 الکال بنزین څخه 0.25 مول بنزین لاس ته راغلی دي ،

ډېرین حاصلشوي مشتق جوړښت وټاکئ.

- 9 - بنزین ته له هغو مرکبونو سره تعامل ورکړئ کوم چه بیونایل بنزین او الیل بنزین حاصل شي

- 10 - 750 د محلول NaOH ملي لیتره د سودیم بنزوئیت سره تعامل کړی ، چې 23.4 گرام بنزین تولید شوي

حي ، د سودیم هایدروکساید مولاریټي پیداکړئ.




که چيرې د هايډروکاربنونو د هايډروجن اتومونه د هلو جنونو د پيو او يا خو اتومونو په واسطه تعويض شي، د هلايدونو په نامه د هايډروکاربنونو هلو جنې مشتقات منځ ته راځي. دا مرکبونه د انسانانو په ژوند او صنعت کې بنسټيز رول لوبوي. د هغوي فورمول $R-X$ دی. په دې خپرکي به دا مرکبونه خپري او زده به پي کړئ چې الکايل هلايدونه څه ډول عضوي مرکبونه دي او کوم خواص لري؟ څرنگه کيدای شي چې هغوي په لاس راوړل شي؟ د طبابت او صنعت په کومو برخو کې به کار وړل کيږي؟ څرنگه د دې مرکبونو نوم اېښودنه کيږي؟ د دې خپرکي په مطالعې به د الکايل هلو جنيدونو سره اشنا او د هغوی به په کارونه په بيلابيلو برخو کې زده کړئ.

7- 1: الکایل هلايدونه

الکایل هلايدونه د هایدروکاربنونو هلو جني مشتقات دي چې د هلو جنونو په واسطه د هایدروکاربنونو يو او يا خو د هایدروجن داتومونونو د تعويض له امله لاس ته راځي. تر اوسه د فلورین ، کلورین ، برومین او ایودین مرکبونه پېژندل شوي دي. د هایدروکاربنونو هلايدونه کېدای شي ، مونو هلايدونه او يا پولي هلايدونه وي.

عضوي هلو جن لرونکی مرکبونه په طبیعت کې ډیر دي چې په ننني صنعت کې ډیر کارول کېږي، په طبیعي توکو کې موزل کېږي. په زرگونو هلو جن لرونکي عضوي مرکبونه په الجیو او نور سمندري ژوندیو کې شته دي؛ د بیلګې په ډول: د اوقیانوسونو په قهوه ای الجیو کې CH_3Cl شته دي او د ځنگلونو د سوزیدو په بهیر او په اورښندنو کې هم تولیدېږي. په صنعت کې د دې مرکبونو څخه د محلول په توګه او د والګي ناروغي په وخت کې د دارو او درمل په توګه ګټه اخیستل کېږي، ترای کلورو ایتیلین په الکترونیکي صنایعو کې ډیر کارول کېږي.


د الکایل هلايدونو ځینې مرکبونه په لاندې ډول دي:




ترای کلورو ایتیلین ښه محلول دي ، هلو تان استریزېک ډېي هوبڼه کولو ماده ده .

7- 1- 1 د الکایل هلايدونو نوم ایښودنه

د الکایل هلايدونو عمومي فورمول $C_nH_{2n+1}X$ دي چې په دې فورمول کې X کېدای شي I, Br, Cl, F وي. د الکایل هلايدونو نوم ایښودنه داسې ترسره کېږي چې په لومړي سر کې د الکایل د رادیکال نوم لیکل کېږي او بیا د هلو جنونو نوم د صفت په توګه د *ide* وروستاړي سره لیکل کېږي؛ د بیلګې په ډول:



الکایل هلايدونه هم د لومړني (Primary) دویمي (Secondary) او دریمي Tertiary په بنسټ چې هلو جن د کاربن له کوم ډول سره اړیکه لري ، ویشل شوي دي او دا کلمې د هغوی د نومونو په سر کې ورپاتېږي:




مثال :



د الکایل هلايدونو نوم اينبنوډنه د ايوپيک IUPAC په سيستم داسې ترسره کيږي چې دکاربنې لوږد زنځير د اصلي زنځير په توگه منل کيږي ،دوه گونې يا درې گونې اړيکې د شتون په صورت کې ، په اصلي زنځير کې بايد دا اړيکې شتون ولري .

نمبر وهل د هايډروکاربنونو دزنځير له هغه سر څخه پيل کيږي چې د هلو جن معاوضه همدې سر ته نژدې وي . د يادونې وړده چې د کاربنې بنسټيز زنځير انشعاب هم په دې مرکبونو کې په پام کې نيول کيږي او د پقيو او د هلايدونو وظيفه يې گروپونو نوم داسې ليکل کيږي چې د معاوضې د انگليسي الفبا د نوم د لومړي تورو ترتيب بايد په پام کې ونيول شي ؛ د بيلگې په ډول :




څرگندونه : که چېرې د عين هلو جنونو تعداد د يوې معاوضې څخه ډير وي ، د هغوی د رقمونو شمير په ډاى ، تراى ، تټرا او نورو وروستارو په واسطه ټاکل کيږي .

که چېرې ترکيب شوي هلو جنونو په مرکب کې مختلف هلو جنونه وي ، د هغوی نومونه د انگريزي الفبا د تورو وړاندي والي په ترتيب د هغوی دمرکب په نوم اينبنوډنه کې ليکل کيږي ؛ د بيلگې په ډول $\text{Br} \quad \text{Cl} \quad \text{CH}_3$ $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3$ ، $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ $\text{1-bromo 3-chloro 4-methylpentane}$ $\text{2,3-dichloro 4-methylhexane}$

مشق او تمرين وکړئ

1- د لاندې الکایل هلايدونو نوم اينبنوډنه په راډيکالي او د ايوپيک پر بنسټ ترسره کړئ :




2- د لاندې مرکبونو د جوړښت فورمولونه وليکئ :

الف - 2-chloro 3,3-dimethylhexane
ب - 1,1-dibromo 4-iso propylcyclohexane

7- 1- 2: د الکایل هلايدونو لاس ته راوړنه


1- د الکانونو د نيغ هلو جنشن له لارې کيداى شي چې الکایل کلورايد او الکایل برومايدونه لاس ته راوړل شي ، دا تعاملونه د Chlorination او Bromination په نوم يا ډيري چې په راډيکالي بڼه ترسره کيږي ، صنعتي اهميت يې خو را ډير دى چې له هغه څخه د الکایل هلايدونو بيلابيل مرکبونه جوړيږي او د تقطير په واسطه يوله بل څخه جلا کيږي. دالکانونو chlorination په چټکۍ سره ترسره او لازمه تودوخه يې 300°C ده :




په لابرانوارونو کې الکایل هلايدونه په لاندي ډول لاس ته راوړل کيږي:

2 - الکولونه له هايډروجن هلايدونو سره تعامل کوي، په پايله کې الکایل هلايدونه او اوبه لاس ته راځي، په

دې ميتود کې د هايډروجن هلايد ونوچ گاز له الکولونو څخه تېروي:



مثال:




3 - د هايډروجن هلايدونو اود الکينونو يا الکينونو د جمعي تعامل په پايله کې هم الکایل هلايد لاس ته راځي:


د هايډروجن هلايدونو تعامل د الکينونو له اوردو زنجيرونو سره له مارکوف نیکوف له قاعدو سره سم ترسره کيږي ، داسې چې په الکينونو کې هايډروجن په هغه دوه گوني اړکي لرونکي کاربن باندې نښلي چې د هايډروجن لومړني انومونه په کې زيات وي .




4 - د هلو جنونو اود الکينونو يا الکينونو د جمعي تعاملونو په پايله کې الکایل هلايدونه لاس ته راځي:




مثال:



د فلورين ډير مرکبه د تعويضي تعاملونو په پايله کې (د الکایل هلايدونو د کلورين تعويضي) د کلورين د فلورين د څير مرکبه د تعويضي تعاملونو په پايله کې (د الکيل هلايدونو د کلورين تعويضي) د کلورين د







5- د ایترونو او هایدروجن هالایدونو د تعامل په پایله کې هم الکایل هالایدونه لاس ته راځي :



بیلگه:



مشق او تمرین وکړئ




7-1-3 : د الکایل هالایدونو فزیکي خواص

هغه الکایل هالایدونه چې د هغوی مالیکولي کتنه لویه ده ، د هغو الکایل هالایدونو پرتله چې د کاربن د اتومونو یوشان تعداد لري ، د ایشیدو درجه یې لوړه ده ، په دې بنسټ د الکایل هالایدونو د ایشیدو ټکی له فلورین څخه د ایوین لوري ته په ترتیب سره لوړېږي ؛ دیلګې په ډول : د میتیل کلراید د ایشیدو ټکی $24^\circ C$ ، میتیل بروماید $50^\circ C$ او میتیل ایرایډ $43^\circ C$ دي ، سره له دې چې الکایل هالایدونه قطبي مرکبونه دي ؛ خو له دې سره هم په اوبو کې نه حلېږي ، ځکه هایدروجنې اړیکه نه شي جوړولای ، د امرکېونه په عضوي محلولونو ؛ لکه: هایدروکاربنونو ، الکلونو او ایترونو کې حلېږي .

د هایدروکاربنونو زیات هلوچنې مشتقات یې رنگه اویا نږدېر ښکاري او ځانګړی بوی لري .
د الکانونو د ایریښ ، برومین او پیرلي کلورین مشتقات لوړ کثافت لري چې له اوبو څخه هم لوړ دي .

7-1-4 : د الکایل هالایدونو کیمیاوي خواص

د هلوچنونو اتومونه د هایدروکاربنونو په مشتاتو کې اود هغوی له ډلې څخه په الکایل هلوچنیزونونو کې د کاربن د اتومونو په نسبت الکترونیګایټف دي او د کاربن - هلوجن اړیکه قطبي ده :



د هستې خوښوونکي (Nucleophile) تعامل کوونکي په هالایدونو کې د هلوچنونو مشتق د یرغل لاندې نسبي او د کاربن له هغه نوم سره چې د الکتروني وریځې کثافت یې لوړ دی ، اړیکه جوړوي او له مالیکول څخه هلوچن یې ځایه کوي چې په پایله کې د هلوچن اټوم په نوکلیروفیلېک بڼه باندې تعویض کېږي ، دا ډول تعاملونه

د نوکلئوفیلیک تعویضي تعاملونو (Nucleophilic Substitution) په نوم یا ډیرې او په S_N ښودل کېږي .


نوکلئوفيلي تعويضي تعاملونه کېدای شي چې په دوو میخانیکیتونو ترسره شي چې د S_N2 (Bimolecular Nucleophilic Substitution) او S_N1 (unimolecular Nucleophilic Substitution) تعويضي تعاملونو په نوم یا ډیرې،

عدونه د تعامل د مالیکولونو د هغو ذرو شمیر ښیي چې په تعامل کې د تعامل عمومي چټکتیا په پړاونو کې برخه اخلي. د Bimolecular تعامل عمومي ښه، په لاندې ډول ښودل کېږي:




په دې پړاوې تعامل کې د واړه تعامل کوونکي مواد د تعامل په چټکتیا کې برخه اخلي او که چیرې د دوی غلظت یوېل سره تړدې وي، تعامل د S_N2 په ښه ښودل کېږي او د تعامل کوونکو دواړو موادو له غلظت سره متناسب دي.

د الکایل هالایډونو بای مالیکولي هایدرولیز یو پړاوې تعامل دی، دا تعامل د انتقالی کامپلکس په جوړېدو د الکایل هالایډونو حالت (Transitional Complex) یا انتقالی حالت (Transitional State) سره ترسره کېږي، چې له دې ډول تعامل بیلگه د میتایل بروماید هایدرولیز وړاندې کېدای شي ، دا تعامل د نوکلئوفیلیک تعاملونو له ډولونو څخه دی ؛ ځکه اوه ازاد جوړه الکترونونه لري :



د تعامل میخانیکیت :



د هایدروکساید د ایون تړندیوالي د کاربن اټوم ته یوازې د برومین او د هغه تعویض د برومین په ایون باندې په عین اټوم ته د هایدروکساید د ایون تړندیوالی او د برومین لرې کېدل او د هغه تعویض د برومین په ایون باندې په عین وخت کې ترسره کېږي. په انتقالی کامپلکس کې منفي چارج د نوکلئوفیل گروپونو په منځ کې چې وردننه او جلاکېږي، وشل شوي دي، د S_N2 د تعامل سرته رسیدل د نوکلئوفیل پاتې شونو تړدې کېدل د الکایل هالایډونو مالیکول ته د اهمیت وړ دي، د نارمل زنځیر لرونکي لومړني الکایل هالایډونه د دویمې الکایل هالایډونو په نسبت په اسانۍ سره تعامل کوي. په الکایل هالایډونو کې مشعب کاربنی اسکلیټ د نوکلئوفیل معاوضې د تړدې کېدلو خنډه گرځي . لاندې د الکایل هالایډونو سلسله چې د S_N2 تعویضي تعاملونو چټکتیا په هغوی کې ټیټېږي، وگورئ:




مونو مالیکولي تعویضي تعامل په دوو پړاونو کې ترسره کېږي چې په لاندې ډول دی :


لومړی پړاو یې د تعامل کوونکو موادو ایونایزیشن او د کرب کټیون جوړېدل دي:



دویم پړاو یې د کرب کټیون اغیزه په نوکلئوفیل پاتې شونې باندې تشکیلوي:




د تعامل چټکتیا د تعامل کورونکو موادو په غلظت پورې اړه لري او S_N1 باندې ښودل کېږي، تعویضي تعامل د S_N1 په ښه قطبي محلولونو کې په ښه توګه ترسره کېږي او په قلوې محیط کې یې ترسره کېدل لا ډیر امکان لري. د تعامل دغه پړاو یې په دریم بیوتایل کلوراید کې دیلګي په توګه په لاندې ډول مطالعه کوو:



په دریم پړاو کې د کرب کټیون او هایدروکساید د ایون ترمنځ تعامل ترسره کېږي:


د عمومي قانون په پام کې نیولو سره، د څو پړاوې تعاملونو چټکتیا د هغوی، هغه پړاونه ټاکي چې ورو، ورو ترسره کېږي؛ دیلګي په ډول: په پورتنۍ تعامل کې د تعامل د چټکتیا لومړی پړاو یې ټاکي، هر څومره چې د الکایل پاتې شوني د کرب کټیون اتوم باندې ډیر شي، په هماغه اندازه کټیون ټینګېږي او تعامل د S_N1 په میخانیکیت ترسره کېږي. په لاندې سلسله کې د S_N1 او S_N2 تعاملونو د چټکتیا د بدلون لوري ښودل شوی دی:




۱- د الکایل هالایډونو تعامل له اونیاسره: د دې تعامل محصول لومړني امینونه او هایدروجن هالایډونه دي:

$$R-X + \text{NH}_3 \longrightarrow R-NH_2 + \text{HX}$$


مثال:




۲- له عضوي مالګو سره الکایل هالایډونو تعامل: که چېرې الکایل هالایډونه له عضوي مالګو سره تعامل وکړی، ایسترونه جوړوي:



3- د الکایل هالایډونو دې هایدروهلوجینیشن (*Dehydrohalogenation*)







مثال:



4- د الکایل هلايدونو ارجاعي (Reduction) تعاملونه:




مثال:



مشقي او تمرين وکړئ:

لاندي تعاملونه بشپړ کړئ



۷- ۱- ۵: مهم الکایل هلايدونه:

ميټايل کلورايډ (CH_3Cl) ميټايل کلورايډ د تودوخې په 23.7°C کې په ايشيدو راځي او هغه په 400°C تودوخې کې د ميټان

د کلورينشين تعامل په واسطه په لاس راوړي، همدارنگه د مرکب د ميټايل الکول او هيلډروجن کلورايډ له تعامل څخه د لوړ فشار په بهير

کې هم لاس ته راوړي.

ميټايل کلورايډ په سروونکو د ستگاو کې د سروونکو دعامل په توگه هم په کاروړي.

کلوروفارم (CHCl_3)


کلوروفارم يا تري کلورو ميټان يوه بې رنگه مایع ده او ځانگړې خوږ بوی لري. د مرکب د تودوخې په 62°C کې په ايشيدو راځي، د هغه کثافت 1.48g/ml دی.

که چېرې کلوروفارم هايډروکسيز شي، فارميک اسيد لاس ته راځي چې د کلوروفارم نوم هم له همدې ځايه څخه اخيستل شوی دی. کلوروفارم د عضوي مرکبونو ښه حلوونکی دی، د مرکب غښتلی انستينزیک خاصيت لري چې په 1848M کال کې په جراحي عملياتو کې د عمومي بې هوښۍ په توگه په کار وړل کېده؛ په اوسني عصر کې په دې برخه کې چې نورې ناروغي بېلاکوي، نو لږ په کار وړل کېږي. کلوروفارم په ازاده هو اکسيدي کېږي چې د هغه د اکسيډيشن يو محصول هم فوسجين دی، فوسجين يوه زهري ماده ده. د فوسجين د منځ ته راتلو د مخنيوي لپاره له کلوروفارم سره 1% الکول گډ اورناتوي.

په صنعت کې کلوروفارم د کلسيم هليو کلوريت او ايتايل الکول د تعامل په پايله کې لاس ته راوړي.

کاربن تتراکلورايډ CCl_4

کاربن تتراکلورايډ يا تتراکلورو ميټان بې رنگه مایع ده، د ايشيدو درجه يې 76.5°C او د هغه کثافت 1.59g/ml دی. د عضوي مرکبونو ښه حلوونکی دی، کاربن تتراکلورايډ نه سوړي او د اور ضد دستگه کې د اور وژنې لپاره په لابراتوارونو او گډامونو کې کارول کېږي، د دې دستگاه د کارولو په وخت کې فوسجين هم توليدېږي چې د دې گاز شتون په تړلو ځايونو کې د کاربن-تتراکلورايډ کارول خطرناک گرځي دی. کاربن تتراکلورايډ د جامو په پاکولو او په بېلابېلو سنتيزونو کې په کار وړل کېږي.





داووم څپرکی لنډيز

- الکایل هلايدونه د هايډروکاربنونو هلو جني مشتقات دي چې هلو جنون په واسطه د هايډروکاربنونو يو او يا څو د هايډروجن اتومونه د تعويض له امله لاس ته راځي.
- د الکایل هلايدونو عمومي فورمول $C_n H_{2n+1} X$ دی چې په دې فورمول کې کيدای شي I, Br, Cl, F وي.
- الکایل هلايدونه هم د لومړني (Primary) دويمې (Secondary) او دريمې (Tertiary) بړ دې بنسټ چې هلو جن د کاربن له کوم ټول اتومونو سره اړيکه لري، وېشل شوي دي او داکلې د هغوی د نومونو په سر کې ورزياتيږي.
- د الکانونو د نيغ هلو جنش له لارې کيدای شي چې الکایل کلورايډ او الکایل برومايدونه لاس ته راوړل شي، دا تعاملونه Chlorinations و Bromination په نوم يا ډيري او په راډيکالي بڼه ترسره کېږي، صنعتي اهميت يې خو را ډير دی چې له هغوی څخه د الکایل هلايدونو بيلابيل مرکونه جوړېږي او د تقطير په واسطه يوله بل څخه جلا کېږي.
- هغه الکایل هلايدونه چې د هغوی ماليکولي کتنه لويه ده، د هغو الکایل هلايدونو پرتله چې د کاربن د اتومونو يرشان تعداد لري، د ايشيلو درجه يې لوړه ده.
- سره له دې چې الکایل هلايدونه قطبي مرکونه دي؛ خو له دې سره هم په اوبو کې نه حلېږي، ځکه هايډروجنې اړيکه نه شي جوړولی.
- د هلو جنونو اتومونه د هايډروکاربنونو په مستقلاتو کې او د هغوی له ډلې څخه الکایل هلو جنيدونو کې د کاربن د اتومونه نسبت الکترونيگيټيټي دي او د کاربن - هلو جن اړيکه قطبي ده:



- د هستې خونډونکي تعامل کونکي په هلايدونو کې د هلو جنونو مشتق ډيرغل لاندې نيسي او د کاربن له هغه اتوم سره چې الکتروني ورځي کثافت يې لږ دی، اړيکه جوړوي چې له ماليکول څخه يې هلو جن يې ځايه کوي او په پايله کې د هلو جن اتوم په نو کليوفيلک پاتې شوني باندې تعويض کېږي.

داووم څپرکی پوښتي:

څلور ځوابه پوښتي:

1. الکایل هلايدونه د هايډروکاربنونو ----- مشتقات دي.
 - الف - هايډروجنې، ب - هلو جنې، ج - سلفري، د - اکسيجنې.
2. د الکایل هلايدو عمومي فورمول ----- دی.
 - الف - $C_n H_{2n+1} X$ ، ب - $C_n H_{2n+2}$ ، ج - $C_n H_{2n+1}$ ، د - $C_n H_{2n}$.
3. د مارکوف نیکوف د قاعدې سره سم هايډروجن دوه گونې اړيکې په هغه کاربن باندې نيسي کوم چې د هغه د لومړنيو

هالیدروجنو شمیر ----- دی .

الف - لږ ، ب - یو شان ، ج - ډیر ، د - شتون و نه لري .

4- د $R-O-R^+HX \longrightarrow$ تعامل محصول ----- دی:

الف - R^+OH ، ب - $R-X$ ، ج - الف او ب دواړه ، د - هیڅ یو .

5. د کلورین او ایتلین د تعامل محصول ----- دی :

الف - کلوروایټان ، ب - ډای کلوروایټلین ، ج - ډای کلوروایټان ، د - هیڅ یو

6. CH_3Br - CH_2 - CH_3 نوم عبارت له ----- څخه دي:

الف - *1-bromopropane* ب - *2-bromopropane* ج - *3-bromopropane* د - هیڅ یو

7 - ایتیل بروماید او سوډیم استیټ د تعامل محصول عبارت له ----- څخه دی.

الف - ایتیل استیټ او سوډیم بروماید ، ب - ډای ایتیل ایستر او سوډیم بروماید ، ج - ایتیل ایستر د - الف او ب سم دي .

8. د الکانونو هلو جني مشتقات په کوم نوم یادېږي؟

الف ه اسایلونه ، ب - هلو جنیدونه ، ج - الکیل هالایدونه ، د - اریل هالایدونه .

9. د تری کلورو ایتلین فورمول عبارت له ----- دی.

الف - $CHCl = CHCl = CCl_2$ ب - $CHCl = CCl_2$ ج - $CH_3 - CCl_3$ د - هیڅ یو

10 - د کلورو فارم د ----- محصول یوه زهري ماده فوسجین ده .

الف - ریکشن ، ب - اکسیدیشن ، ج - جمعي تعامل ، د - تجربدي تعامل .


تشریحي پوښتي

1. دلاندې مرکبو نومونه د ایوپیک پر بنسټ ولیکئ:



2 - 1-chloro propane او $NaOH$ د تعوضي تعامل معادله ولیکئ :

3 - د دلاندې تعوضي تعاملونو معادلې بشپړې کړئ:



4 - 1-chloropropane او NaOH د تعريضي تعامل محصول به کومه ماده وي؟

د حل طريقه: دواړه تعامل کړونکي مادې وليکئ، او په هغوی کې نوکلوفيل مواد (د بيلگې په ډول: OH^-) او پاتې شوي گروپونه؛ (د بيلگې په ډول: Cl^-) و ټاکئ. د Cl^- گروپ د OH^- د گروپ په واسطه تعويض کړئ او بشپړه معادله ېې وليکئ.

5. Chloropropane او $1 - \text{Chloropropane}$ سره د $2 S_N$ تعريضي تعامل ترسره

کړی دی، ستاسې په نظر دکومو نوموړو مرکبونو $2 S_N$ تعامل به سريع وي؟

الف - Bromobenzene يا $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br})$ benzylbromide يا CH_3Cl يا $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$

ج - $\text{CHBr} = \text{CHCH}_2\text{Br}$ يا $\text{CH}_3\text{CH} = \text{CHCH}_2\text{Br}$

6 - له لاندي جوړوالکيال هلايدونو څخه به دکومو د $2 S_N$ تعريضي تعامل له OH^- سره سريع وي؟


7 - د $3 - \text{methylol tan}$ او HBr له تعريضي تعامل څخه به کوم محصول د $1 S_N$ د تعريضي تعامل د

ميخانيک په بنسټ تر لاسه شي؟ د محصولو او د تعامل کړونکو مواد فورمولونه ېې وليکئ.

8. خرنګه کولاي شئ چې د لاندي موادو د نوکلوفيلي تعريضي تعاملونو پر بنسټ تر لاسه کړئ؟

$\text{OH} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (a), $\text{CN} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (b)

9. لاندي معادلې بشپړې کړئ.



10. د لاندي مرکبونو مشرح ماليکولي فورمولونه وليکئ؟

الف - 2,3-dichloro-4methyl hexane

ب - 4-bromo-2-methyl hexane

ج - 3-iodo-2,2,4,4-tetramethyl pentane




الکولونه او ایترونه




ډیر عضوي مرکبونه ځانګړي ډلې لري چې د وظیفه یي ګروپونو (Functional group) په نوم یادېږي. دا ګروپونه له هایډروکاربنونو سره تعریفې تعاملونه ترسره کوي. او په پایله کې د عضوي مرکبونو ځانګړي توګې تشکيلوي چې د هغوی له ډلې څخه د هایډروکسيل ګروپ ($-OH$) او ایترو ګروپ ($-O$) دي. د هایډروکسيل او ایترو ګروپونه د اشتراکي اړیکې په واسطه د هایډروکاربنونو له کاربن سره نښتی دي. په دې څپرکي کې د الکول او ایترونو د خواصو، جوړښت او د استعمال ځایونو په هکله به معلومات تر لاسه کړئ او ددې څپرکي په مطالعه به پوره شې چې الکولونه او ایترونه کوم ډول مرکبونه دي او د کوم ډول خواصو او جوړښتونو لرونکي دي؟ په صنعت کې په کومو برخو کې په کار وړل کېږي او څرنگه کېدای شي؟ هغوی په لاس راوړل شي؟

8 - 1 : الکولونه (Alcohols)

هغه عضوي مرکونه چې په خپل مالیکولي ترکیب کې د OH وظیفه یي گروپ ولري، د الکولو په نوم یادېږي. الکول عربي کلمه ده چې معنایې د شرابو جوهر دي، د الکولونو عمومي فورمول R-OH دي چې R کېدای شي د الکایل پاتېشونی د نارمل او یا منشعب زنجیر لرونکې، الکینیل، الکینیل (د دوه گونې او یا درې گونې اړیکې لرونکې) د اورماتیک کړۍ او داسې نور دي؛ د بیلگې په ډول:




Cyclo hexanol



Benzyl alcohol




Ethylenechloro hydrin



8 - 1 - 1 : د الکولونو نوم ایښودنه

الکولونه د کاربن د اتومونو د شمیر پر بنسټ چې د کاربنول گروپ یې (C^{OH}) سره اړیکه لري یعنې د هغه کاربن سره چې د هایډروکسیل گروپ په کې نښتی دی، په درې ډلو ویشل شوي دي:

لومړنیو الکولونو (primary alcohol) د ($OH -$ چې له لومړني کاربن سره اړیکه لري)، دویم الکول لومړنیو (secondary alcohol) د هایډروکسیل گروپ ($OH -$) دویم کاربن سره اړه یکه لري (او دریم الکول Tertiary alcohol) چې د هایډروکسیل ($OH -$) گروپ دریم کاربن سره اړه یکه لري) دي چې د هغوی عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي:



په پورتنیو فورمولونو کې R بیلابیلې عضوي پاتې شوني ښيي؛ یعنې کېدای شي الفینیک ($CH_3 -$) اویا اروماتیک ($C_6H_5 -$) او نور وي. ایټایل الکول (ایټانول) او پترایل الکول د لومړنیو الکولو ډول دي؛ خو ایزوپروپیل الکول د دویمي الکولو له ډولونو څخه دي:




دويمې الکول

لومړني الکول


د الکولو عمومي نوم اېښودنه په دوو سیستمو ترسره کېږي چې يو يې د معمولي يا راډيکالي سیستم (Common names) نوم اېښودنه ده، ساده الکولونه چې پخوا پېژندل شوي دي، په دې طريقه يې نوم اېښودنه کېږي؛ د بېلګې په ډول:



ethyl alcohol




OH



isopropyl alcohol

iso butyl alcohol




methyl alcohol



propyl alcohol


p - nitrobenzyl alcohol

دوېلو ور ده چې دا ډول نوم اېښودنه لږه کارول کېږي او په ښاخ لرونکو او لوړدو زخځيرونو کې د بېلې کېدو وړ نه ده؛ د بېلګې په توګه:




2,2,3,3 - trimethyl pentanol (3)

په همدې ترتيب د الکولونو په نوم اېښودنه کې د الکولونو ډولونه (لومړني، دويمې دريمې) هم ټاکل کېږي؛ د بېلګې په ډول: ايزوپروپانل الکول يو دويمې الکول دی او ايزوپنتانل الکول يو لومړنی الکول دی؛ نو ددوی نوم اېښودنه په لاندې ډول هم ترسره کېږي:



OH



pr ethyl alcohol

isopropyl alcohol

primethylpropyl alcohol




مشتق او تمرين وکړئ

يو ډول الکول چې جمعې فورمول يې $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$ دی، په پام کې ونيسئ، ټاله بېلابېل جوړښتي فورمولونه د هغه لپاره وليکئ چې په هغوی کې لومړني، دويمې او دريمې الکول وټاکل شي.

ډير پوه شئ: ځينې وختونه د الکولونو نوم اېښودنه دهغوي د Carbinol ($-\text{C}-\text{OH}$) د گروپ پر بنسټ ترسره کېږي چې د کاربينول سیستم ورته وايي. په دې طريقه کې الکولونه داسې په پام کې نيول کېږي چې له کاربينول څخه په لاس راغلي دي؛ نو $\text{CH}_3 - \text{OH}$ ته هم کاربينول وايي. دهغې نورې بېلګې عبارت دي له:






د الکولونو سیستماتیک نوم ایښودنه د (IUPAC) پرنسپټ داسې ترسره کېږي چې د اړوند هایدروکاربونونو د نوم اخیرنی *e* توری (*ol*) په وروستاوي تعویض کېږي او په پایله کې د اړوند الکول نوم لاس ته راځي. له دې کبله چې په نوم ایښودنې کې تېروتنې لري شي، نو د هایدروکاربونونو د کاربنونو په انومونه شمېر وهل کېږي او شمېر وهل د زخیر له هغه وی شخصه پیل کېږي چې د کاربنول د گروپ کاربن کوچنی شمېر ځانته غوره کوي؛ د بېلگې په ډول:



مثال: دلاندې الکولونو نوم ایښودنه د ایوپیک پرنسپټ ترسره کړو:



الکولونه چې د OH -دوگروپو لرونکي وي، معمولا د گلايکولونو (Glycols) په نوم يا دوي، دا الکولونه په ډراو نومونو (معمولي او ایوپیک) نوم ایښودنه کېږي.



18-2: د الكولونو فزيكي خواص

قطبي ده او د دي مرکبونو خواص ټاکي.

$$(8-1)$$


شمير او ماليڪولي کٽي لہ زياتوالي سرہ دايشيدو ٽڪي هم لوپيري.

$$(1 - 8\epsilon)$$

نوم	فورمول	د ایشیدو درجه	په اوبو کې حل کیل 10g په 20°C کې
Methanol	CH_3OH	65	په هر نسبت منحل
ethanol	CH_3CH_2OH	78.5	په هر نسبت منحل
1-propanol	$CH_3CH_2CH_2OH$	97	په هر نسبت منحل
1-butanol	$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	117.7	7.9
1-pentanol	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$	137.9	2.7
1-hexanol	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$	155.8	0.59

د وظیفه یی گروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدونکی هم لوړېږي؛ د بیلګې په ډول: ایتلین ګلايکول په 19°C کې په ایشیدو راځي، د دې مرکب د مالیکولونو ترمنځ هایدروجنې اړیکې ډیرې دي؛ نو له همدې کبله د هغوی حل کېدل په اوبو کې هم ډیر دي. ایتلین ګلايکول څخه په موټرو کې د کنگل کېدو دضد مادي په توګه کار اخیستل کېږي.


د الکولونو د ایشیدو ټکی د هغوی دایزولوګ الکانونو په پرتله په لاندې ګراف کې ښودل شوي دي.



(8-2) شکل د الکولونو دایزولوګ الکانونو د ایشیدونکو د پرتلې ګراف


8-1-3: د الکولونو کیمیايي خواص او فعالیتونه

الکولونه دوه خاصیتونه (Amphoric) مرکبونه دي چې هم تیزابي خاصیت او هم القلي خاصیت ښيي، د ټوټه کېدو ثابت یې خو را ډیر زیات کوچنی دی:



د القلي فلزونو سره د الکولونو تعامل:

الکولونه له القلي فلزونو سره تعامل کوي، الکولیتونه جوړوي؛ د بیلګې په ډول: ایتانول له سوډیم سره تعامل کوي چې د سوډیم ایتانولیت ($\text{C}_2\text{H}_5 - \text{ONa}$) مرکب جوړوي:





(8 - 3) شکل له فلزی سودیم سره د ایتایل الکولو تعامل

سودیم الکولیتونه په اولین محلول کې قوي القلي خاصیت وړښتي چې د خپل جوړه تیزابونو ضعیفوالی روښانه کوي.


د الکولونو کیمیايي فعالیت د القلیو فلزونو سره په تعامل کې د هغوی د کارنې زنجیره په اوږدوالي سره ټیټېږي چې د هغوی د فعالیت ټیټوالی په لاندې سلسله کې ښودل شوی دی:



الکولونه کولای شي چې د القلیو خاصیت هم له ځان څخه ښکاره کړي؛ ځکه د OH^- د گروپ د اکسیجن د اټوم ازاد جوړه الکترولونه د نورو تیزابونو د پروتونونو د جذب توان لري.

$$\text{C}_2\text{H}_5-\text{OH} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5-\text{OH}_2^+ + \text{H}_2\text{O}$$


الکولونه یې د تیزابي کُنستونو $\text{C}_2\text{H}_5-\text{OH}_2^+$ د ایتایل الکول مزوج تیزاب دي او د اکسونیم ایون یوه بیلگه ده، عمومي فورمول یې $\text{R}-\text{OH}_2^+$ دی، $\text{R}-\text{OH}_2^+$ جوړېدل د پرله پسې تعاملونو لومړنی پړاو دی چې الکولونه یې د تیزابي کُنستونو په شتون کې ترسره کوي؛ د بیلگې په ډول: له الکولو څخه د اونیو ایستل په تیزابي محیط کې (H_2SO_4) د اکسونیم (oxonium) د ایون په واسطه ترسره کېږي:



په دې ترتیب د ایتایل الکولو Dehydration له هایدروکاربونو سره د نباتي انرژۍ د راکړې او ورکړې امکانات برابرې؛ ځکه دکرنی محصولاتو؛ لکه غلې، گني، خرما، انگور او نورو د تخمر څخه چې الکولو نه جوړېږي او د الکولو د وی هایدریشن (Dehydration) څخه ایتیلین او بیا پولي ایتیلین لاس ته راځي. الکولونه د هایدرو هالیدونو او هالیدونو سره تعامل کوي چې الکال هالیدونه جوړېږي:



اکسیدي کورونکي مواد؛ د بیلګې په ډول: $K_2Cr_2O_7$ له الکولونو سره تعامل کوي چې د الکولونو د اکسیدیشن د عملي په پایله کې الډیهایډونه او تیزابونه جوړېږي:



ایټال الکول په سرواندي لوبښي کې له څه مودې وروسته د هواله اکسیجن سره تعامل کوي، الډیهایډونه جوړوي او عطري بوی لري چې د الکول له بوی سره توپیر لري او د قوي اکسیدیشن په پایله کې په عضوي تیزاب بدلېږي چې تیز بوی لري. د لومړني الکولونو د اکسیدیشن عملیه د الډیهایډونو او تیزابونو د جوړښت په پای کې ترسره کېږي:




که چېرې دوهي الکول اکسیدیشن شي، د کیتونونه حاصلېږي:





د ایستر د جوړولو تعامل (Esterification)

د الکول او تیزابونو تعامل د ایستریفیکشن په نوم یادېږي، دا تعامل د تیزابونو په شتون کې د کُنسټ په توګه ترسره کېږي چې د هغوی په پایله کې ایستر او اوبه جوړېږي:



استایل کلورایډونه هم له اوبو سره تعامل کوي چې دهغوی د تعامل محصول هم ایسترونه دي:



8-1-4: د الکولو لاس ته راوړنه

د الکولو د لاس ته راوړلو اقتصادي لاره عبارت له الکینونو هایدريشن او قندونو تخمر دي:



د الکولو لاسته راوړلو په موخه د تخمر له لارې کوم چې لومړنۍ ماده يې نشايسته وي، د اميليز (Amylase) انزايم څخه چې د اوريشو په اوبو کې شتون لري (malt)، کارول کېږي، د انزايم نشايسته په ساده قندونو (گلوکوز) تبديلي. د لبلبو يا گينو د قندونو په تخمر کې چې سکروز او مالتوز لرونکي وي، د انورټيز (Inertase) انزايم چې په خميرې (yeast) کې شتون لري، کارول کېږي، انزايم د چغندرو، گينو او نورو ميوو څو بڼا په گلوکوز او فرکتوز تبديلي. د زایمیز (zymase) انزايم چې خميرې کې شته دي، گلوکوز په ايتانول او CO_2 بدلي.



له اوبو څخه د ايتانول جلاکول دېر له پسې تقطير په واسطه ترسره کېږي؛ داسې چې ايتال الکول په $C 78^\circ$ او اوبه په $C 100^\circ$ کې په ایشيدو راځي.

د الکولو د لاس ته راوړني صنعتي طريقه

1- له پتروليم څخه هم کېدای شي، الکول لاسته راوړل شي؛ د بېلگې په ډول: په امريکا کې په يو کال کې 7.10^8 ايتانول او 10^8 ايزوپروپانل الکول له پتروليم څخه تر لاسه کېږي چې دا ډول الکولونه د الکولي مشروباتو لپاره نه کارول کېږي.


ميتانول يې په 1920م کال کې له وچو لرگيو څخه په لاس راوړل شوي دي، اوس په امريکا کې لس (10) ميليونه پونډ ميتانول د CO او H_2 له تعامل څخه (له CO د ارجاع څخه) لاس ته راوړي:



$$CO + 2H_2 \xrightarrow[400^\circ C]{ZnO, Cr_2O_3} CH_3OH$$

له پورتنیو لاس ته راوړل شوو کميتونو الکولونو څخه نيمایي يې د فارم الیهايد د لاس ته راوړلو په موخه د پلاستيک د توليد لپاره په کار وړل کېږي.



2- د گرینارډ ښودونکي ترکيبي تعامل:

الف: د گرینارډ د ښودونکي اود الیهايدونو د تعامل په پايله کې الکولونه لاس ته راځي:










ب - له کیتونونو سره د ګرینارډ بنودونکي تعامل :



3 - د الډهايدونو، کيتونونو او عضوي تيزابونو له ارجاع کولو څخه هم الکولونه لاس ته راځي. د الډهايدونو، کيتونونو او عضوي تيزابونو ارجاع کيدل د ارجاع دعامل په شتون کې ترسره کېږي چې د الډهايدونو او عضوي تيزابونو له ارجاع څخه لومړي الکول او د کيتونونو له ارجاع څخه دويمې الکولونه حاصلېږي. د الډهايدونو، کيتونونو او عضوي تيزابونو ارجاع د هيلډروجن په واسطه د پلاتين (Pt) په شتون کې ترسره او الکولونه لاس ته راځي:






ډیر پوه شی

ایسترونه هم ارجاع کیري چي په پایله کي یې دوه مالیکوله الکول حاصلیري ؛ د بیلگي په ډول : ډای میتیل ایستر ارجاع شوي او په پایله کي یو مالیکول میتیل الکول او یو مالیکول ایتیل الکول حاصلیري :




4- د ایترونو او ایسترونو له هایډرولیز څخه د الکولو لاس ته راوړنه


د متناظرو ایترونو د یو مالیکول هایډرولیز څخه د یو ډول الکولونو دوه مالیکوله او د غیر متناظرو ایترونو له ارجاع څخه د بیلا بیلو الکولونو دوه مالیکولونه لاس ته راځي :



دیوه مالیکول ایستر له هایډرولیز څخه یو مالیکول الکول او یو مالیکول عضوي تیزاب حاصلیري:



5- د الکایل هالیدونو د هایډرولیز په پایله کي الکولونه او هایډروجن هالیدونه لاس ته راځي :



8- 5 : میتانول یا میتایل الکول (CH_3OH)

میتایل الکول یې رنگه مایع ده، بڼه اور اخلي، ځانگړی بوی لري چې د ایټایل الکولو خوند لري او زهري دی، لږ خوړل یې د روڼوالي لامل او زیات خوړل یې د مرگ لامل گرځي، دهغه د بړاسونو پرله پسې تنفس او د بدن له پوستکي سره تماس یې د انسانانو د وژني لامل کیږي؛ نو باید دهغه له څښو څخه ډډه وشي. میتانول د تودوخې په $97^{\circ}C$ کې کڼگل کیږي چې په موټرونو کې د یخ د ضد مادي په توگه کارول کیږي، میتایل الکول د تودوخې په $64.7^{\circ}C$ کې په ایشیدو راځي، په اوبو کې په هر نسبت حلېږي، د عضوي موادو او وازدي بڼه حلونکي دي، د فارم الیهاید د تولید لپاره په ډیره کچه په کارول کېږي چې له فارم الیهاید څخه د پلاستیکونو، رنگونو او محلولونو په صنایعو کې په مصرف رسېږي.

د میتانول کیمیايي خواص :

د میتایل الکولو تیزابي خواص د نورو یو قیمتو الکولونو په نسبت ډیر دی:



میتایل الکول په اوبو رنگي لمبي سوځي، په اساني سره اکسیدیشن کیږي چې په لومړي پړاو کې فارم الیهاید، په دویم پړاو کې د مینو تیزاب، په دریم پړاو کې CO_2 او په جوړېږي :



د میتایل الکول لاسته راوړنه :

میتانول ډیر ساده الکول دي چې په لوړه تودوخه او د هوا په نه شتون کې د لرگيو له تقطیر څخه په لاس راوړل کیږي؛ نو له دې کبله د لرگيو د الکولو په نوم هم یې دېږي، لرگي یا سلولوز په ساده مرکبونو لکه استیون، د سرکې تیزاب او په میتایل الکولو تبدیلوي. تر 1925م کال پورې له همدې طریقې څخه گټه اخېستل کیده؛ مگر یوه بله ډیره ارزانه طریقه د جرمنیانو په واسطه په 1920م کال کې منځته راغلې ده چې نن ورځ دا طریقه کارول کیږي، دا طریقه عبارت له CO او H_2 تعامل څخه د ډیر فشار، تودوخې او کلسټونو په شتون کې ترسره کیږي:



8- 1- 6 : ایټانول یا ایټایل الکول

خالص ایټانول یې رنگه ماده ده او ځانگړی بوی لري. د ویلي کیدو درجه یې $114^{\circ}C$ ، د ایشیدو درجه یې $78.3^{\circ}C$ او کثافت یې 0.7898 g/mL دی چې په اوبو کې په هر نسبت حلېږي.



(8- 4) شکل د ایټانول مول

ایټانول چې په لابراتوارونو کې د حلونکي په توگه کارول کیږي، 95% الکول او 5% اوبه دي، چې دي مخلوط ته معمولي الکول وايي، په $78^{\circ}C$ کې په ایشیدو راځي.


100% الکول (مطلق الکول) له معمولی الکول څخه د چوڼي په زیاتولو سره چې اوبه یې د $Ca(OH)_2$ په بڼه

ښکته کښېښوي، په لاس راوړي:

$$CaO(s) + H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(s)$$

د خالصو ایتانول (مطلق ایتانول) د تصفېي بله لاره، د 95% ایتانل الکولو او اوبو په مخلوط کې د بنزین ور زیاتول دي، بنزین دوه ډوله پیلا بیل ایزوتوپونه د اوبو او الکول سره جوړوي چې ترڅو ایتانول په $64.9^\circ C$ کې په ایشیدو راشي او له اوبو څخه په بشپړ ډول جلا شي.

ایتانل الکول ښه عضوي محلول دی، نو د ټینچر اېوډین، رنګونو، عطرونو او اړایشي موادو کې د ښه بوري ورکولو لپاره کارول کېږي او په همدې ترتیب د کلونیا، سپرې (Spirit) او څکلکو (څښلو) کې کارول کېږي، د ایتانل الکولو د سوزولو په پایله کې ډیره انرژي تولیدیږي:



(8 - 5) شکل د ایتانل الکولو کارول د تودوخې او انرژي د لاس ته راوړلو په موخه

د ایتانول ښه سوزیدل د دې لامل شوی دی چې د انجنونو په منځ کې د سون د موادو په توګه ترې کار واخیستل شي. ایتانل الکول د یخ د ضد مادې په توګه په کارول کېږي او د هغه محلول د ضد عفوني مادې په بڼه کارول کېږي. دا مرکب د پروټیني ارګانیزمونو د تخریبولو خاصیت لري چې د بکټریاوو، فنجیو، د ځینو ویروسونو او بکټریاوو د سپورونو له منځه وړلو لپاره په کارول کېږي.

کله چې ایتانل الکول وڅښل شي او د انسانانو بدن ته داخل شي، په بدن کې منفي اغیزې رامنځ ته کوي؛ داسې چې دمعز داوبو مالیکولونو جذب او دهغوی ځایونو ته په معز کې بدلون ورکوي چې داعملیه د عصبي سیستم دتغییر لامل ګرځي.



د ایتانول لاس ته راوړنه:

1 – ایتانل الکول په ډیره کچه د بورې له تخمر څخه حاصلیږي. د ایتانل الکولو د لاس ته راوړنې دوه مهمې سرچینې په لاندې ډول دي:

الف – له نشایسته لرونکو نباتاتو څخه؛ د بیلګې په ډول: غنم، جوار، کچالو اوریشو، جودرو او نورو څخه کیدای شي چې ایتانل الکول لاس ته راوړل شي.

ب – له بوره لرونکو نباتاتو څخه؛ لکه چغندر (لببو) ګني او میوو څخه کیدای شي ایتانل الکول لاس ته راوړل شي.

په تیرو لوستونو کې مو د الکولونو د لاس ته راوړنې په هکله په تفصیل سره معلومات تر لاسه کړل، په همدې لارو کیدای شي چې ایتانل الکول هم لاس راوړل شي، دنته د هغه د لاس ته راوړنې دوه کیمیايي معادلې چې د بورې او ګلوکوز د تخمر له امله لاس ته راځي، لیدل کېږي:




(8 - 6) شڪل ۾ يوربي تخمر او ۽ ايتايل الڪول لاس ته راوړل




(8 - 7) شڪل ۾ گلوکوز ۽ تخمر ۽ سنگاه او ۽ ايتايل الڪول لاس ته راوړل

2 - په صنعت کې ايتانول ۽ ايتلين له هايډرشن څخه H_3PO_4 ډ کټسټ او تودوخې په شتون کې لاس ته راوړي، دا طريقه ۽ تخمر په نسبت ډير ارزانه ده 300°C



3 - اسټ الډيهايد ډ نیکل (Ni) ډ کټسټ په شتون کې ارجاع کيږي چې په پايله کې ايتانول حاصلېږي:



4 - که چېرې ايتلين په تيزابي محيط کې هايډرشن شي، ايتايل الڪول لاس ته راځي:




8-1-7: څو قيمته الڪولونه


که چېرې ډ الڪولونو په ماليکولي ترکيب کې ډ هايډروکسيل يو گروپ شتون ولري، دا ډول الڪولونه ډ يو قيمته الڪولونو په نوم يادوي او که چېرې ډ الڪولونو په ماليکولي ترکيب کې ډ هايډروکسيل څو گروپونه شتون ولري، دا ډول الڪولونه ډ څو قيمته الڪولونو په نوم ياديږي.

گلايکول (Glycol):
هغه الکولونه چې د $(-OH)$ د دوو گروپونو لرونکي وي، د گلايکولونو په نوم يادېږي. د هغوی بڼه بيلگه ايتلين گلايکول (CH_2OHCH_2OH) دی.


ايتلين گلايکول: د ايتلين گلايکول ماليکول چې د هغه سيسټماټيک نوم 1,2 - Ethanediol دی، د دوه قيمته الکول له ډلې څخه دی او فورمول يې په لاندې ډول دی:




ايتلين گلايکول پرته له رنگه، بې بوږه او د شربت په شان مایع ده چې په اوبو کې په هر نسبت حل کېدای شي، د کنگل کېدو ښکته درجه $(-15^\circ C)$ لري؛ نو په انټي فریز (د يخ ضد) اوبو په توگه په موټرو وکې په کارورل کېږي، د هغه د ايشيلو درجه $(97^\circ C)$ ده؛ نو په اوبې کې هم د موټرو په اوبو کې ورزېږي. د موټرونو په بړيک کې د هايډرولیک مادي په توگه، په رنگونو، تیلو او د قلم د رنگونو په محلولونو ترکه په کار ورل کېږي. ايتلين گلايکول لومړنی دوه قيمته الکول دی، د هغه له اکسيډيشن څخه اگرایک اسيد لاس ته راځي:



له اوبو سره د ايتلين ډاي کلورايد $(1 - 2 - \text{دای کلورو ایتان})$ د تعامل په پايله کې ايتلين گلايکو لاسته راځي:





ايتلين گلايکول د $(-OH)$ دوه گروپونه په خپل ماليکولي ترکيب کې لري او له هغه څخه د يخ ضد مادي په توگه په گرځنده موټرونو کې گټه اخېستل کېږي او هم د مصنوعي تارونو په لاس ته راوړنې کې له هغه څخه گټه اخېستل کېږي. د گلايکول عمل د يخ د ضد مادي په توگه د هغه ډښو حل کېدلو له کبله په اوبو کې دي او د $-OH$ د دوو گروپونو د شتون له امله هايډروجنې اړيکه يې د اوبو د ماليکولونو سره جوړه کېږي. همدا رنگه له نايټريک اسيد HNO_3 سره تعامل کوي چې د نايټرو گلايکول په نوم چارویدونکي ماده جوړوي:



گلیسرین:

گلیسرین یو درې قيمته الکول دی او د $-OH$ درې گروپونه لري چې د هغه فورمول په لاندې ډول دی:







(8-5) شکل د گلیسرین مودل

د گلیسرین سیستماتیک نوم Propanetriol - 3, 2, 1 دي، دامرکب په عادي شرایطو کې مایع او چسپناک حالت لري چې په اوبو کې په ښه توګه حل کېږي او د اوبو د نرمولو په مادي په توګه په کار وړل کېږي، په 18°C کې کنگل، په 29°C کې په ایشیدو راځي او کثافت یې $1.26 \frac{\text{g}}{\text{mL}}$ دی، له اوبو سره د میتانول او ایتانول په شان مخلوط کېږي، د شربتو په شان مایع ده او د جذب ښه وړتیا لري.

گلیسرین د حیواني وا زدي او نباتي غوړو د هایدرولیز فرعي محصول دي:



د گلیسرین او نایتریک اسید د تعامل په پایله کې (ایسترنفیکشن) د نایټرو گلیسرین په نوم عضوي او غیر عضوي ایستر (گلیسرل ترای نایتریت) حاصلېږي:



نایټرو گلیسرین ډیټر زیات چاودیدونکي او بې ثباته ماده ده چې په 1970م کال د نوبل (Noble) په نوم د نمناکي کیمیا پوه هغه د بورې اړي سره لږ څه با ثباته کړه او له هغې زمانې څخه تر اوسه پورې د ښامیت په نوم په مصرف رسیږي.


نوبل له دې لارې ډیره شتمني په لاس راوړه؛ خو کله چې له هغه څخه د جنگي وسیلې په توګه کار واخیستل شو، د انسانانو د وژلو لامل وګرځیده، نو نوبل خپله ټوله شتمني د نوبل د جایزې په نامه وقف کړه او انسان دوستو پوهانو ته یې له دې شتمنۍ ورکړه ومنله. پورتني تعامل اګزوترمیک دي نو ژر یې سړوي؛ ځکه چې په 45°C کې نایټرو گلیسرین چاودنه ترسره کوي، د ښامیت د گلیسرین او د اړي د بورې له مخلوط څخه لاس ته راوړل کېږي چې یوه فورق العاده چاودیدونکي ماده ده.

گلیسرین د تبناکو د رطوبت د جذب لپاره، د حمام په صابون او بڼیږي د خړبلو په کریم، د ارایش په کریمونو او موادو کې، د پلاستیګ په تولید او برابرولو، د رنگونو اویو، د پرنتر په رنگونو، مصالیح، مرهمونو، انټی فريز اویو او په ډینامیت کې کارول کېږي.



(8-6) شکل الف - ډینامیت ب - د سوډیم سره د گلیسرین تعامل

قطبي حیوانات د هغوی له ډلو څخه قطبي خوک په خپل بدن کې د ساریټول (Sorbitol) او گلیسرول (glycerol) د جوړولو قدرت لري چې د سړي هوا په موده کې د هغوی د بدن د اویو کچه ښکته راځي او د دې مرکبونو غلیظ محلول په ټیټه تودوخه کې نه کنگل کېږي او د تودوخې په 87°C - هم ژوند کولای شي. گلیسرین د الکولو د استحصال په عمومي طریقه کولای شي چې لاس ته راوړئ؛ مګر غیر اقتصادي ده د اقتصادي طریقي یې د وازدې او ښايي غوړیو هایدرولیز او تخمر دي. د سروینه لرونکو حشراتو او قطبي حیوانات په بدن کې د گلیسرین تولید د لامل کېږي ترڅو د هغوی د بدن مایع تر 87°C - پورې کنگل نه شي. ترای نایټرو گلیسرین یا ډینامیت د لاندې تعامل سره سم د چاودیدو لامل ګرځي:



(8-7) شکل قطبي خوک:

8-2: ایترونه (Ethers):


که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اویو د مالیکولونو مشتق دي؛ داسې چې د اویو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شوني تعویض او الکول حاصل شوي دي، نو که چیرې د اویو بل اټوم د هایدروجن هم په عضوي پاتې شوني تعویض شي، ایترا حاصلېږي:



$H-O-H$, CH_3-CH_2-O-H , $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$
water ethanol Diethylether
 د ايترونو عمومي فورمول $R-O-R$ يا $Ar-O-Ar$ دي ، دوى هغه مركونه دي چې د $(C-O-C)$ واحد لری.

8-2-1 : د ايترونو نوم ايښودنه


څرنگه چې د ايترونو وظيفه يې گروپ د اکسيجن اټوم (O -) دي ، په معمولی نوم ايښودنه کې له هغه څخه نوم اخېستل شوی نه دی او داسې نوم ايښودنه کېږي چې لومړی د ايتر د گروپ (O -) پورې تړلي عضوي پاتې شونو نومونه د کوچني والي و او لوي الي پر بنسټ نومول کېږي او د ايتر کلمه په هغوی باندې ورزيږي؛ يعنې د ايتر د وظيفه يې گروپ په بنسټ د ډاي الکايل ايترونو نوم ايښودنه ترسره کېږي ؛ که چېرې معاوضي يو ډول وي ، د ډاي (di) مختاړي د معاوضو په نوم ور زياتېږي ؛ د بيلگې په ډول:



3-Chloro propylether

Di phenylether

ايترونه د ايويک د نوم ايښودنې پر بنسټ د الکا اوکسي (کوچني معاوضي) په نوم يا د وي ، داسې چې الکاڼ کوچني معاوضه د الکا اوکسي په نوم او بيا د الکاڼونو د غټو معاوضونوم کوم چې د لوړد زنجير لرونکي او د ايتري له گروپ سره تړلي دي ، ور زياتېږي ؛ د بيلگې په ډول :



Methoxy methane Ethoxy ethane methoxy ethane



1-Chloro-3-ethoxy propane


Phenoxy benzene

3-Chloro propylether

Diphenylether

مشق او تمرين

لاندی مرکبونه له معمولي او ايويک د طريقې پر بنسټ نوم ايښودنه وکړئ:



8-2-2 : د ايترونو فزيکي خواص

ايترونه لږ په اوبو کې حلېږي ، د ايترونو د ايشيدو ټکي د هغوی د ماليکولونو د لږ قطبيت له کبله د هغو د ايزوميرو

الکولو ایزوولوگو الکانو څخه لږ دی ؛ د بیلګې په ډول :

فورمول او نوم	$CH_3CH_2-O-CH_2CH_3$ Di ethylether	$CH_3(CH_2)_3CH_3$ Pentan	$CH_3(CH_2)_3-OH$ 1- Butanol
د غلیان ټکی	35° C	36° C	117° C
په اوبو کې انحلالیت	7.5 g / 100ml	نه حل کېدونکی	9 g / 100ml

فعالیت:

د لاندې مرکبونو د ایشیدلو او کنگل کیدلو درجې د زیاتوالي او لږ والي پرنسبې ترتیب کړئ او د هغوی جمعي فورمولونه ولیکئ .

1. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$
2. $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$
3. $CH_3-CH_2-O-CH(CH_3)-CH_3$


د ایترونو کیمیايي خواص

د ساده ایترونو کیمیايي فعالیت د الکولونو په نسبت لږ دی ، د کاربن او اکسیجن اړیکه په ایترونو کې ډیره کلکه ده او د هغې پری کیل په ستونزو سره ترسره کېږي .

1 - ساده ایترونه د ضعیفو القاي خواصو په درلودلو سره د اکسیدانتونو او تیزابونو په واسطه پوټه کېږي ، د هغوی ایتري اړیکه پری کېږي ؛ د بیلګې په ډول : د هلو جني تیزابونه د لاندې معادلې سره سم تعامل کوي :



په رښتیا د ایترونو او هایدرو هلو جندونو د تعامل نهایی محصولات د الکایل هلایدو او اوبو څخه عبارت دي :




2 - ایتري اوبو په واسطه په تیزابي محیط کې هایدرولیز او ایتري اړیکه پری کېږي :



3 - ایترونه د اکسیجن (O_2) په شتون کې په اسانۍ په پر اکسیدونو تبدیلېږي ، تولید شوي پر اکسیدونه د فیرس (Fe^{+2}) د آیونونو په واسطه د ګوګړو د غلیظو تیزابونو په شتون کې بیرته تجربه او په عادي ایترو تبدیلېږي :





فعالیت



که چیرې $0.2mol$ دای ایتیل اتر $HBBr$ د غلیظ تیزابي محلول سره په ټاکلي کچه تعامل وکړل شي ، څه مقدار اړونده الکول به له هغوی څخه حاصل شي ؟ $(CH_3-CH_2-OH = 46g/mol)$

د ایترونو لاس ته راوړنه :


د ایترونو د لاس ته راوړنې عمومي طریقه د الکولو د دوو مالیکولونو د دې هایدریشن طریقه ده چې د ګوګرو تیزابو

(د کټلست په توګه) په شتون کې ترسره کېږي:



2- د ویلیم سن طریقه


د دې طریقې په واسطه کیدای شي چې متناظر او غیر متناظر ایترونه لاس ته راوړل شي، د دې طریقې کړنلاره داسې ده چې الکایل هلالیدونه د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل ورکول کېږي او اړونده اتر حاصلېږي:



دای ایتیل اتر :

دای ایتیل اتر (یا په ساده عبارت اتر) بې رنگه مایع ده او د بې هوښه کولو خاصیت لري، اور اخیستونکي او د ځانګړي بوی لرونکي ماده ده، اتر د انسټیرې عمل لري چې د هغه تنفس د جراحي دعمل لاندې ناروغانو د بې هوښۍ لامل کېږي.

دای ایتیل اتر د عضوي موادو ښه محلول دي او عضوي مواد په ځان کې حلوي ، د ورتس تعامل او د ګرینارد ښودونکي په جوړولو کې په کارول کېږي، دای ایتیل اتر په لابراتوار کې د ایتیل الکولو له دې هایدریشن څخه د اوبو جذبونکو توکو په شتون کې لاس ته راوړي.



نوټ : دای ایتیل اتر قوی چاودیدونکي خاصیت لری او د هوا سره چاودیدونکي تعامل تر سره کوي ، د لابراتواري کار د کړنې په وخت کې باید له هغه سره احتیاط وشي:



(8 - 8) شکل د ایترو سموزیدل په چاودیدونکی توگه

ډای ایتایل ایترو په پخوانیو وختونو کې د بې هو بنې مادي په توگه په کارول کېده.

ایترونه الوتونکي مواد دي؛ ځکه په دې موادو کې هایدروجنی اړیکه شتون نه لري. د ایترونو کیمیايي فعالیت ډیر لږ او د عضوي مرکبونو لپاره ښه محلل دي. ایترونه د الکولو په شان تعوضي تعاملونه ترسره کوي (کله چې کتلستونه شتون ولري)




د اتم څپرکي لنډيز

• هغه عضوي مرکبونه چې په خپل مالیکولي ترکیب کې د OH - وظيفه نېي گروپ ولري ، د الکولو په نوم یادېږي.

• د الکولو عمومي فورمول $R-OH$ دی چې R کېدای شي د الکیل پاتي شوني (رافیکل) د نارمل او یا منشعب زنجیر لرلسره، الکیل، الکیل (د دوه گونې او یا درې گونې اړیکې لرونکي) د اروماتیک کړۍ او داسې نور وي.

• د گړنارد د ښودونکي د الیهایدونو او کیتونونو سره تعامل کوي چې په پایله کې الکولونه جوړوي :



- خالص میتایل الکول بې رنگه مایع ده، ځانگړی بوی لري چې د ایتایل الکولو خوند لري او زهري دي، لږ خورل یې د روڼدوالي لامل او دهغه زیات خورل د مرگ لامل گرځي.
- که چیرې د الکولونو په مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل یو گروپ شتون ولري، دا ډول الکول د یو قیمتہ الکول په نوم یا دوي او که چیرې د الکولونو په مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو گروپونه شتون ولري ، دا ډول الکول د څو قیمتہ الکولونو په نوم یادېږي.

• گلیسرین یو درې قیمتہ الکول دي او د OH - درې گروپونه لري چې د گلیسرین سیستماتیک نوم



Propanetriol - 3, 2, 1 دی ، دا مرکب په عادي شرايطو کې مایع او سربینګ دی چې په اوبو کې په ښه توګه حلېږي او د اوبو د نرمولو مادې په توګه په مصرف رسېږي .

- د ایترونو عمومي فورمول $R-O-R$ او $Al-O-Al$ دی ، دوی هغه مرکبه دي چې د $(C-O-C)$ واحد لري .
- ایترونه لږ په اوبو کې حلېږي ، د ایترونو د ایشیدو ټکی د هغو مالیکولو د لږ قطبیت له کبله د هغو د ایزومرو الکولو اویزولوګو الکانو څخه لږ دی .

- د ساده ایترونو کیمیايي فعالیت د الکولونو په نسبت لږ دی ، د کاربن او اکسیجن اړیکه په ایترونو کې ډیره کلکه ده او د هغې پرې کیدل په ستونزو سره ترسره کېږي .

- ډای ایتیل اتر (Diethyl ether) په پخوانیو وختونو کې د بې هو ښي مادې په توګه په کارول کېده .
- ایترونه الوتونکی مواد دي ؛ ځکه په دې موادو کې هایدروجنی اړیکه شتون نه لري . د ایترونو کیمیايي فعالیت

ډیر لږ او د عضوي مرکبونو لپاره ښه محلل دی

د اتم څپرکي تمرین:

څلور ځوابه پوښتنې:

1. الکولونه د هایدرو کاربنو ----- مشتقات دي .

الف - د نایټروجنی ، ب - اکسیجن ، ج - سلفر ، د - فاسفورس .

2. دریمې الکول د هغو الکولونو له ډول څخه دي چې د $(OH-)$ ګروپ کاربن د ----- سره اړیکه ولري .

الف - د کاربن دو هغو اټومونو سره ، ب - د کاربن له درې اټومونو سره ، ج - د کاربن له یو اټوم سره ، د - $OH-$ له دروګروپونو سره .

3. د زایمیز انزایم ګلوکوز په ----- بدلوي .

الف - الکول ، ب - کیتون ، ج - الډیایډ ، د - تیزاب .

4 - د ګینارد معرف عمومي فورمول ----- دي .

الف - $R-Mg$ ب - $R-MgX$ ج - $R-Mg(OH)$ د - $R-Mg(OH)_2$

5 - د الکولونو او تیزابونو تعامل د ----- تعامل په نوم یادېږي .

الف - صابون جوړونه ، ب - ایسترفیکیشن ، ج - تجزیني تعامل ، د - هېڅ یو .

6. د الکولو او Na تعامل محصول $Na-O-R$ او ----- څخه عبارت دی .

الف - H_2 ، ب - $NaOH$ ، ج - الډیایډونه ، د - کیتونونه .

7. د لومړني الکولو د اکسیدیشن د تعامل محصول ----- دی.

الف - الډیهایدونه، ب - تیزابونه، ج - کیتونونه، د - هېڅ یو.

8. هغه الکولونو چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه ولري د ----- په نوم یادېږي.

الف - دویمي الکول، ب - دوه قیمتې الکول، ج - ګلایکول، د - ب او ج دواړه.

9. سایکلو بیوتانول د ----- جمعې فورمول لرونکی دی.

الف - C_4H_7OH ، ب - $C_6H_{13}OH$ ، ج - $C_4H_{10}OH$ ، د - $C_6H_{13}OH$.

10. $C_6H_{13}OH$ د ----- جمعې فورمول دی.

الف - *Hexanol*، ب - *CycloHexanol*، ج - *Heptanol*، د - *pentanol*.

11. د الکولو په نوم اېښودنه کې د کاربنول ګروپ لرونکي بنسټیز زنځیر نوم د ----- وروستاړي باندې پای ته رسېږي.

الف - *ol*، ب - *ol*، ج - *one*.

12. د ---- الکولو په شتون کې د هغوی د ایشیدو درجې د لوړیدو لامل ګرځي.

الف - و اندروالس قوه، ب - هایدروجنې، ج - د دای پړل - دای پړل قوه، د - ټول.

13. د ایتیلین او د ----- تعامل څخه الکول حاصلېږي.

الف - القلیو، ب - $NaOH$ ، ج - اوبو، د - تیزابونو.

14. Iso propyl ethers فورمول عبارت دی له:

الف - $CH_3 - CH_2 - O - CH_3$ ب - $CH_3 - \overset{\overset{CH_3}{|}}{CH} - O - CH_2 - CH_3$

ج - $CH_3 - CH_2 - CH_2 - O - CH - (CH_3)_2$ د - $CH_3 - CH - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$

15 - په الکولي تخمر کې دلاندې موادو کوم یو په الکولو بدلون مومي؟

الف - نشایسته، ب - بوره، ج - ګلوکوز، د - نشایسته او بوره.

16. د ایتانول د دوو مالیکولو له دې هایدروجن څخه لاندې کوم یو مرکب جوړېږي.

الف - الډیهاید، ب - کیتون، ج - دای ایتایل اتر، د - تیزاب.

17. CH_3OH (R)₂ فورمول د لاندې مرکبونو له کوم یو فورمول څخه دی؟

الف - دریمي الکول، ب - لومړني الکول، ج - اتر، د - هېڅ یو.

18. $CO(CH_3)_2$ فورمول د کوم لاندې مرکب فورمول دی .




الف - ډاي میتیل کیتون ، ب - الډهايد ، ج - استون ، د - الف او ج دډواړو.

19. که چيرې الډهايدونه ارجاع شي، له لاندې مرکبونو څخه به کوم مرکب حاصل شي ؟

الف - الکولونه ، ب تيزابونه ، ج - ايترونه ، د - گلايکولونه .

تشرېحي پوښتنې

1. لاندی معادلې بشپړې او توازن کړئ




2 - له $200g$ ، 80% خالص کليسم کاربايد څخه به څومره ايتال الکول حاصل شي ؟که چيرې په دې تعامل کې 75% خالص ايتال الکول تر لاسه شوي وي ، د کليسم کاربايد ماليکول کتله $64g/mol$ او د ايتال الکول

$46g/mol$ ده .

3. د هغو ايترونو فورمولونه وليکئ چې له لاندې الکولونو سره ايترونه وي :



4 - د لاندی ايترونو معمولي او سيستماتيک نومونه وليکئ :



5. $0.2mol$ ډاي ايتال ايترونه له HBr غليظ محلول سره تعامل ورکول شوی دی، څو گرامه الکول او څو گرامه ايتال برومايد په دې تعامل کې حاصلېږي ؟ د ايتال الکول ماليکولي کتله $46g/mol$ ده .



6. د معتبرو کتابونو او ماخذونو په ګډه اخېستې سره د ګلیسرین او ایتیلین ګلايکول د کارولو ځایونه ولیکئ کوم چې د دې درسي کتاب په متن کې لیکل شوي نه وي .

7. 92% خالص ایتایل الکول په 50g کمیت د ایتیلین د لاس ته راوړنې په موخه په کار وړل شوی دي چې د لاس ته راغلي محصول 80% ایتیلین لري :

الف - څومره الکین به حاصل شي وي ؟

ب - له همدې الکولو څخه به څومره اتر حاصل شي ؟


د ایتایل الکول مالیکولي کټله $46g/mol$ او داي ایتایل اتر $74g/mol$ ده .

8. د لاندې موادو د تعامل محصول او کیمیايي معادلې بشپړ کړئ :

الف - که چیرې میتایل الکول د $K_2Cr_2O_7$ په H_2SO_4 محلول کې اکسیدیشن شوی وي.

ب - که چیرې پروپانو 2- $propanol$ په $KMnO_4$ محلول کې اکسیدیشن شوی وي .

الډیهایدوننه او کیتونونه




د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مرکبونه ښه دي؛ له دې کبله په بیلابیلو ټولګیو ویشل شوي دي، الډیهایدوننه او کیتونونه هم د هایدروکاربنونو نور اکسیجن لرونکي مشتقات دي چې په صنعت کې بنسټیز رول لوبوي. هغوی د رنگونو په جوړولو، د حیواناتو د جسدونو د ساتلو، د ربړ، پلاستیک، د عطر جوړونې او نورو برخو کې دکارولو ځایونه لري. دا مرکبونه په دې څپرکي کې مطالعه کېږي او ددې څپرکي په لوستلو به پوه شئ چې الډیهایدوننه او کیتونونه څه ډول مرکبونه دي او له کومو سرچینو څخه لاسته راځي؟

دکومو ځانګړتیاوو لرونکي او په کومو برخو کې کارول کېږی؟

9: الیهاید او کیتون (د کاربونیل د گروپ مرکبونه)

د کاربونیل ($C=O$) گروپ په ځانګړو عضوي مرکبونو کې شتون لري چې دې مرکبونو ته یې ځانګړی خواص ورکړي دي، د کاربن او اکسیجن اټومونه په دې گروپ کې دوه ګونې اړیکه لري چې یوه یې د پاي (π) اړیکه او بله یې د سګما (σ) اړیکه ده چې د کاربن اټوم SP^2 - hybrid اوریټال د پاي (π) اړیکه د کاربن د $2P$ نه هایلیرد شوي اوریټال او اکسیجن د $2P$ نه هایلیرد شوی اوریټالونو د څنګیر نښتې په پای کې منځته راځي. په لاندې شکل کې د کاربونیل وظیفه یې گروپ ځانګړتیاوې وړاندې شوي دي:



(9-1) شکل د کاربونیل په گروپ کې د اړیکو ځانګړتیاوې

د کاربونیل د مرکبونو جوړښت چې عبارت له الیهایدونو او کیتونونو څخه دي، یو بل ته ورته دي، یوازې د کاربونیل د گروپ له کاربن سره د هایدروجن د اټومونو په شمیر کې یو له بل څخه توپیر لري چې د هغوی عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي:




په دې فورمولونو کې R او R' عضوي پاي شوني رادیکل دي چې کېدای شي، الفلیک یا اروماتیک وي (Aldehydes)

1- الیهایدونه

الیهایدونه د هایدروکاربونونو اکسیجنې مشتقات دي چې د کاربونیل ($C=O$) وظیفه یې گروپ د هایدروکاربونونو یو اټوم هایدروجن تعویض کړي دي (په فارم الیهاید د کاربونیل د گروپ دواړه اړیکې په استثنايي ډول د هایدروجن له دوو اټومونو سره تړلي دي).

په الیهایدونو کې وظیفه یې گروپ د کاربونیل گروپ دي چې د هغه یو ولانسي الکټرون په هایدروجن او دویم ولانسي الکټرون یې له عضوي پاي شونو سره تړل شوي دي، عضوي پاي شوني کېدای شي، الفلیک او یا اروماتیک وي؛ دیلګې په ډول: $R-C(=O)-H$ د الیهایدونو عمومي فورمول دي او R کېدای شي چې د CH_3 ، C_2H_5 او نور رادیکالونه وي. داروماتیک الیهایدونو فورمول $R-C(=O)-H$ دی چې د هغوی بیګه کېدای شي بنزالیهاید وړاندې کړای شي:



د اليفاتيک الډيهايډونو عمومي فورمول له $C_nH_{2n}O$ څخه عبارت دی :

مثال:

د هغه الډيهايډ ماليکولي فورمول پيدا کړئ چې په هغې کې د کتلي له کبله 40% کاربن شتون ولري (د کاربن د اټوم کتله 12، هايډروجن 1 او اکسيجن 16 ده)

حل : د الډيهايډ ماليکولي کتله عبارت دی له:

$$\begin{aligned} MC_nH_{2n}O &= 12_n + 1 \cdot 2_n + 16 = 12n + 2n + 16 = 14n + 16 \\ 100g & \quad \quad \quad 40g, \quad 100g \cdot 12n = (14n + 16) \cdot 40g \\ 14n + 16 & \quad \quad \quad 12n, \quad 12n = \frac{40g(14n + 16)}{100g} \\ 12n &= \frac{2(14n + 16)}{5}, \quad 12n = \frac{28n + 32}{5}, \quad 60n = 28n + 32 \\ 60n - 28n &= 32, \quad 32n = 32, \quad n = \frac{32}{32}, \quad n = 1 \\ C_nH_{2n}O &= C_1H_{2 \cdot 1}O, \quad CH_2O \text{ formaldehyde} \end{aligned}$$

پورتنی لاس ته راغلی مرکب فارم الډيهايډ دی.

فعاليت:





د يو الډيهايډ کثافت $1.8g/L$ دی ، د کوتي په تودوخه کې د هغه يومول $22.4L$ حجم لري ، د هغه فورمول پيدا کړئ (د هايډروجن کتله $1amu$ ، د کاربن کتله $12amu$ او د اکسيجن کتله $16amu$)


9 - 1 : نوم ايښودنه

د الډيهايډونو معمولي يا راډيکالي نوم ايښودنه د هغوی د اړونده تيزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه دا الډيهايډ لاس ته راغلی دی، اخيستل شوي ده، داسې چې د *acid* - کلمه په *aldehyde* او د اړوند تيزابونو د نوم د *oic* وروستاري په (ل) بدلون موندلی.


د ايوپيک په نوم ايښودنه کې د کاربونيل لرونکي څير اوږد زنځير په گوته او نمبر وهل کيږي، داسې چې بايد لومړی نمبر د کاربونيل د گروپ کاربن کې وليکل شي. د نمبر وهلو په بنسټ د بنسټيز زنځير د کاربونونو شمير ټاکل کيږي؛ په دې صورت کې بنسټيز زنځير چې اوږند هايډروکاربن دی، د نوم د وروستي *e* - توري پر ځای *al* - وروستاري ليکل کيږي، د معاوضو نوم د بنسټيز زنځير د کاربن له نمبر سره چې په هغه پورې تړلی دی، د نوم ايښودلو په پيل کې د بنسټيز زنځير له نوم څخه مخکې ليکل کيږي، لاندې د الډيهايډونو د معمولي او ايوپيک د نوم ايښودنې بيلگې وړاندې شوې دي:



2 - methylpropanal




د عددونو د نمبر و هلو سريره چې د کاربونيل د گروپ له کارين څخه پيل کيږي ، په يوناني تورو α, β, γ او σ باندې هم د کاربونونو اتومونه په بنسټيز زنجير کې چې له دوهم کارين څخه پيل کيږي، نمبر وهل کيږي ، د معارضو نومونه په همدې اړونده تورو باندې يادېږي، د بيلگې په ډول:



خپل ځان وازمويئ


۱- د لاندي مرکبونو نوم ايښودنه وکړئ:



2- دلاندي مرکبونو ساختماني فورمول وليکئ :

9-1-2: د الډهايدونو فزيکي خواص


د الډهايدونو قطبي مالیکولونه د غیر قطبي مرکبونو څخه چې د هغوی مالیکولي کتله یو له بل سره نژدې وي د الکولونو په استناد ایشیدو لوړ ټکی لري؛ لکه:



فارم الډهايد د کوتي په تودوخه (25°C) کې د گاز حالت او هغه الډهايدونه چې د کاربن 2-11 نوم لري، دمايع او د 11 کاربنونو څخه لوړ د جامد حالت لري.

کوچني الډهايدونه د اوبو له مالیکولونو سره هايدروجني اړيکه جوړوي؛ نو په اوبو کې د حل کیدلو ښه وړتيا لري، د مولې کتلې په زیاتوالي د مالیکولونو قطبيت ټيټېږي او د هايدروکاربنې گروپ اغيزې ډیرېږي، له همدې کبله په اوبو کې د هغوی حل کیدل لږېږي.

فارم الډهايد او نور الډهايد ونه د ايزولوگو الکولونو د فورمولونو څخه دوه لومړه هايدروجن کم لري؛ نو له دې امله د الډهايدونو نوم له هايدروجن پرته الکولونه (Alcohol dehydrogenation = Aldehyd) څخه اخیستل شوی دی.



(2-9) شکل په الډهايد ونو کې هايدروجني اړيکې

هغه الديهايدونه چې د ټيټې مولې کتلې لرونکي دي ، تيز بوی لري او د مولې کتلې په زياتوالي يې بوري ښه او په زړه پورې کيږي؛ نو د ښه بوي ورکولو او د غذا د خونددر لودلو لپاره کارول کيږي . په لاندې جدول کې د (1-9) الديهايدونو ځنې ځانگړتياوې ليکل شوي دي :


نوم	فورمول	mp(°C)	bp(°C)	d ₂₀ ^o C(g/ml)	Solubility (g/100gH ₂ O)
Formaldehyde (methanal)	HCHO	-92	-21	0,815	ډیر حل کېږي
Acetaldehyde (ethanal)	CH ₃ CHO	-125	21	0,783	ډیر حل کېږي
Propionaldehyde (propanal)	CH ₃ -CH ₂ -CHO	-81	49	0,806	ډیر حل کېږي
n-butylaldehyde (butanal)	CH ₃ (CH ₂) ₂ -CHO	-99	76	0,817	حل کېږي
n-valeraldehyde (pentanal)	CH ₃ (CH ₂) ₃ -CHO	-91,5	102	0,810	دحل کېدوړتیا ښې کمه ده
caproaldehyde (hexanal)	CH ₃ -(CH ₂) ₄ -CHO	-51	131	0,833	دحل کېدوړتیا ښې کمه ده
benzenecarbaldehyde (benzaldehyde)	C ₆ H ₅ CHO	-26	178	1,42	دحل کېدوړتیا ښې کمه ده

9-3-1: دالديهايد ونو کيميايي خواص


- د الديهايدونو کيمياوي فعاليت له کيټونونو څخه توپير لري؛ ځکه د الديهايد د کاربونيل په گروپ کې د هایدروجنې او (π) اړيکې شتون د هغوي فعاليت پې ډير کړی دی چې د هایدروجن او نورو مرکبونو سره جمعي تعاملونه ترسره کولای شي ، الديهايدونه لاندې ځانگړي تعاملونه ترسره کوي.
 - د کاربونيل گروپ د جفتو اړيکو پرنسب جمعي تعاملونه سرته رسوي.
 - د نايتروجن لرونکي له بيلايلو وظيفه يي گروپونو سره د اکسيجن د اټوم تعويض کيدلو تعامل .
(Condensation reaction).
 - د اکسیديشن او ريډکشن تعاملونه.
- 1- دالديهايدونو اکسیديشن
- الديهايدونه د قوي اکسیدانتونو؛ لکه: $KMnO_4$ ، $K_2Cr_2O_7$ يا K_2CrO_4 ، د تيزابونو په شتون کې اکسیدي او په پايله کې کاربوکسيلک اسيدونه جوړيږي:



د تولین (Tollen) تجربه (د بنسټي جیوه): دسینو زرو د نایتریتو او د امونیا داوبلن محلول دمخلو ټپي بڼه د تولین بڼوونکي په نوم یادوي، دا محلول د $[Ag(NH_3)_2]^+$ په بڼه ښکاره کيږي او د هغه څخه له الډیهایدونو په اکسیدیشن کې ګټه اخېستل کيږي، په دې محلول کې د سپینو زرو د اکسیدیشن نمبر له 1 + څخه په فلزي سپین زو ارجاع کيږي او الډیهایدونه د کاربوکسیلیټونو آیونونو په بڼه اکسیدي کيږي:



د تولین بڼوونکي د ځینو الډیهایدونو سره د تولوخي په شتون او له ځینو نورو الډیهایدونو سره په تولوخي کې تعامل کوي، د تعامل محصول سپین زو دي چې د بنسټي د پاسه رسوب او د بنسټي د جیوي کیدو لامل ګرځي:



(9 - 3) شکل د تولین ازمایښت (Tollen test)


الف - په پاک ښکر کې د سپینو زرو نایتریت او امونیا اوبلن محلول شتون

ب - تاسې کولای شئ د محلول رنگ وګورئ چې د ایتانل د اکسیدیشن له امله په استیک اسید باندې منځته راځي.

ج - فلزي سپین زر د بنسټه نې ښکر په ډبرال باندې رسوب کوي، هغه جیوه کوي. تول الډیهایدونه دا ټول تعاملونه سرته رسولی شي.

مثال: د تولین د بڼوونکي د تعامل معادله د لاندې الډیهایدونو سره ولیکئ:

الف - فارم الډیهاید (form aldehyde) ب - استیت الډیهاید (acet aldehyde)



حل





فعالیت

محاسبه نېي کړئ

د گالیکول او اسیت الیهاید د مخلوطو یو ګرام د تولین ښودونکي سره تعامل کړی چې $1.08g$ د اسیتات ایون تري لاس ته راغلی دی ، په دې محلول کې به د اسیت الیهاید اندازه څومره وي ؟


د فېلنګ آزماښت

د فېلنګ د ښودونکي محلول قلوي خاصیت لري چې د Cu^{2+} ایونو او دیوتا شیم یا سوډیم تارتاریت له مالګې ($Na_2C_4H_4O_6$) څخه جوړ شوی دی او دکامپلکس په ښه شتون لري ، کله چې د فېلنګ ښودونکي له الیهاید و نو سره تعامل وکړي ، په کامپلکس کې د Cu^{2+} رنګ د خیره اوبو له رنګ څخه په سور رنګ توره ورتنه د مس په یو ولانسه اکساید (Cu_2O) بدلون مومي ؛ په دې صورت کې الیهاید په همدې وخت کې په کاربوکسیلیت ایون ($R-COO^-$) بدلون مومي :



اروماتیک الیهاید ونه یوازې د تولین ښودونکي په واسطه اکسیدي کيږي ؛ خو د فېلنګ ښودونکي په واسطه نه اکسیدي کيږي.


که چېرې ایټال په $21^\circ C$ تودوخه کې د فېلنګ له محلول سره په یو تست تیوپ (آزماښتی نل) کې واچول شي ، په دې صورت کې CuO او استیک اسید لاس ته راځي :



(9- 4) شکل د ایټال تعامل د فېلنګ ښودونکي سره

د $KMnO_4$ سره د الیهایدو نو تعامل

الیهایدونه د پوټاشیم پرمگانیت سره تعامل کوي په پای کې الیهایدونه په کاربوکسیک اسیدونو اکسیدي کيږي او Mn^{+7} اکسیدیشن نمبر څخه په Mn^{+2} اکسیدیشن نمبر پورې اړاع کيږي :




د الډيهايډونو جمعي تعاملونه

د کاربونیل د ګروپ لرونکو مرکبونو عمده تعاملونه له جمعي تعاملونو څخه عبارت دي، په دې تعاملونو کې د $C=O$ ګروپ د (π) اړیکه پرې کېږي چې د کاربن اټوم قسمي مثبت چارج (δ^+) اود اکسیجن اټوم منفي قسمي چارج (δ^-) دخپلو د الکترونیګاتیویتی پر بنسټ تر لاسه کوي اود وړوستیو تعاملونو لاره برابره کېږي په پایله کې د کاربن او د اکسیجن اټومونه د نورو اټومونو سره نوي اړیکې تړي او نوي مرکبه جوړېږي.


د هایډروجن سره د الډيهايډونو جمعي تعاملونه

هایډروجن له الډيهايډونو سره د Ni او Pt د کتلست په شتون کې تعامل کوي چې په پایله کې لومړني الکولونه لاس ته راځي:




له الکولو سره د الډيهايډونو جمعي تعامل

د انهایډرایټ تیزاب (anhydrous acid) د کتلست په شتون کې، الکولونه له الډيهايډونو سره تعامل کوي، داسې چې د الکواکسي ګروپ ($R-O-$) دکاربونیل ګروپ دکاربن له اټوم سره او H^+ دکاربونیل ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې نښلی چې په لومړي پړاو کې هیمي اسیټال (hemiacetal) او په دویم پړاو کې Acetal منځته راځي:




لومړي پړاو

نمونوي بېلګه:




دویم پړاو




له HCN سره د الډهايد، جمعي تعامل

د دې تعامل محصول سيانو هايډرېډونه دي. HCN زهري گاز دی؛ نو ددې گاز نېغ تعامل له الډهايدونو سره مجاز نه دي. د CN^- د ايون مالګه چې له فعالو فلزونو؛ لکه: Na او K سره جوړه کېږي ده، د H_2SO_4 او H_3PO_4 له غير عضوي تيزابونو سره تعامل ورکوي او په پايله کې HCN لاسته راوړي چې له تشکيل کېدلو وروسته هغه ته له الډهايد ونو سره تعامل ورکوي، سيانو هايډرېډونه لاس ته راځي:




Aldehyde Aldehyde Cyanohydrine



aenzAldehyde Benz aldehyde Cyanohydrine

د ګرڼار د له بنودونکي سره د الډهايدونو جمعي تعامل

د الډهايدونو جمعي تعامل د ګرڼار د له بنودونکي سره د الکولو د لاسته راوړنې لپاره يو ډير مهم ميتود دی چې د دې تعامل په لومړي پړاو کې الکا اکسايډونو (Alkoxides) توليدېږي. Alkoxides د تيزاب په شتون کې هايډروليز کېږي:




پوليمير ايزيشن Polymerization

د الډهايدونو ماليکولونه د بيلا بيلو مرکبونو له وظيفه يي ګروپونو سره د پولي مير ايزيشن تعامل تر سره کوي او په پايله کې پولي ميرونه تشکيلېږي چې د الډهايدونو د پولي مير ايزيشن تعامل کې د الډهايدونو د پای (π) اړيکه پرې کېږي. يو ماليکول د اکسيجن اټوم د بل ماليکول له کاربن اټوم سره اړيکه جوړوي او د دې تعامل په پايله کې د دغو کرپيزه او خطي زنځيري مرکبونه جوړېږي:



زنځيری پولي مير:


پولي کړه نیز پولي مير:



د الیهایدونو پولي مير د الیهایدونو خواص نه لري؛ ځکه په هغوی کې الیهاید گروپ نه شته دی. د پولي مير د ایشیدو ټکي له اړوندو الیهایدونو څخه لوړ دی.

الیهایدونو د سوزیدلو تعامل (Combustion reaction)

د الیهایدونو د سوزیدلو تعامل محصول CO_2 ، اوبه او انرژي ده، د الیهایدونو د تعامل عمومي معادله په لاندې ډول ده:



فعالیت




د اسیت الیهاید جمعي تعامل له لاندې مرکبونو سره ولیکئ:

الف - اوبه، ب - هایدروجن، ج - میتیل الکول، د - $NaHSO_3$

9- 1: د الیهایدونو لاس ته راوړنه

1- د لومړي الکولونو اکسیدیشن: که چېرې لومړی الکولونه اکسیدیشن شي، الیهایدونه حاصلېږي. د لومړنيو الکولونو د اکسیدیشن منځني حالت تر کاربوکسلیک اسید پورې، الیهایدونه دي، دا تعامل د کتلست په شتون کې ترسره کېږي:




په دې تعامل کې د اکسیدي کونکي عامل $K_2Cr_2O_7$ دی.

2- د لومړنيو الکولونو د هایدروجنیشن:


که چېرې لومړني الکولونه د کابر (II)، اکسید او کرومیم (II)، اکسیدله مخلوط ($CuO \cdot Cr_2O_3$) سره چې د کتلست په توګه دنده ترسره کوي، دې هایدروجنیشن شي، الیهایدونه حاصلېږي. د دې تعامل میتود داسې

دی چې د الکلونو براسونه په 300°C - 250 په تودوخې کې کاپر کرومیت تیروي چې د لومړني الکل له هر مالیکول څخه یو مالیکول هایدروجن جلا کېږي. له هغو الکلونو څخه چې د کاربنونو د لږو اتومونو لرونکي دي، د CuO د کتلست په شتون کې هم هایدروجن جلا کېږي:



د عضوي تیزابونو د ارجاع کولو په واسطه د الډیهایدونو لاس ته راوړنه


که چېرې عضوي تیزابونه ارجاع شي، په پایله کې الډیهاید ونه لاس ته راځي، په دې تعامل کې د یو عضوي تیزاب او د فارمیک اسید براسونه د TiO_2 له کتلست څخه په 350°C - 300 تودوخه کې تیروي، په پایله کې الډیهایدونه، CO_2 او H_2O لاس ته راځي:



9- 1- 5: ځنې مهم الډیهایدونه

فارم میک الډیهاید:


د الډیهایدونو لومړنی مرکب فارم الډیهاید دی چې روسي کیمیا پوه بونلیروف په واسطه په 1859 کال کې کشف شو. فارم الډیهاید بې رنگه گاز دی چې تیزوی لري، د الډیهایدونو ډیر ساده مرکب فارم الډیهاید یا میتانل دی چې فارمل هم نومول شوی دی. فارم الډیهاید هغه مایع ده چې عموماً له اوبو سره د محلول په بڼه د ژونډیو موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د لرګیو لوګیو کې هم فارم الډیهاید شته دي




(9- 5) شکل د فارملین محلول

چې یو وړونکی مرکب دی. په اوبو کې حل کېږي او د هغه 40% محلول د فارملین په نوم یاد شوی دی چې ډیر استعمال لري، فارم الډیهاید د ساختماني موادو په صنعت کې او د کور په وسایلو کې کارول کېږي.

فارم الډیهاید له امونیا سره ځمعي تعاملونه (پولیمیرایزیشن) ترسره کوي چې مهم او با ارزښته مرکب هګزا میتلین تترامین (یورو تروپین) تشکیلوي. یورو تروپین په طبابت کې د تشو میتازو د تل د مینځلو او پاکولو لپاره او په صنعت کې د سرینین او کتنه د کلکولو او په همدې ترتیب هغه په غاښي موادو کې ور زياتوي چې د هغه د خرابیدلو څخه مخنیوی کوي.



که چیري فارم الیهاید ته تودوخه ورکړل شي، سپین کړسلي حالت ځانته غوره کوي، دا کړ ستلونه د تودوخې په 123°C کې ویلې کیږي، په دې پولیمیر کې له 50 تر 100 پورې د الیهایدونو، مونو میرونه شتون لري، تشکیل شوی پولیمیر خطي دی، که چیرې هغه ته تودوخې ورکړل شي، بیا په فارم الیهاید تجزیه کیږي:



د فارم الیهاید لاس ته راوړنه

که چیرې میتانول د گوگړو تیزابو په شتون کې اکسیدایز شي؛ په پایله کې فارم الیهاید حاصلیږي. په لابراتوارو کې د KMnO_4 ، $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ یا K_2CrO_4 تیزابي محلولونو د اکسیدیشن د عامل په توګه کارول کیږي:





د تعامل د محصول تند او تیز بوی د فارم الیهاید د جوړېدو ښودونکی دی.

په صنعت کې فارم الیهاید داسې لاس ته راوړل کیږي چې د میتانول او هوا مخلوط له سرو او ډیرو ګرمو مسو څخه تیروي او په پایله کې له میتانول څخه یو مالیکول اوبه جلا کیږي:



2- است الیهاید

خالص است الیهاید بې رنگه او زهري مایع ده چې په اوبو کې حلېږي، د ایشیدو ټکی یې 21°C دی. له است الیهاید څخه استیک اسید، ایتانول او مصنوعي رېډ لاس ته راوړي:




است الیهاید د کوټي په تودوخه کې د گوگړو تیزابو په شتون کې ګوښیز پوړی میر (پارا الیهاید) جوړوي چې


Acetaldehyde $\xrightarrow{\text{H}}$ paraldehyde

The diagram shows the chemical reaction where acetaldehyde (CH₃CHO) reacts with H to form paraldehyde, a cyclic trimer (C₃H₆O₃). The structure of paraldehyde is shown as a six-membered ring with alternating carbon and oxygen atoms.

ميتاالديهايد جامده ماده ده او په 1220C کې الوزي چې په لومړي نړيواله جگړه کې عسکرو د خپل ځان د گرمولو لپاره د جامد ايتانول په ځای په کارول چې له اسيت الديهايد تريامير انريشن څخه لاس ته راځي؛



$$\begin{array}{c} \text{nCH}_3-\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{H} \\ \searrow \text{O} \end{array} \longrightarrow \cdots \text{C} \begin{array}{l} | \text{H} \\ | \text{CH}_3 \end{array} - \text{O} - \text{C} \begin{array}{l} | \text{H} \\ | \text{CH}_3 \end{array} - \text{O} - \text{C} \begin{array}{l} | \text{H} \\ | \text{CH}_3 \end{array} - \text{O} \cdots \end{array}$$

په هغو مرکزونو کې چې د کاربونیل وظيفوي گروپ د الکايل د دوو پاتې شونو سره اړيکې ولري، دا ټول مرکبونه د کيټونونو په نوم يادېږي. د کيټونونو عمومي فورمول $R-C(=O)-R'$ يا $R-C(=O)-R$ دی، هغه د کيټونونو او کيټونونه چې يوشان جمعې فورمول ولري، يو بل ايزومر دي؛ د بېلگې په ډول:




په معمولي نوم ایښودنه کې د R (د الکایل ګروپ) پاتې شوني په جلا ډول (که چېرې سره ورته وي)، د ډای کلمه د مختلاري په بڼه په هغوي باندې ور زیاتېږي (نومول کېږي او د کیتون کلمه پر هغوي

ور زياتيري:




خپل ځان و ازمويئ

د لاندې کيټونونو نوم ايښودنه په معمولي لارې تر سره کړئ:




2- د ايوپک IUPAC) پر لارې د کيټونونو نوم ايښودنه

د کيټونونو په نوم ايښودنه کې اوږد زنځير چې د کاربونيل گروپ په هغه کې نښتی وي، ټاکل کېږي او نمبر وهل يې تر سره کېږي، خو نمبر وهل د زنځير له هغه نوکې څخه پيلېږي چې د کاربونيل گروپ کوچنی نمبر ځانته غوره کړي؛ په دې صورت کې لومړی د هغه کاربن نمبر کوم چې معاوضه ورسره تړلي ده، ليکل کېږي له نمبرونو څخه وروسته د هغو د معاوضو نوم ليکل کېږي چې له همدې کاربن سره اړيکه لري، بيا د کاربونيل د گروپ د کاربن نمبر مخکې د اوږد زنځير له نوم څخه ليکل کېږي او د اوږد زنځير په نامه کې چې د کاربونيل د گروپ لرونکي دي، د اړونده هايډرو کاربن د نوم وروستۍ توري (e) يې په *one* تعويض کېږي:




فعاليت

د لاندې مرکبونو نومونه د IUPAC په سيستم ونوموئ:



9- 2- 2: د کیتونونو فزیکي خواص

د کوچني مولې کتلې لرونکي کیتونونه د مایع په حالت دي او هغه کیتونونه چې د 11 او یا له دې شمیر څخه ډیر دکاربن اتومونه ولري، د جامد په حالت موندل کېږي، مایع کیتونونه په اوبو کې حل کېږي او د اوبو له مالیکولونو سره هایدروجنې اړیکه جوړوي، مایع کیتونونه د کیمیاوي رنگونو د محلول په توګه کارول کېږي. اوبو کې د کیتونونو حل کېدل د هغوی د مالیکولي کتلې په لوړوالي ټیټېږي او په زړه پورې بوی لري، چې الیهایدونو ته ورته بوی دی. سره دې چې د کیتونونو مالیکولونه قطبي دي؛ خو د هغوی کاربونیل ګروپ هایدروجنې اړیکه نه شي ټینګولای؛ ځکه د هغوی په مالیکول کې هایدروجن له اکسیجن سره اړیکه نه لري. د الکیل ډګروونو د کاربن د اتومونو په زیاتوالي، د هغوی قسبیت ټیټېږي. هغه کیتونونه چې د هغوی مولې کتله د هایدرو کاربنونو او ایترونو سره یو شان ده، د ایشیدو ټکی یې لور دي، خو د یوشان الکولونو څخه یې د ایشیدو ټکی ټیټ دي:




(9- 2) جدول د مهمو کیتونونو فزیکي خواص

Name نوم	structure جوړښت	$n_D^{20}(^\circ\text{C})$	$b_p(^\circ\text{C})$	$d_{20}(\text{g}/\text{mL})$	Solubility in water (g/100mL H_2O)
Acetone	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3$	-95	56	0,790	α
Butanone	$\text{CH}_3-\text{COCH}_2-\text{CH}_3$	-86	80	0,805	زیات حلیدونکی
2-Pentanone	$\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	-78	102	0,812	حلیدونکی
3-Pentanone	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	-39	102	0,816	حلیدونکی
2-Hexanone	$\text{CH}_3-\text{CO}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_3$	-57	127	0,830	لږ حلیدونکی
Acetophenone	$\text{CH}_3\text{COC}_6\text{H}_5$	21	202	1,028	نه
Benzophenone	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_5$	48	306	1,100	نه

9- 2- 3: د کیتونونو کیمیاوي خواص

د کیتونونو د کاربونیل په ګروپ کې د هایدروجن اتوم شتون نه لري؛ نو پر دې بنسټ د ارجاع د عامل په توګه فعالیت نه شي ترسره کولای. دا مرکبونه کولای شي په ارجاعي تعاملونو کې د اکسیدیشن د عامل په توګه برخه


واخلي. که چیري کیتونونو ته ډیر مهال د قوي اکسیدانتونو په شتون کې تودوخه ورکړل شي، د هغوی کارني زنجیر پرې او په پایله کې په عضوي تیزابونو بدلون، یا داچې په بشپړه توګه تجزیه کېږي؛ پر دې بنسټ متناظر کیتونونه په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه په څلورو بیلابیلو تیزابونو تجزیه کېږي:



د کیتون د کاربونیل ګروپ د کاربن اټوم او د اکسیجن اټوم د کارني زنجیر له ماتیدلو وروسته فعالیتېږي، سره له دې چې له الډهایدونو څخه لږ فعالیتېږي؛ خو بیا هم جمعي تعاملونه ترسره کولای شي:


1- د هایدروجن سره د کیتونونو جمعي تعامل

کیتونونه له هایدروجن سره د فلزي کلتستونو (Pd او Pt , Ni) په شتون کې تعامل کوي چې په پایله کې دویمي الکترولونه جوړېږي: په دې صورت کې کیتونونه ارجاع کېږي:



2- د اوبو سره د کیتونونو جمعي تعامل


که چېرې کیتونونه په اوبو کې حل شي، د کیتونونو هایدرايتي بې ثابته حالت منځته راځي؛ داسې چې د اوبو د هایدروجن اټوم د کاربونیل ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو د OH -ګروپ د کاربونیل ګروپ د کاربن په اټوم باندې نښلي، په اوبو کې حل شوي کیتون او هایدرايتي حالت بې په یوه تعادل کې شتون لري:



نوټ: په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسيل دوه ګروپونه د کاربن له یو اټوم سره اړیکه ولري، بې ثابته دي.

9- 2- 4: د کیتونونو لاس ته راوړنه:

د دویمې الکولونو له اکسیدیشن څخه کیدای شي چې کیتونونه لاس ته راوړل شي، له اړوند الکول څخه د لاس ته راغلو کیتونونو د ایشیدو ټکي ټیټ دی؛ نو له دې کبله کیتونونه د براسرونو په حالت لاس ته راځي:




د کیتونونو مرکبونه استون Aceton

استون د پروپانون اویا ډای میتیل کیتون په نوم هم یادیږي. دا مرکب یې رنگه مایع ده چې تیزې لري او الوتنکي ماده ده، په $56^\circ C$ کې په ایشیدو راځي، په اوبو، الکولو او ایترونو کې په هر نسبت حل کېږي، د عضوي موادو بڼه محال هم ده. د ورنسو رنگونو، د نوکانو رنگو، پلاستیکو، د غوړونو رنگونو او د هغوی د مشتقاتو، د کنډو او لاکو بڼه حلونکې ماده ده. استون د هغو وگړو په تشو میتيازوکې شتون لري کوم چې د شکرې له ناروغۍ څخه خورېږي. ددې وگړو تشې میتيازې د استون بوی لري. استون په اوبه رنگه لمبه سوځي او په ستونزو سره اکسیدایږي.

د استون لاس ته راوړنه:


1- دلرگيو د مجموعي د تقطير له محصولاتو څخه، 0.5% بې استون دي چې کیدای شي هغه د تدریجي تقطير له امله جلا کړای شي.

2- د لاندې دستگاه په واسطه، کلسیم استیت ته د تودوخې په ورکولو هم کیدای شي، استون لاس ته راوړل شي:



(9-6) شکل له کلسیم استیات څخه د لاس ته راوړلو دستگاه

کلسیم استیت ته له تودوخې ورکولو څخه وچ استون حاصلېږي:



په همدې توگه په نورو میتودونو هم کیدای شي چې استون په لاس راوړل شي.






د نهم خپرکي لنډيز

- دکاربونيل ($\text{C}=\text{O}$) گروپ په ځانگړو عضوي مرکبونو کې شتون لري چې دې مرکبونو ته يې ځانگړی خواص ورکړي دي.
- الډهايډونه د هايډروکاربونونو اکسيجنې مشتقات دي چې د کاربونيل ($\text{C}=\text{O}$) وظیفه يې گروپ د هايډروکاربونونو يو اتوم هايډروجن تعویض کړی دی.
- د الډهايډونو معمولي يا راډيکالي نوم اېنونه د هغوی د اړونده تيزابو نوکوم چې د هغه له ارجاع څخه دا الډهايډ لاس ته راغلي دي، اخېستل شوي ده، داسي چې د *acid* - کلمه په *aldehyde* او د اړوند تيزابونو د نوم *oic* وروستاړي په (۱۷) بدلېږي.
- د الډهايډ قطبي مالیکولونه د غیر قطبي مرکبونو په بنسټ چې د هغوی مالیکولي کتله یو له بل سره نژدې وي د الکولونو په استننا د ایشیدو لوړ ټکی لري.
- د الډهايډونو کیمیايي فعالیت له کیتونونو څخه توپیر لري؛ ځکه د الډهايډ د کاربونیل په گروپ کې د هايډروجنې او (π) اړیکې شتون د هغوي فعالیت ټیټ کړی دی چې د هايډروجن او نورو مرکبونو سره جمعي تعاملونه ترسره کولې شي.
- فارم الډهايډ هغه مایع ده چې عموماً له اوبو سره د محلول په بڼه د ژونديو موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض ورڅخه گټه اخېستل کېږي او د هغه 40% محلول د فارملین په نوم یاد شوی دی چې ټیټ استعمال لري، فارم الډهايډ د ساختماني موادو په صنعت او د کور په وسایلو کې کارول کېږي.
- د اسټیک اسید له ارجاع څخه اسټ الډهايډ او د هغه له اکسیدیشن څخه اسټون لاس ته راځي.
- خالص اسټ الډهايډ بې رنگه او زهري مایع ده چې په اوبو کې حلېږي، د ایشیدو ټکی يې 21°C دي. له اسټ الډهايډ څخه اسټیک اسید، ایتانول او مصنوعي ربړ لاس ته راوړي.
- د کیتونونو عمومي فورمول $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$ یا $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}\text{O}$ دی، هغه الډهايډونه او کیتونونه چې یو شان جمعي فورمول ولري، یو د بل ایزومیر دي.
- د لومړي الکولونو له اکسیدیشن څخه الډهايډ او دویمې الکولونو له اکسیدیشن څخه کیتون لاس ته راځي.
- اسټون د پروپانون اویا ډای میتایل کیتون په نوم هم یادوي. دا مرکب بې رنگه مایع ده چې تیزوری لري او الوتونکي ماده ده، په 56°C کې په ایشیدو راځي.
- دلرگيو د مجموعي تقطير له محصولاتو څخه، 0.5% يې اسټون دي چې کیدای شي هغه د تدریجي تقطير له امله جلا کړی شي.

د نهم خبر کي پوښتي څلور خوا به پوښتي

1. د کاربونیل د وظیفه يي گروپ فورمول ----- دی .
الف - (S=C) ، ب - (C=O) ، ج - (C-OH) ، د - (COOH)
2. د الډيهايد او HCN د جمعې تعامل محصول ----- دی .
الف - الډيهايد سينو هايډرين ، ب - سينو هايډرازين ، ج - الف او ب دواړه ، د - هيڅ يو
3. پارا اسيت الډيهايد کره پيز مرکب دی چي د تودوخې په واسطه ----- تبديليږي .
الف - فارم الډيهايد ، ب - اسيت الډيهايد ، ج - اسيتون ، د - اسيتيک اسيد
4.  د ----- فورمول دی .
الف - ډاي فينيل کيتون ، ب - نفتالين ، ج - انتراسين ، د - فينول
5. د غير متناظر کيتون د کنلستي تجزيې څخه ----- ډوله تيزابونه جوړيږي .
الف - دوه ، ب - څلور ، ج - يو ، د - دري
6. $\begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R} - \text{C} - \text{R}' \end{matrix}$ د ----- کيتون فورمول دی .
الف - متناظر ، ب - غير متناظر ، ج - الډيهايد ، د - اسيتون
7. $\begin{matrix} \text{O} & \text{O} \\ \parallel & \parallel \\ \text{CH}_2 & - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{H} \end{matrix}$ مرکب نوم ----- دی .
الف - 1-butenal ب - 3-butenal ج - تعامل محصول دی:
8. دفارميک اسيد او ډيو بل عضوي تيزاب د سون د تعامل محصول دی:
الف - CO_2 او H_2O ب - H_2O ، CO_2 و الډيهايد ج - $\text{H} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ د - $\text{R} - \text{C} = \text{O}$ ب او ج سم دي.
9. دگيرنارد معرف او الډيهايد دتعامل وروستي محصول دی :
الف - دوه يي الکول او Mg(OH)X ب - لومړني الکول Mg(OH)X ج - دريمي الکول او Mg(OH)X د - هيڅ يو .
10. دالډيهايد د فعاليت له امله شوي دي .
الف - دکاربونيل گروپ ب - د (π) ايکي ج - دکاربونيل په گروپ کي H او (π) ايکه د - داټول پورتنی .
11. د الډيهايدونو په نوم اېنسودنه کې د اړونده الکانونو دنوم پاي e توری په ----- مختاري باندي تعویص کېږي:
الف : one ب : al ج : ene د : ol
12. د $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_2 - \text{C}(=\text{O}) - \text{H}$ مرکب نوم عبارت دی له :
الف : فينيل ايتال ، ب : فينيل اسيت الډيهايد ج : الف او ب سم دي د : بنزالډيهايد .
13. د الکوکسي گروپ عبارت دی له :
الف - R-H ب - RO- ج - R-O-R د - O-

14. د الډيهايډونو ارجاع څخه کوم مواد حاصلېږي.



الف : الکان ، ب - الکلونه ج- لومړنی الکل د - کيتونونه

تشرېحي پوښتنې

1 - دا لاندي معادلې بشپړې کړئ:



2 - دلاندنيو الډيهايډونو او کيتونونو نوم IUPAC پر بنسټ تر سره کړئ:



3 - د لاندي الډيهايډونو جوړښتيز فورمولونه وليکئ:

الف - 4-nitrobenzen aldehyde ج- 2-methyl butanal ب- 3-butenal د- 3,3,3-trichloropropanal

4 - په STP شرايطو کې 2,464g د اکسيجن د يو الډيهايډ له 1,44g بړا سونو سره تعامل کړی دی ، د تعامل کوونکي الډيهايډ ماليکولي فورمول به کوم وي ؟ ($\text{H}=1\text{g/mol}$ $\text{C}=12\text{g/mol}$, $\text{O}=16\text{g/mol}$)

5 - کوم الکلونه بايد اکسيدي شي ، تر څو لاندي مرکبه حاصل شي؟

الف- form aldehyde ب methyl propanal ج 2-methyl butanal د- 2,2-dimethyl butanal .
کوم ساختماني فورمولونه د $\text{C}_3\text{H}_{10}\text{O}$ جمعې فورمول لرونکي کيتون ته ليکلي شو ؟ هغه رسم کړئ .

7 - که چېرې 0.2mol ديو کيتون له HCN سره تعامل کړی وي ، د دې کيتون فورمول به کوم وي ؟
8 - که چېرې د کيتون 0.2g د NaHSO_3 له مرکب سره تعامل کړی وي ، د کيتون ماليکولي کتله به کومه وي ؟ ($\text{H}=1\text{g/mol}$, $\text{O}=16\text{g/mol}$, $\text{C}=12\text{g/mol}$)

عضوي تيزابونه (کاربو کسلېک اسيد)



د عضوي مرکبونو د اکسيجن لرونکي مشتقانو څخه مهم يې کاربوکسلېک اسيدونه دي چې ددې مرکبونو په ترکيب کې د $\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ گروپ شتون لري، داگروپ د تيزابو د وظيفه يي گروپ په نوم هم يادېږي.


دعضوي تيزابو ؛ لکه ؛ د سرکې تيزاب ، دشيلو تيزاب او نورو سره اشنايي لري. د شحمياتو بنسټيز جز شحمي تيزاب دي . په دې څپرکي کې به د عضوي تيزابو په اړه معلومات لاس ته را وړئ او زده به کړي چې د تيزابونو طبيعي سرچينې کومې دي ؟ د انسانانو دروند په کومو اړخونو کې کارول کېږي ، کوم کيميايي فعاليتونه لري ؟

د دې څپرکي په زده کړې به پورتنیو پوښتنو او هغوي ته ورته پوښتنو ته به ځوابونه وړاکړئ.


1_10: عضوي تيزابونه

د کاربوکسیل گروپ (Group Carboxylic)

د کاربوکسیل گروپ (-C(=O)-OH) د کاربونیل او هایدروکسیل له گروپونو څخه جوړ شوی دی چې زیاتره د COOH - په بڼه لیکل کېږي؛ خو په هغه کې هېڅ کله د هایدروجن او د کاربن د اتومونو ترمنځ اړیکه شتون نه لري. داگروپ کولای شي چې د پروتون ورکونکي په توګه (Proton - Donator) عمل وکړي او د (COO^-) ایون چې د کاربوکسيلات په نوم یادېږي، بېلون ومومي. په دې انیون کې د اکسیجن دواړه اتومونه یو ډول ارزښت لري؛ ځکه په هغه کې د π الکترونونه د ریزونانس په حالت کې شتون لري:





ټول هغه مرکبه چې په خپل مالیکولي جوړښت کې د کاربوکسیل گروپ ولري، د کاربوکسیل اسید د مرکبونو په نوم یادېږي. د فارمیک اسید په مالیکول کې داړیکو ځانګړتیاوې چې لاندې لیکل شوي دي، د اکسیجن، هایدروجن او کاربن اتومونه چې په دې مرکب کې شتون لري، د بیلابیلو الکترونیکالوټي سره بې دوي مالیکول قطبي کړی دی: O



1_10: د عضوي تيزابونو نوم ايښودنه

1_1 د عضوي تيزابونو معمولي نوم ايښودنه: د عضوي تيزابونو معمولي نوم ايښودنه د اړوندو تيزابو د سرچينو له لائينو يا يوناني کلمو څخه اخيستل شوي ده؛ د بېلګې په ډول: Formica (Formica) د لائين نوم څخه اخيستل شوی دی چې د سرومېړيو دکالبرتونو (جسد ونو) له تقطير څخه لاس ته راوړل شوی دی، د اسيتيک اسید (acetic acid) نوم د سرکې له لائين نوم (butyrum) او د ستیاريک اسید (acetum) څخه اخيستل شوی دی. اسید (butyric acid) نوم د لائين نوم (butyrum) او د ستیاريک اسید (stearic acid) څخه اخيستل شوی دی. په همدې ترتيب ټول معمولي نومونه د اړوندو تيزابو د لاس ته راوړنې د سرچينې برښنې ايښودل شوي دي. که چيرې په داسې تيزابونو کې بېلابېلې معاضې شتون ولري؛ په دې صورت کې کاربنونه د کاربوکسیل له گروپ سره د اړیکو له کبله د يوناني ژبې په تورو، الفا (α)، بيتا (β)، گاما (γ)، ډلتا (δ) او نورو په ښه کوي، داسې چې د کاربوکسیل په گروپ پورې تړلی کاربن په الفا (α) او په نورو تورو ښودل کېږي؛ د بېلګې په ډول:





(1_10) جدول د لسو عضوي تيزابونو معمولي نمونه او د هغوی سرچینې

دکاربن شمیر	جوړښت	معمولي نوم	سرچینې
1	HCOOH	فارمیک اسید	میري (لایټن - فارمیک)
2	CH ₃ COOH	اسټیک اسید	سرکه (لایټن - اسټوم)
3	CH ₃ - CH ₂ - COOH	پروپیونیک اسید	شید، کوچ او خیدک
4	CH ₃ (CH ₂) ₂ COOH	بوتریک اسید	کوچ (لایټن - بوتیروم)
5	CH ₃ (CH ₂) ₃ COOH	والیریک اسید	سنبل د گل رېښه (لایټن - والیر)
6	CH ₃ (CH ₂) ₄ COOH	کپرویک اسید	اوزي (لایټن - کپر)
7	CH ₃ (CH ₂) ₅ COOH	اینان توییک اسید	د پیچک وړۍ (لایټن - اوینانت)
8	CH ₃ (CH ₂) ₆ COOH	کپریلک اسید	اوزي (لایټن - کپر)
9	CH ₃ (CH ₂) ₇ COOH	پیلارگونیک اسید	د شمعدانۍ گل (د افریقایي نبات)
10	CH ₃ (CH ₂) ₈ COOH	کیریک	بزها (لاتی - کپر)



2_ د IUPAC په لاره د تیزابونو نوم ایښودنه

د IUPAC په نوم ایښودنه کې اوږد زنځیر چې د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، ټاکل، موندل او نمبر وهل کیږي، نمبر وهل د کاربوکسیل ګروپ له کاربن څخه پیل کیږي. په نوم ایښودنه کې لومړی د معاوضو پورې تړلی اوږد کاربن نمبر او دهغه څخه وروسته د معاوضو نومونه لیکل کیږي، د نوم په پای کې د کاربوکسیل لرونکي اوږد زنځیر نوم لیکل کیږي. څرنګه چې د اوږد هایدروکاربن (الکان، الکین او الکاین) دنوم وروستی د C توري بې د oic - په وروستاړي تعویض او د اسید کلمه (acid) پرې ور زیاتېږي؛ د بیلګې په ډول:



که چېرې عضوي تیزابونه له یو کاربوکسیل ګروپ څخه ډیر په خپل مالیکولي ترکیب کې ولري، په دې

وروستاري ليکل کيږي، د اسيد کلمه پرې زياتيږي:




لاندې ټيزابي مرکبونه په معمولي اودايو کې په سيستماتيک لاره نوم ايښودنه وکړئ:




2_1_10: د عضوي تيزابونو فزيکي خواص

مسيح هيايدروا ربونو دري نومهي پور خيمه تيزابونه چې رحه ماتي ده او تيزابوني کړي، د مسيح هيايدروا ربونو يو قيمته تيزابونه چې د کاربن د ائومونو شمير يې له څلورو تر نهو (9) پورې وي، دکوچو او د بادامو د غوړيو بولي لري، له دې کبله چې مصنوعي کوچ او شيريني په زړه پورې بوري ولري؛ نو نوموړي تيزابونه په هغو کې ورزيات وي. دمسبوع هاييدرو کاربنونو تيزابونه چې له لسو څخه د کاربن ډېر ائومونه ولري، بې له بويه دي، هغه تيزابونه چې د 14 تر 22 د کاربن ائومونه په خپل ماليکولي ترکيب کې ولري، په حيواني او نباتي غوړيو کې موندل کېږي؛ نو له دې کبله دسحې تيزابونو په نوم ياديږي. څرنگه چې د عضوي تيزابونو د دوو ماليکولونو په منځ کې دوه هاييدروجنې ايکې شتون لري؛ نو د هغوي د ماليکولو په منځ کې د جنب قوه د نورو اکسيجن لرونکو مرکبونو پرتله چې د يوشان کتلې لرونکي وي، زياته ده؛ نو له دې کبله د هغوی د ايشيلو تلکې لوړ دی.



پہ اورو کی ہلیدورجنی ایکہ
پہ الکولونو کی ہلیدورجنی ایکہ
پہ عضوی تیزابونو کی ہلیدورجنی ایکہ




(1_10) شکل: د تیزاب د دوو مالیکولونو په منځ کې هایدروجنی اړیکه

(2_10) جدول د عضوي تیزابونو ځنې فزیکي خواص په اړه یو کي د هغوی حل


ایوپک نوم	معمولی نوم	فورمول	mp(°C)	bp(°C)	g/100mL په اوبه کې حل کېدل
Methanoic acid	Formic acid	HCOOH	8,5	100,5	په هر نسبت
Ethanoic acid	Acetic acid	CH ₃ COOH	16,6	118	په هر نسبت
Propanoic acid	Propionic acid	CH ₃ CH ₂ COOH	-12,5	141	په هر نسبت
Butanoic acid	n-butyric acid	CH ₃ (CH ₂) ₂ COOH	-8	164	په هر نسبت
Pentanoic acid	n-valeric acid	CH ₃ (CH ₂) ₃ COOH	-19	187	4,97
Hexanoic acid	Caproic acid	CH ₃ (CH ₂) ₄ COOH	-3	205	1,08
Heptanoic acid	Enanthic acid	CH ₃ (CH ₂) ₅ COOH	-10,5	223	0,26 لږ منحل
Propanoic acid benzenecarboxylic acid	Acrylic acid	CH ₂ =CHCOOH	-13	141	
2-hydroxybenzoic acid	Benzoic acid	C ₆ H ₅ COOH	122	250	0,34
	Salicylic acid		159	211	0,22
Ethanedioic acid	Oxalic acid	(COOH) ₂	189	149-160 قابل تصعید	15,00

عضوي تیزابونه د ارهنيوس له تیوري سره سم په اوبو کې حل کېږي چې په پایله کې یو تپه کېږي او دهغوی د تعادل عمومي معادله په لاندې ډول ده:





د تیزابونو د ایونایزیشن ثابت عبارت دی له :

$$K_a = \frac{[R-COO^-][H_3O^+]}{[R-COOH]}$$



(2_10) شکل: د عضوي تیزابونو او اوبو د مالیکولونو په منځ کې هایدروجنی اړیکه

فارمیک اسید له ټولو عضوي تیزابونو څخه د ایزوایزیشن جوړ لوړ ثابت لري:



د اسیتیک اسید د 0.5 molar محلول pH محاسبه کړئ، د هغه $K_a = 1.8 \cdot 10^{-5}$ دي.

10-1: د عضوي تیزابونو کیمیايي خواص


د عضوي تیزابو تعاملونه چې د هغوی تیزابي گروپ پورې اړه لري؛ په دوو میتودونو ترسره کېږي: یو دا چې د هایډروجن او اکسیجن ترمنځ اړیکه ($C-O$) پرې او پړوتون (H^+) تولیدېږي؛ بل دا چې د کاربن او اکسیجن ترمنځ اړیکه ($C=O$) پرې او $-OH$ تشکیلېږي.

1- د ($-O-H$) اړیکې د پریکړېدو په اړه تعاملونه

که چېرې د $-COOH$ د هایډروجن اټوم د H^+ ایون په پټه جلاشي، په پایله کې د مالګې ایون حاصلېږي چې د تیزاب دنوم $-oic$ وروستاږي په مالګې کې د $-ate$ په وروستاږي تعویض اود تیزابو کلمه په بشپړه توګه لري کېږي؛ دیلګې په ډول: (CH_3COO^-) ایون د اسیت په نوم یادېږي.

د مالګو جوړېدل

کاربوکسلیک اسیدونه له فعاله فلزونو سره تعامل کوي، په پایله کې مالګه جوړوي او H_2 جلاکېږي:



مثال:

په معیاري (سټنډرډ) شرایطو کې $24g$ ډمونواسید له مګنیزیم فلز سره تعامل کړي او $4.48L$ هایډروجن ګاز یې ازاد کړي دی، د کاربوکسلیک اسید مالیکولي فورمول به کوم وي؟

حل: د ازاد شوي هایډروجن مولونه پیدا کړو:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol } H_2 & - & 22.4L \\ n & - & 4.48L \\ n = \frac{1 \text{ mol} \cdot 4.48L}{22.4L} & = & 0.2 \text{ mol} \end{array}$$





د تعامل معادله په لاندې ډول ده:


$$\begin{array}{ccc} 2mol & - & 1mol H_2 \\ & & n = \frac{0.2mol \cdot 2mol}{1mol} = 0.4mol \\ n & - & 0.2mol \end{array}$$

$$M = \frac{m}{n} = \frac{24g}{0.4mol}$$

څرنگه $n = \frac{m}{M}$ دي؛ نو لرو چې:

$$M = 60 g/mol$$

نو ددې تیزاب فورمول عبارت دی له:




$$14n = 60 - 46 = 14 \quad n = \frac{14}{14} = 1$$

نو د تیزاب فورمول CH_3COOH دی.



د عضوي تیزابونو د خټې کیدو تعاملونه:

کاربوکسیلیک اسیدونه د غیر عضوي تیزابونو په شان له القلیو سره تعامل کوي چې په پایله کې مالګه او اوبه جوړېږي؛ دا چې عضوي تیزابونه ضعیفه دي؛ نو د مالګې او اوبو محلول یې د القلیو خواص لري؛ ځکه په اوبو کې هایدرولیز کېږي، چې ضعیف تیزاب او قوي القلي جوړوي:




Oxalic acid

Potassium Oxalate

مشتق او تمرین وکړئ

د لاندې تعاملونو معادلې بشپړې کړئ:




2_د C-O-C اړیکې د پرې کیدو پر بنسټ د تیزابونو تعاملونه

که چېرې هایدروکسیل ګروپ (OH-) له کاربوکسیل ګروپ (C(=O)-OH-) څخه جلاشي، د هغه پاتې شوني د اسید ګروپ (C(=O)-R) په نوم یادېږي، د کاربوکسیل له ګروپ څخه OH- ګروپ جلاکیدل د بیلابیلو ګروپونو د منځ ته راتلو لامل کېږي.

د اسید انهایدرايد جوړيدل


که چيري عضوي تيزابونه دي هايډریشن شي، اسيد انهایدرايدونه جوړېږي. د اسيد انهایدرايد وظيفوي گروپ



ايسټر فيکشن (د ايسټر جوړونه)

د ايسټر فيکشن په تعامل کې د تيزابونو د $-\text{OH}$ گروپ د الکلونو له H^+ گروپ سره اوبه جوړوي او د اسيد گروپ

($\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\backslash$) د الکوکسايډ گروپ ($\text{R}-\text{O}-$) سره ايسټر توليد وي. دا تعامل د سلفوريک اسيد په شتون کې د کنټسټ په توگه ترسره کېږي:




فعاليت

کوم تيزاب او کوم الکل يو له بل سره تعامل وکړي ترڅو چې لاندي ايسټرونه جوړشي؟

- $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{C}_4\text{H}_9$
- $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$


د عضوي تيزابونو د ريډکشن تعاملونه

دغښتلو کلسټونو، لکه: LiAlH_4 يا NaBH_4 په شتون کې، د تيزابونو دکاربوکسيل گروپ ارجاع او په الکلونو تبديليږي:




1- دلو مڙنيو الڪو لو له اڪسيديشن خخه

د اکسيل انټويه توگه کارول کيږي:




پہ ھمدي ترتيب د لږو اڪسيد انٽو نو په شتون كي ، بنزاييل الكول په بنزويڪ اسيد بدليري:




2_ د الکینونو له اکسیدیشن څخه د تیزابونو لاس ته راوړنه

که چیري اکینونه د $KMnO_4$ له القلي تود محلول سره یو ځای شي ، د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کیري چې د اکینونو زنځیر د جوړه اړیکو په برخه کې پرې او په پایله کې دعضوي تیزابو دوه مالیکوله لاس ته




3- دگرښار د ښوونکي دکارښښن له امله د عضوي تیزابونو لاسته راوړنه

د کاربو کسلیک اسید ونو دلأس ته راوړنې له میتوډونو څخه یو ښه میتوډ د ګرینارډ ډېنورنکي تعامل د کاربن ډای اکساید سره دي چې د هغوي د تعامل معادله په لاندې ډول ده:




د سرکې تیزاب کېدای شي ، داسې لاس ته راوړل شي:



4_ دکابو کسلیک اسید د مشتقاتو دهایدرو لیز په واسطه دکابو کسلیک اسید لاس ته راوړنه

ایسترونه دتیزايي کتلستونو په شتون کې هایدرو لیز کيږي چې په پایله کې الکول او عضوي تیزاب لاس ته راځي:



ګړنه(عملیه)

لاندې تعامل کونکي مواد او دهنوی د تعامل محصولونه ذکر شوي دي: تا سې بې کیمیایي معادلې ولیکئ او هغه کتلست مواد چې تعامل دجکتیا لامل ګرځي، وټاکئ:

- a) $n - \text{pentanol} \longrightarrow n - \text{pentanoic acid}$
- b) $\text{cyclopentan} \longrightarrow 1,5 - \text{cyclopentanedicarboxylic acid}$
- c) $1,4 - \text{dibromobutane} \longrightarrow 1,4 - \text{hexanedioic acid}$
- d) $\text{ethyl formate} \longrightarrow \text{fumaric acid}$

2_10: ځینې مهم کاربوکسلیک اسید 1_ فارمیک اسید

د فارمیک اسید ساختماني فورمول ($\text{H} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OH}$) دی چې ډیر ساده کاربوکسلیک اسید دی، د ډیر و حشر و په لیښه (نیش) او زهر وړونکې شتون لري، په ځانګړې توګه په مچپو او مېږانو کې شتون لري. دهغې نوم هم دمیږي د لاتین نوم (farnica) څخه اخېستل شوی دی.



(3_10) شکل: مچي د فارمیک اسید سرچینه

فزیکي خواص يې:



فارمیک اسید په اوبو کې ښه حل کېږي اوپه هایدروکاربنونو کې لږ حلېږي، په اوبلنو محلولونو کې به اېوزنو توپه کېږي:



فارمیک اسید یوه بې رنگه مایع ده، تیزه، لوگی کوونکی او تخریب کوونکې دی چې د ایشیدونکې بې 100°C دي.

کیمیاوي خواص يې

که چېرې د فارمیک اسید جوړښت $\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$ ته په څیر سړه وکتل شي، په اسانۍ سره به پوره شو چې په رښتیا فارم الډیهاید له دوو وظیفه یي ګروپونو له الډیهاید ($\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$) او کاربونیل ($-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}$) ګروپ څخه چې یو له بل سره یوځای شوي، جوړ دي پُر دي بنسټ فارمیک اسید او دهغه مالګې د نورو کاربوکسلیک اسیدونو او دهغو مالګو پرتله په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي، په لومړي پړاو کې بې ثباته کاربونیک اسید لاس ته راځي او بیا هم په CO_2 او H_2O تجربه کېږي:



unstable intermediate


(د منځ ګلوي ثبات نه لرونکې حالت)

که چېرې د ګوګرو تیزاب د کتلست په توګه وکارول شي، په ټیټه تودوخه کې فارمیک اسید په CO او اوبو تجزیه کېږي:




د فارمیک اسید لاس ته راوړنه

1- په ډیره کچه فارمیک اسید د فارم الډیهاید له اکسیدیشن څخه لاس ته راوړي:




2- په صنعت کې په لومړي سر کې د لوړ فشار او لوړې تودوخې په شتون کې د فارمیک اسید مالګه د CO او NaOH د تعامل په واسطه لاس ته راوړي، بیا وروسته دا مالګه له H_2SO_4 یا H_3PO_4 سره تعامل وړکوي، په پایله کې فارمیک اسید لاس ته راځي:





3- په لابرټوار و نوکي فارمیک اسید د اګزالیګ اسید له او بلن محلول ته د تودوخې ورکولو په واسطه د گلیسرینو په شتون کې لاسته راوړي:



فعالیت




د فارمیک اسید لاس ته راوړنه:

د اړتیاوړ مواد او سامان: بالون، ترمامتر، کانلنسر، له پاڼې سره ستیند، اېرلین مالیر، اګزالیګ

اسید، گلیسرین او لویه.

ګډنلاره:

د اګزالیګ اسید د محلول یو ټاکلی مقدار په یو بالون کې واچوئ، هغه له (10-4) شکل سره سم په ستیند کې ټینګ کوئ، د بالون خوله د دوو سوږیو لرونکو کار کې سرپوښ په واسطه وتړئ، د سرپوښ په یو سوږی کې ترمامتر او په بل سوږی کې یې زنگون کوږي تل کیږدئ (زانوخم)، دا تل له کانلنسر سره وتړئ، له کانلنسر وتونکي تل د اېرلین مالیر په خولې کې د تعامل د محصولو د تړلو لپاره کیږدئ، وروسته د بالون د ننه محتویاتو ته تودوخه ورکړئ، په دې کرڼه خپلې لېدنې او د تعامل معادله یې ولیکئ.



شکل (4-10): د فارمیک لاس ته راوړنه

د فارمیک اسید په کارول

فارمیک اسید د الډیهایډ ونو په شان د عفوني ضد (بډیوي ضد) ښه خواص لري، د هغه لږه کچه په شاتلو (عسل) کې شتون لري چې د هغه له خوسا کېدو او ورستیدلو څخه مخنیوی کوي. له فارمیک اسید څخه د حیواناتو د جسدونو (کالپوتونو) په ساتلو او د څرمي په صنعت کې ګټه اخیستل کېږي چې په عمومي ډول فارمیک اسید د سرواویلاستیک د تولید د لومړنیو موادو په توګه په کارول کېږي.

2- اسیتیک اسید

د اسیتیک اسید جوړښتنیز فورمول $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OH}$ دی چې له عضوي مهمو تیزابونو څخه شمیرل کېږي. په سرکې کې په 6-4 غلظت شته دی، سرکې خوند او بوی لري. دهغه نوم هم سرکې له لاتین نوم (acetum) څخه اخیستل شوی دی. په 16.7°C تودوخه کې جامد حالت لري او دپخ په بڼه لیدل کېږي؛ نو له دې کبله د سرکې جامد تیزاب د جامد ایتانویک اسید په نوم یادشوی دی.


د اسیتیک اسید فزیکي خواص:

د سرکې خالص تیزاب بې رنگه کرسټلونه لري، د تودوخې 16.7°C کې ویلي کېږي او د تودوخې په 118°C کې په ایشیلو راځي، په اوبو کې حل کېږي؛ دایونایزیشن درجه یې ډېره ښکته ده چې 3% په شاوخوا کې ده:



د اسیتیک اسید کیمیاوي خواص

اسیتیک اسید د نورو عضوي تیزابو په شان تیزابي خواص ښيي، د فلزونو او القلیو سره تعامل کوي چې مالګه جوړوي؛ د بیلګې په ډول: له سوډیم سره له لاندې معادلې سره سم تعامل کوي د سوډیم اسیتات مالګه جوړوي:




د اسیتیک اسید لاس ته راوړنه

1- اسیتیک اسید کیدای شي چې د انزایم په شتون کې د ایتانول د کلسټي اکسیدیشن څخه لاس ته راوړل شي، د سرکې تیزاب د انګورو او دمنو د میو د اوبو څخه هم په لاس راوړل کېږي چې هغه ته د طبیعي سرکې تیزاب وایي:




2- د سرکې تیزاب د فارمیګ اسید پر خلاف په اسانۍ نه اکسیدایز کېږي؛ نو په دې بنسټ د اسیتات مالګې ته د H_2SO_4 سره تعامل ورکوي او اسیتیک اسید لاس ته راوړي. په پخوانیو وختونو کې اسیتیک اسید یې له لوګرو څخه داسې لاس ته راوړه چې لرګي یې د هوا په نه شتوالي کې په مایع تبدیلول، د لوګرو په مایع کې شامل اسیتیک اسید یې د CaO په واسطه په $(\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{O})_2\text{Ca}$ تبدیلول، دې کړنې څخه وروسته به یې جلا کول، لاس ته راغلي اسیتات مالګې ته به یې تودوخه ورکوله او له لاندې شکل سره سم به یې په اسیتیک اسید تبدیلوله:




شکل: د تودوخې په واسطه له سوډیم اسیتات څخه د اسیتیک اسید لاس ته راوړنه (5-10)

په دې تعامل کې میتانول او اسیټون هم تولیدیږي چې هغوی براس کېږي. د H_2SO_4 په زیاتوالي سره 99.5% په سرکې خالص تیزاب لاس ته راوړي:



3- په صنعت کې د سرکې تیزاب داسې لاس ته راوړي چې اسیټلین باندې اوبه اچوي او په پایله کې اسیټلین اکسیدایز کېږي او اسیټیک اسید جوړیږي:



مشق او تمرین وکړئ
په معیاري (سټنډرډ) شرایطو کې څومره د هایدروجن گاز د 150g اسیټیک اسید له 18% محلول څخه چې له مگنیزیم سره تعامل وکړي ، لاس ته راشي؟


د اسیټیک اسید کارول

د سرکې تیزاب د مومو ، کنډو اوتیلو ښه محلول دي . له هغو د مالګو څخه ارزښت لرونکي عضوي مرکبه تر لاسه کېږي ؛ دیلګې په ډول : میټان له سودیم اسیټیت څخه او اسیټون له کلسیم اسیټیت څخه لاس ته راوړل کېږي. المونیم اسیټیت د رنګونو د جلا وړکونکو موادو په توګه ، د کاغذ د جلا لپاره ، د ټوکرانو د جلا لپاره اوبه دوا جوړونه کې د انټي سټیک مادي او د اسهال ضد دوا په توګه کارول کېږي. سلولوز اسیټیت چې د سرکې د تیزابو له مشتقاتو څخه دي ، د لاکو ، نه مایډونکو ښینو ، د غوړیو درنګونو او د تارونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي؛ په همدې توګه د ربړ جوړونې لومړني مواد هم دي.

3- اګزالیک اسید (Oxalic acid)


اګزالیک اسید د تنباکو په پلټو ، رومي باندجانو ، نعنای او مارچوبه کې پیدا کېږي ، دهغه نوم هم د رومي باندجان له لایتین نوم (Oxalic) څخه اخیستل شوی دي.

اګزالیک اسید سپینه بلوري جامده ماده ده چې په $157^\circ C$ الوړي ، دامرکب زهري دي او دهغه کلسمي مالګه په پختوړو کې رسوب کوي. د کیمیايي خواصو له کبله دوه قیمته عضوي فعال تیزاب دي ، دامرکب سودیم فارمیت ته د تودوخې ورکولو په واسطه لاس ته راځي.




4_ مالونیک اسید (Malonic acid)

ملونیک اسید یې لومړی ځل د ملیک اسید (د مڼې تیزاب) له اکسیدیشن څخه لاس ته راوړي دي؛ نو ځکه یې نوم د همدې تیزاب له نامه څخه اخیستل شوی دی، د امریک پرته له رنگه مایع ده او په 136°C کې په ایشیدو راځي، په اوبو او الکولو کې حل کېږي، که چېرې له 140°C تودوخې څخه زیاته تودوخه ورکړل شي، استیک اسید ورڅخه لاس ته راځي:



که چېرې سیانو استیک اسید هایدرولیز شي، ملونیک اسید لاس ته راځي:



سیانو استیک اسید مالونیک اسید

5_ شحمي تیزابونه

د شحمي اسیدونو لومړی مرکب، یوئاریک اسید دی چې دکاربن څلور اتومونه لري او د هغه فورمول $(\text{C}_4\text{H}_7 - \text{COOH})$ دی شحمي اسیدونه په مشوع او غیر مشوع ویشل شوي دي:

الف_ مشوع شحمي تیزابونه

1_ پالمیتیک اسید $(\text{C}_{15}\text{H}_{31} - \text{COOH})$

پالمیتیک اسید سپینه بلوري جامده ماده ده چې په 63°C کې ویلې کېږي، د حیواني وازدې او نباتي تیلو څخه لاس ته راځي په اوبو کې نه حلېږي، په الکولو او ایټروکي حل کېږي.



(6-10)، شکل: شمع د ستیاریک او پالمیتیک اسید مخلوط - نارال د پالمیتیک اسید سرچینه

2_ ستیاریک اسید $(\text{C}_{17}\text{H}_{35} - \text{COOH})$

ستیاریک اسید (Stearic acid) کرسټي جامد حالت لري چې د هغه د ویلې کیدو درجه 70°C ده، په تودو الکولو او عادي ایټرونو کې حلېږي، د شحمي معمولي تیزابونو له ډلې څخه دي، په حیواني او نباتي شحمي گلیسریدونو کې شتون لري. پالمیتیک اسید او ستیاریک اسید یو له بل سره په جامده بڼه


گلډوي او شمع لاس ته راوړي.

ب_ غیر مشبوع شحمي تیزابونه:

د شحمیاتو په مالیکولونو کې د کاربن - کاربن دانومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه شته ده چې دا ډول شحمیات دمایع حالت لرونکي دي او له مشبوع شحمیاتو څخه بې ثباته دي چې د هایدروجنېشن په واسطه په جامد و مومو بدلېږي ، دا ډول شحمیات له غیر مشبوع شحمي اسید ونو څخه لاس ته راځي چې لاندې مطالعه کېږي:

اولییک اسید: $(C_{17}H_{33} - COOH)$

اولییک اسید په خالص ډول د ګلیسریدونو په شکل د زیتون ، بادام ، پنبه دانې او لمرګل په تیلو کې پیدا کېږي چې په مایع حالت کې پرته له رنګه ، بې بوږه او بې خوندۍ په $13^{\circ}C$ کې ویلې کېږي ، د ټول شحمي تیزابونو $\frac{1}{3}$ برخه چې د غوا په شورو ، رنګونو ، د مینځلو موادو او نورو کې شتون لري ، د ستیاریک اسید د ارجاع څخه تشکیل شوي دي:



د لسم څپرکي لنډيز

- عضوي مرکبونو له اکسیجن لرونکي مشتاتو څخه مهم مشتونه له کاربوکسیلیک اسیدونو څخه عبارت دي چې د دې مرکبونو په ترکیب کې د کاربوکسیل وظیفه یي ګروپ $\begin{matrix} O \\ || \\ C - OH \end{matrix}$ شتون لري.
- د مشبوع هایدروکاربونو درې لومړي یو قیمتۍ تیزابونه بې رنګه مایع ده او تیزوی لري ، د مشبوع هایدروکاربونو یو قیمتۍ تیزابونه چې د کاربن دانومونو شمیر له څلورو څخه تر (9) پورې وي ، د کوچنیو بادامو د غوړونو بڼه لري.
- د عضوي تیزابونو تعاملونه چې د هغوی تیزابي ګروپ پورې اړه لري ، په دوو میتودونو ترسره کېږي: یو دا چې د هایدروجن او اکسیجن تر منځ اړیکه $(C - O - H)$ پرې او پروتون (H^+) تولید کېږي؛ بل دا چې د کاربن او اکسیجن ترمنځ اړیکه $(C - O)$ پرې او $OH -$ تشکیلېږي:
- که چېرې لومړني الکولونه اکسیدېشن شي ، الیهاید او د الیهاید له اکسیدېشن څخه عضوي تیزابونه لاس ته راځي.

- د استریفیکېشن په تعامل کې د تیزابونو د $OH -$ ګروپ د الکولونو د H^+ ګروپ سره اړینه جوړوي او د اسایل ګروپ $(R - C -)$ د الکوکساید ګروپ $(R - O -)$ سره ایستر تولید وي.
- فارمیک اسید د الیهاید ونو په شان د عفوني ضد (بابوی ضد) بڼه خواص لري ، د هغه لږه کچه په شاتو (عسل) کې شتون لري چې د هغه له خوسا کېدو او ورسیدلو څخه مخنیوی کوي.
- فارمیک اسید د الیهاید ونو په شان د عفوني ضد (بابوی ضد) بڼه خواص لري ، د هغه لږه کچه په شاتو (عسل) کې شتون لري چې د هغه له خوسا کېدو او ورسیدلو څخه مخنیوی کوي . له فارمیک اسید څخه د حیواناتو د جسدونو (کالبرتونو) په ساتلو او د څرنمې په صنعت کې ګټه اخېستل کېږي .
- د سرکې تیزاب د مومو ، کنډو او تیلو بڼه محصل دي . د هغه له مالګو څخه ارزښت لرونکي عضوي مرکبونه



تر لاسه کيږي.


- د شحمي اسيدونو لومړۍ مرکب، بيوتاريک اسيد دي چې دکاربن څلور اتومونه لري او د هغه فورمول ($C_4H_7 - COOH$) دی شحمي اسيدونه په مشبوع او غير مشبوع ورشل شوي دي:

د اسم خپرکي پوښتي:

څلور خوا به پوښتي:


- 1- د عضوي تيزابونو د ماليکولونو په منځ کې هايډروجنې اړيکه د الکلونو په نسبت ده
- 2- الف_ کلکه ب_ سسته ج_ يوشان د_ هيڅ يو.
- 3- لاندې کوم فورمول به کاربوکسيلک اسيد ولري ؟ که چېرې د هغه په جوړښت کې %40.68 کاربن ، %54.234 اکسيجن او %5.06 هايډروجن شتون ولري ؟
- الف_ $HCOOH$ ب_ CH_3COOH ج_ $HOOC(CH_2)_2COOH$ د_ $COOH$
- 4- د $CH_3 - CH - CH - CH - COOH$ مرکب سم نوم عبارت دی له:

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ NH_2 \end{array} OH$$
- الف_ $1,2 - dihydroxy - 3 - a min o - 4 - methylpentan ol$
- ب_ $2 - hydroxy - 3 - a min o - 4 - methylpentan oicacide$
- ج_ $1 - hydroxy - 2 - a min o - 3 - methylpentan oicacide$
- د_ $1,2 - dihydroxy - 3 - a min o - 4 - methylpentan oicacide$
- 5- دفارميک اسيد $10^{-2} m$ محلول د کوم pH لرونکي دی ؟ $K_a = 10^{-4}$
- الف_ 2 ب_ 3 ج_ 4 د_ 5
- 6- له لاندې مرکبونو څخه د کوم يو د ايشيدونکي لوړ دي ؟
- الف_ CH_3CH_2COOH ب_ $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ ج_ CH_3CH_2COOH
- د_ $HOOC - CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
- 7- له لاندې مرکبونو څخه کوم يو کيتو اسيد دی ؟
- الف_ $HO - C = OOH$ ب_ $HO - C - OH$ ج_ $O = C - OH$ د_ $CH_3 - C - OH$
- 8- لاندی کوم کيت دايستر ماليکولي کتله را ښيي ؟ که چېرې د هغی په جوړېدو کې 60g کاربوکسيلک اسيد او 46g الکلو تعامل کړي وي:
- الف_ 60 ب_ 124 ج_ 106 د_ 98
- 9- دلاندی تعاملونو څخه کوم يو د ايسترفيکيشن تعاملو له ډلې څخه دي ؟



الف- لومړي تعامل ب- دوهم تعامل ج- دریم تعامل د- هېڅ یو.

10- د *2,2-dimethylpropanoic acid* فورمول عبارت دی له:




تشریحي پوښتنې:

- 1- د $C_3H_{10}O_2$ فورمول لرونکي دکاربو کسلیک اسید نوم، جوړښت، فورمول او ټولې ایزومیري ولیکئ.
- 2- دکاربو کسلیک د اسیدونو عمومي فارمول کوم دی؟ دکاربو کسلیک اسید، الډیهایډ او کیتون ترمنځ توپیرونه ولیکئ.

3- دلاندې تیزابونو د IUPAC نومونه او دهغوی فورمولونه ولیکئ:

الف- *Malonic acid* ب- *Adipic acid* ج- *Oxalic acid*

4- د بنزوئیک اسید د تعامل معادله دلاندې موادو سره ولیکئ:



5- دلاندې عضوی تیزابونو مالیکولې او د جوړښت فورمولونه ولیکئ:

الف- *2-oxypropanoic acid* ب- *2,3-dimethylbutanoic acid*

ج- *2-amin o-4-bromopentan oic acid*

6- شحمی تیزابونه څه شی دی؟ ولې په دې نوم یادېږي؟ روښانه یې کړئ.


7- له لاندې تیزابونو څخه کوم یو د شحمي تیزابونو له ډلې څخه دي؟ معلومات وړاندې کړئ.



8- دکاربو کسلیک اسید د یو اساسه تیزاب په ترکیب کې %55.8 کاربن، %7 هایدروجن او %37.2 اکسیجن شته دی، د دې تیزاب فورمول ولیکئ.

9- توضیح کړئ چې ولې کاربو کسلیک اسیدونه په اوبو کې له الکولونو څخه ډیر زیات حل کېږي؟

10- دلاندینو اسیدونو نومونه د IUPAC په میتود ولیکئ:




امینونه Amines




د هایدروکاربنونو د اکسیجن لرونکو مشتقاتو سرېره د دې مرکبونو نور مشتقات هم شته چې د هغوی له ډلې څخه نایټروجنې مشتقات دي، د هایدروکاربنونو نایټروجن لرونکو مشتقاتو تر څنګه د هغوی یو ډول بې امینونونه دي چې د امین ډګروپ لرونکي دي او د امونیايي مشتقاتو په نوم هم یادېږي؛ یعنې د NH_3 یو، دوه یا درې د هایدروجن اتومونه د هایدرو کاربنونو د ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي او یا دا چې د هایدرو کاربنونو د هایدروجنونو یو یا څو اتومونه د امین ډګروپ په واسطه تعویض شوي دي. په دې څپرکي کې به د امینونو په اړه معلومات تر لاسه کړی او زده به یې کړئ چې امینونه له کوم ډول مرکبونو څخه دي او د کومو خواصو لرونکي دي؟ څرنگه کیدای شي چې هغوي لاس ته راوړل شي او دهغوی طبعي سرچینې کوم مواد دي؟ په کومو حیاتي او صنعتي برخو کې کارول کېږي؟

1_11: د امینونو جوړښت او ډلبندي

دامینونو وظیفوي گروپ NH_2 دی چې د امینو د گروپ Amino په نوم یادېږي ، د دې گروپ د نایټروجن اټوم د SP^3 هایدربډ حالت لري چې دکاربن یو اټوم د یو یا څو اټومونو سره اړیکې لري ، که چېرې د څو عضوي معاضو سره اړیکې ولري ، د امینونو ټولنه ټاکل کېږي چې د لومړني، دویمي او دریمي امینونو په نامه یادېږي ، لومړني امینونه هغه امینونه دي چې د امونیا د نایټروجن اټوم د هایدروکاربنونو د کاربن له یوه اټوم سره اړیکه لري. دویمي امینونه له هغو امینونو څخه عبارت دي چې د امونیا د نایټروجن اټوم د هایدروکاربنونو له دوو گروپونو سره اړیکه لري. دریمي امینونه هغه امینونه دي چې دهغوی د امونیا د نایټروجن اټوم د هایدروکاربنونو له درې اټومونو سره اړیکې لري، د امینونو عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي:




R کېدای شي چې د الکایل یا اریل پاتې شوني وي؛ د امینونو ډلو بیلگې په لاندې ډول دي:




(1_11) شکل د امونیا مودل ، لومړني ، دویمي او دریمي ، امینونه (د کینې نه ښي لورته)

عضوي راډیکالونه چې د امینونو په جوړښت کې د نایټروجن له اټوم سره اړیکه لري، خلورمخیزو ته نژدې جوړښت لري؛ ځکه د خلور مخیزو جوړښتیو زاویه 109.5° اود امونیا زاویه 107.3° ده، د امینونو مالیکول د هندسي هرم (pyramid) جوړښت لري :





(2_11) شکل د امونیا جوړښت

که چیري د امین گروپ د مشبوع او یا غیر مشبوع زنجیري هایدروکاربنونو د کاربن د اتومونو هایدروجن اتومونه تعویض کړي، دا ډول امینونه د الیفاتیک په نوم او که د اروماتو له کربو سره اړیکه ولري، د اروماتیکو امینونو په نوم یادېږي.




مثال: د لاندې مرکبونو د جوړښت فورمولونه ولیکئ:

الف - dimethyl ethyl amine ب - 2-amino pentane ج - 1,4-butanediol د - 4,4-diamino




اضافي معلومات:

هتروسکلیت امینونه هم شته چې په کاربن کې نایټروجن شامل دي او مهم مرکبونه دي، دوی عبارت له پائیرولین، پائیرولین او پائیرولونو څخه دي چې دهمغوی دجوړښت فورمولونه عبارت دي له:



مورفین، کوکائین او نیکوټین د امینونو ډولونه دي چې په کوکائرو (افین) او تنباکو کې شته چې د همغوي دجوړښت فورمولونه په لاندې ډول دي:



د 500 ډولونه شاوخواکې بیالوژیکي الکولو ییدونه (Alkaloid) پیژندل شوي دي چې د مورفین اصلي الکولویډ په افین کې شته ، نایتروجن لرونکي مرکب الکولویډ القلي دي ،له دې مرکب څخه پخوا به د درد د ارامولو لپاره کار اخیستل کیده او د درد د ارامولو ساده مرکب دی چې پرته د بې هوښۍ د مریض درد دغلي کولو لامل گرځي ، د امریکا د خپل منځي جنګونو په بهیر کې د زخمیانو د دردونو د تسکین لپاره له مورفین څخه ګټه اخیستل کیده. مورفین ځینې نورې ستونزې را منځ ته کوي او د وینې فشار ټیټوي چې د ناروغانو دمرېنې لامل گرځي او هم د روږدېدلو لامل گرځي؛ له دې کبله دهغه د ځینو نورو ستونزو د لېوالتیا په عرض له هغه څخه هیروین لاس ته راوړل کیږي چې هروین ځینې نورې ستونزې لري؛ خو خطرناک روږدي کونکي دي چې دهغوی پېښودل د روږدو وګړو لپاره ستونزمن دي.

کوکاین او نور نشه راوړونکي توکي ټول نایتروجن لرونکي مرکبونه دي .



شکل (3_11) کوکار د مورفین او هیروین سرچینه

1_1_11: د امینونو نوم ایښودنه

خرنگه چې په تیرو لوستونو کې وړاندې شول، امینونه دکاربن د اتومونو دزنجیر له کبله او دهغوی اړیکه د نایتروجن له انوم سره په درې ډولو ویشل شوي چې لومړني امین ($R-NH_2$) ، دویمي امین ($R-NH-R$) او دریمي امین ($R-N(R)-R$) دي ، د امینونو څلورم ډول دجهمي ایون به ښه $[R_4N]^+$ دي چې دهغوی بیلګې کیدای شي تترا میتایل امونیم ($[CH_3)_4N]^+$ Tetramethyl amonium)) وړاندې شي، د R پاتې شوني کیدای شي الثایک ،سکلیک او یا اروماتیک وي.

د امینونو په نوم ایښودنه کې په نایتروجن باندې نښتي پاتې شوني د yl له وروستیاړي سره د نوم پیل کې دهغوی د

نوم د لومړي توري د انگرېزي ژبې دالفبا دمخکيوالي په پام کې نيولو سره سم ليکل کيږي او بيا وروسته د امين (amine) کلمه ورزياتيږي ، د بيلگې په ډول:

د $C_2H_5)_2N-C_3H_7$ جمعې فورمول لرونکي مرکب نوم چې دهغه دجوړښت فورمول په لاندې ډول دي ، داسې ليکل کيږي :

$$CH_3-CH_2-\bar{N}-CH_2-CH_3$$

$$CH_2-CH_2-CH_3$$

Di ethyl propylamine


په ځينو برخو کې د امينو نو په نوم ايښودنه کې کيدای شي چې د مرکبونو د ماليکول د کاربن د اتومونو نمبر وهنه ترسره شي ؛ د بيلگې په ډول :

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-\overset{1}{\underset{|}{CH}}-NH_2$$

$$CH_3$$

1-Methyl. 1- Pentyl amine


لومړني امينه د ايوپک IUPAC په سيستم کې په دوو طريقو نوم ايښودنه کيږي چې له الکاليل امين (alkylamine) او الکالان امين (alkanamine) څخه عبارت دي ، د بيلگې په ډول:



CH_3
 2-methyl propyl amine

ځيل خان ازماينيت کړئ

د لاندې مرکبونو نوم ايښودنه ترسره کړئ:



د دويمې او دريمې امينو نو نوم ايښودنه داسې ترسره کيږي چې د الکالان اوږد زنځير د اصلي زنځير په توگه او الکاليل منل کيږي او نورې پاتې شوني چې له نايټروجن سره اړيکې لري ، د معاضو په توگه منل شوي دي او داسې نوم ايښودنه يې ترسره کيږي چې د نايټروجن سمبول (N) د معاضو د نوم له يادوني څخه مخکې ليکل کيږي، د نايټروجن دسمبول اومعاضود نوم پر منځ کې د(-) علامه ليکي ، که چيرې د واره معاضې

یوشان وي؛ نو په دې صورت کې $N-N$ او ددلی کلمه چې د دوو په معنا ده، دمعاوزمو د نوم څخه مخکې لیکل کېږي او دهغه د نوم د e توری یې د $amine$ په کلمې تعوضیږي، کله چې اوږد (اصلي) زنځیر خو معاوضې و لري؛ یعنې ښاخ لرونکی وي، د اړوندو هایدروکاربنونو اوږد زنځیر نمبر وهل کېږي او نمبر وهل د امین ($amine$) د گروپ لرونکي کاربن څخه پیل کېږي، د هایدروکاربن د نوم او له امین د کلمې څخه تر مخه دمعاوزمو نوم او دهغوي د اړونده کاربن نمبر لیکل کېږي:




$N-N$ - dimethyl ethanamine N - methyl - 2 - methyl propanamine




N - methyl - N - phenyl - 3 - methylbutanamine $N-N$ - diethylamine

ځان وازمويئ

دلاندې مرکبونو نومونه وليکئ:




که چېرې د NH_2 - گروپ د نورو وظیفوي گروپونو؛ لکه: د الکولو نو، الیهایدونو، اسیدونو او داسې نورو وظیفه یي گروپونو سره په یوه هایدروکاربن مرکب کې شتون ولري، په دې صورت کې ددې گروپ نوم د اړوند کاربن له نمبر سره د امینو $amino$ په نامه یاد او د اړوندو الکولو، الیهایدونو او تیرابو نو د نومونو په سر کې لیکل کېږي:



خپل ځان وازمويئ

د لاندینو مرکبونو نوم ایښودنه وکړئ:







2_1_1: د امينو نو فزيکي خواص

هغه امينو نه چې کوچنې مالیکولي کتنه لري (میتال امین، ډای میتال امین، ترای میتال امین او ټیتال امین) د گاز په حالت موندل کېږي، امینونه چې د کاربن د ډیر شمیر انومونولرونکي دي، تر $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NH}_2$ پورې د مایع په حالت موندل کېږي او له $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NH}_2$ مرکب څخه لوړ د کاربن د انومونولرونکي امینونه جامد حالت لري. د کوچنیو امینونو بوی امونیا او خوسا شو کبانو ته ورته دي.

لومړني او دویمي امینونه له امونیا سره ورته خواص لري او د مالیکولونو تر منځ یې هایډروجنې اړیکې شتون لري چې د هغوی مالیکولونه قطبي دي. د کب (ماهي) بوی ته ورته دي. لومړني او دویمي امینونه د هغوی د خواصو له مخې امونیا ته ورته او د هایډروجنې اړیکې لرونکي دي چې د هغوی مالیکولونه قطبي دي؛ له دې کبله د امینونو د ایشیدو ټکی د هغو هایډروکاربونونو چې له دې امینونو سره د کاربن او هایډروجن د عین شمیر انومونو لري او هم د دریمي امینونو څخه لوړ دی، لومړني او دویمي امینونه په اوبو کې ښه حل کېږي، په داسې حال کې چې دریمي امینونه په اوبو کې په اسانۍ سره نه حل کېږي، همدا رنگه د کاربن د انومونو د شمیر په زیاتوالي د هغوی حل کیدل په اوبو کې ټیټېږي.




د اوبو او امینونو تر منځ هایډروجنې اړیکې په امینونو کې هایډروجنې اړیکې








دریمي امینونه هم کولای شي، ترڅو د اوبو سره هایډروجنې اړیکه جوړه کړي؛ ځکه د نایټروجن انوم ($\text{N}^{\cdot\cdot}$) د ازاد وجوړه الکترولونو لرونکي دي او دا جوړه الکترولونه د اوبو له مالیکولونو سره د اړیکو د جوړیدو لامل ګرځي؛



دا چي د هايډروجن او نايټروجن ترمنځ اړيکه $(N-H)$ په دريمي امين کې نه شي جوړيدلی ؛ نو پر دې بنسټ دريمي امينونو ماليکولونه په خپل منځ کې هايډروجنې اړيکه نه شي جوړولاي:



دا امينونو د ايشيدو ټکي دهغوی د ايزو لوگ هايډروکاربنونو او ايترونو په پرتله لوړ او له ايزولوگو الکولونو او تيزابونو څخه ټيټ دي، لامل يې دا دی چې په هايډروکاربنونو او ايترونو کې هايډروجنې اړيکه نه شته او دهغوی د ماليکولونو په منځ کې د جذب قوه لږه ده ، د الکولونو او تيزابونو د ماليکولونو تر منځ هايډروجنې اړيکه شتون لري او په دې مرکبونو کې د اکسيجن اتوم دهايډروجن له اتوم سره اړيکه $(O-H)$ لري چې دا اړيکه د اکسيجن دځينلي الکټرو نيکليويټي له کبله د نايټروجن او هايډروجن له اړيکې څخه ډيره قطبي ده او دهغوی هايډروجنې اړيکه هم ځينلې ده:




(1-11) جدول د بنسټيزو امينونو فزيکي خواص

Name	structure	mp by (°C)	bp by (°C)	solubility (g/100L H ₂ O)	Kb	density d_4^{20} Relative
methylamine	CH ₃ NH ₂	-94	-6	زيات حل کيږي	4-4.10 ⁻⁴	0.769(at -79°C)
ethylamine	CH ₃ -CH ₂ NH ₂	-81	17	زيات حل کيږي	4-7.10 ⁻⁴	-
propylamine	CH ₃ CH ₂ -CH ₂ NH ₂	-83	49	زيات حل کيږي	4.10 ⁻⁴	-
dimethylamine	(CH ₃) ₂ NH	-92	7	لږ حل کيږي	5.10 ⁻⁴	0.680 cat-O°C
trimethylamine	(CH ₃) ₃ N	-117	3	لږ حل کيږي	6.10 ⁻⁵	-
aniline	C ₆ H ₅ NH ₂	-6	184	حل کيږي	4-2.10 ⁻¹⁰	-
methylaniline	C ₆ H ₅ NHCH ₃	-	196	-	-	0.989
dimethylaniline	C ₆ H ₅ N(CH ₃) ₂	2.5	194	-	-	0.956
diphenylamine	(C ₆ H ₅) ₂ NH	54	302	-	-	1.158


هغه امينو نه چې دکا رين شمير يې له يوه څخه تر پنځو اتومونو پورې وي ، په او بوکې په هر نسبت حل کېږي او هغه امينو نه چې د هغوی دکا رين د اتومونو شمير شپږ او له شپږو څخه لوړ وي ، په او بوکې لږ حل کېږي.

11_3: د امينو نو کيميايي خواص


امينونه له تيز ابونو سره تعامل کوي ، مالګې جوړ وي.




د الکايل امونيم کلوريد مالګه د هايدروکسايډ او الکواکسايډونو (OH⁻ او OR⁻) څخه کمزوری القلي خاصيت لري او د اوبو په نسبت هم کمزوری قلوي خاصيت له ځان څخه ښکاره کوي ، لاندي سلسلې ته څير شي:



لاندي کيميايي تعامل د امينونو القلي خواص نښي:



له پورتنیو معادلو سره سم د امونيم تشکيل شوې مالګه ، د قوي القلي او تودوخې په شتون کې بيرته په امينونو ، غير عضوي مالګې او اوبو تجزيه کېږي:




د امينو نو الکالايشن :

امينونه له الکولونو سره تعامل کوي ، د امينونو بيلايل مرکونه جوړ وي:



د امينو نو د اسالايشن تعامل:

امينونه له اسال سره تعامل کوي ، اميدونه جوړ وي چې تعامل يې په درې پړاونو کې ترسره کېږي:





مشق او تمرین وګړۍ



1 - د میتیل امین 500 ملي لیتر 0.1m او بلن محلول به دکوم pH لرونکی وي؟

که چیرې $Kb = 5.10^{-4}$ وي.



2 - لاندې معادلې بشپړې کړئ:




11_4: د امینونو لاس ته راوړنه

د الکالیشن د عملیې په واسطه د امینونو لاس ته راوړنه

پرتول دلاس ته راوړنې لاره له هغو لارو څخه ده چې دویمې امینونونه د لومړني امینونو او دریمې امینونو له دویمې امینونو څخه تر لاسه کېږي ، داسې چې الکایل هلایدونو ته له امونیا سره تعامل ورکوي ، لومړني ، دویمې او دریمې امینونه لاس ته راوړي.




امونیا د الکایل هلایدونو سره تعامل کوي ، لومړني امینونه جوړوي:




لومړني ، دویمې او دریمې امینونه کیلای شي چې د امونیا له الکالیشن څخه لاس ته راوړل شي؛ داسې چې الکایل هلایدونو ته له امونیا سره تعامل ورکوي، لومړني امین حاصلېږي، خو که چیرې د الکایل هلایدونو د اندازې نسبت لوړ شي ، په پایله کې دویمې او دریمې امینونه هم لاس ته راځي . که چیرې دریمې امین ته هم له الکایل هلاید سره تعامل ورکړل شي ، د کوار ترنري مالګه لاس ته راځي:






مثال:



همدارنگه که چیرې د نترل مرکبونه دکلسټونو په شتون کې هایدروجنشن شي، امینونونه حاصلیږي:




داروماتیکي لومړنیو امینونو دلاس ته راوړلو فایره ښه لاره د اړونده نایټرو مرکبونو ارجاع کول دي، د نایټرو مرکبونه کیدای شي د اروماتیک د الکتروفیلی له نایټرو کیدلو تعامل څخه لاس ته راوړل شي، د نایټرو گروپ کیدای شي دکلسټو په شتون کې د هایدروجن یا کیمیایي ارجاع کوونکو عاملو په واسطه په اسانۍ سره ارجاع شي:



مشق او تمرین وکړئ


لاندې معادلې بشپړې کړئ



5_1_11: مهم امينو نه

1_ ميتايل امين:


که چيرې ميتانول ته د تودوخې په 400°C او Al_2O_3 دککست په شتون کې له امونيا سره تعامل ورکړل شي، ميتايل امين حاصلېږي:




همدا رنگه کېدای شي ، داي ميتايل امين او تر اي ميتايل امين هم په لاس راوړل شي ، له دای ميتايل امين څخه د مواد وېه حل کولو کې گټه اخېستل کېږي.

2_ انيلين يا بنزين امين (Aniline or Benzene amine)


انيلين دارو مالیکو مهمو امينونو څخه دي چې د ضعيفو فلزيو خاصيت لري ، او د سايلکلو هگران امين په پرتله يو ميلون ځله ضعيف دي ، دهغه فورمول په لاندې ډول دي:



په صنعت کې دانليکوکو ($\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$) درنگ مهمه سرچينه انيلين دي او دا رنگ داسې لاس ته راوړل کېږي چې انيلين ته له کلورو استيک اسيد سره تعامل ورکوي او په پايله کې انليکو لاس ته راځي:




دانليکوکو څخه ييلاليل مختلف رنگونه جوړوي؛ له دې امله هغه د بنسټيز رنگ په نوم ياد وي. انيلين د برومين له اوبو سره تعامل کوي ، تر اي بروموانيلين جوړ وي:




2_11: امایډونه (Amides)

لومړني او دویمي ډول امینونونه له تیزابونو سره (الکولو ته ورته) تعامل کوي، داسې مرکبونه جوړوي چې د امایډونو په نوم یادېږي؛ د بیلګې په ډول:



امایډونه هم په طبیعت کې شته او هم دستیز په پایله کې په مصنوعي توګه له لومړنیو توکو څخه لاس ته راځي، د فزیکي طریقو په واسطه، (د بیلګې په ډول: جنبي سیکتر) د وظیفه یي ګروپونو د جوړښت څېړنه، ټاکي چې د نایټروجن او د کاربونیل د وظیفه یي ګروپ تر منځ ټولې اړیکې په یوه سطحه کې شتون لري او دهغوی د سطح والي لامل د π الکترونونو د (C-O) تر منځ اړیکې دنایټروجن د اټوم د اړاد الکترونونو پر ګډې پورې اړه لري چې سره یو ځای د څلور الکترونونو د نه ځای پرځای شوی الکتروني ورېځې د درې واړو اټومونو (N, C, O) دپاسه تشکیل کړي او دې عمل ته د نایټروجن د اټوم اړاده جوړو الکترونونو اړ کړي دي او په همدې دلیل دي چې امایډونه په اوبلن محلول کې دومره قلوي خاصیت له ځان څخه نه ښکاره کوي، د دې نه ځای پرځای شوي اړیکې امایډونو ته کیمیايي ثبات وربخښلی دی چې له القلیو، نړیو تیزابونو او اوبو سره څښتنوالی وروښتي:



شکل (4_11) دنایټروجن له کاربونیل ګروپ سره د اړیکو سطح والي

1_2_11: د امایډونو نوم ایښودنه او لاسته راوړنه

امایډونه د IUPAC پر بنسټ داسې نومول کېږي چې د تیزاب د جوړونکو الکانونو دتیزابونو د نوم ټولنیز وروستاړي په امایډونو کې د امید په کلمه amide تعویض کېږي او د اسید کلمه نه لیکل کېږي؛ د بیلګې په ډول:



Butan amide




د $\text{R} - \text{C} - \text{NH}_2$ عمومي فورمول لرونکو امایډونو د لاس ته راوړلو لپاره کېدای شي چې د کاربوکسیلیک اسید

مرکبونه نیغ په نیغه له امونیا سره تعامل وکړي، په پایله کې امونیم کاربوکسلات لاس ته راځي:







که چیرې لاس ته راځي کاربوکسلات ته تودوخه ورکول شي، په پایله کې له هغه څخه یو مالیکول او په جلا او غښتلی امید لاسته راځي:



په پورتینو تعاملونو کې د امیدونو لاس ته راوړنه ډیره بڼې (ورو) او دهغوی محصولات لږ دي؛ له دې کبله نور میتودونه د امیدونو د لاس ته راوړنې لپاره په کار وړل شوي دي؛ د بېلګې په ډول: د بنزایل کلوراید او امونیا د تعامل په پایله کې امیدونه لاس ته راځي، داسې چې په یوه فلاسک کې د امونیا محلول اچوي او دا محلول دیځو اوبو په یو ټوک لوښي کې ږدي، بیا په دې محلول باندې په څاڅکو، څاڅکو بنزایل کلوراید ورزیاتوي چې په پایله کې بنزامید لاس ته راځي او په فلاسک کې ښکته کینی یعنې رسوب کوي:



لاس ته راځي HCl په فلاسک کې له اضافي امونیا سره تعامل کوي او NH_4Cl جوړېږي:

$$\text{NH}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$$


(5_11) شکل د بنز امید لاس ته راوړنه





د یوولسم څپرکي لنډيز:

* دامینونو وظیفه یي گروپ NH_2 دی چې د امینو (Amino) په نوم یادېږي د دې گروپ د نایټروجن اټوم د SP^3 هایبرید حالت لري.

* لومړني امینونه هغه امینونه دي چې د امونیا د نایټروجن اټوم د هایدروکاربنونو د کاربن له یوه اټوم سره اړیکه لري.

* دویمي امینونه له هغه امینونو څخه عبارت دي چې د امونیا د نایټروجن اټوم هایدروکاربنونو له دوو گروپونو سره اړیکه لري.

* درېي امینونه له هغه امینونو دي چې دهغوی د امونیا د نایټروجن اټوم د هایدروکاربنونو له درې اټومونو سره اړیکې لري.

* عضوي رادیکالونه چې د امینونو په جوړښت کې د نایټروجن له اټوم سره اړیکه لري، څلورمخیزو ته نژدې جوړښت لري؛ ځکه د څلور مخیزو جوړښتیزو زاویه 109.5° او د امونیا زاویه 107.3° ده.

* د امینونو په نوم اېښودنه کې په نایټروجن باندې نښتي پاتې شوني د Al د وروستاري سره د نوم په پیل کې دهغوي د نوم د لومړي توري د انګرېزي ژبې دالفبا د مخکښوالي په پام کې نیولو سره سم لیکل کېږي او بیا وروسته د امین (amine) کلمه ورزنایږي.

* که چېرې د امین گروپ د مشبوع او یا غیر مشبوع زنجیري هایدروکاربنونو د کاربن د اټومونو هایدروجن اټومونه تعویض کړي، دا ډول امینونه د الیفایک په نوم او که د اروماتو له کیمو سره اړیکه ولري، د اروماتیکو امینونو په نوم یادېږي.

* دامینونو د ایشیدو ټکي دهغوی د ایرو لږگ هایدروکاربنونو او ایترونو کې هایدروجنې اړیکه نه شته او دهغوي د مالیکولونو په منځ کې د جذب قوه لږه ده.

* بې دادي چې په هایدروکاربنونو او ایترونو کې هایدروجنې اړیکه نه شته او دهغوي د مالیکولونو په منځ کې د جذب قوه لږه ده.

* که چېرې میتانول ته $400^\circ C$ تودوخه کې او Al_2O_3 کنسټ په شتون کې له امونیا سره تعامل ورکړل شي، میتیل امین حاصلېږي.

* انیلین داروماتیکو له مهمو امینونو څخه دي چې د ضعیفو فلزيو خاصیت لري او د سایکلو هکسان امین پرته یو میلیون ځله ضعیف دي.

* امایډونه د IUPAC پر بنسټ داسې نومول کېږي چې د تیزاب د جوړونکو الکانونو د نېوم Oic وروستاوي په امایډونو کې د امایډ په کلمه amide تعویض کېږي او د امید کلمه نه لیکل کېږي.

د یوولسم څپرکي پوښتنې:

څلور ځوابه پوښتنې:



1- امینونو وظیفه یي گروپ د..... څخه عبارت دی.



2-  فورمول د ----- مرکب فورمول دي.

الف - ټولرین - ب- انلیکو - ج - انیلین - د - الیپایډا

3- له لاندې مرکبونو څخه کوم یې دقلوي خاصیت لري؟



الف- $pH > 7$ - ب- دجستو سره تعامل کوي هایدروجن ازادوي -ج- دقلوي خاصیت لري -د- الف اوج سم دي

5- دلاندې مرکبونو څخه کوم یو لومړني امین دي؟



6- که چیري د امين کتله 45amu وي ، له لاندینيو پاڼي شونو څخه به کومه يوه په هغې پورې اړه ولري ؟

الف - *methyle* ب - *ethyl* ج - *propyl* د - *isopropyl* ه - *Aryl*

7- د امينونو د ايشيدو ټکي دهغوی د لږو لوگ هايډروکاربنونو او ايترونو پرته ... او له ايزالوگو الکولونو او تيرامينو څخه ... دی:

الف - لوړ ، ټيټ ب - ښکته ، ښکته ج - نژدې ، مساوي د - هيڅ يو.

8- د ايتال امين او HCl له تعامل څخه لاندې کوم مرکب حاصلېږي؟

الف - پروپيل امين ب - پروپيل امونيم کلورايد ج - ايتال امين کلورايد د - ايتال امونيم کلورايد.

9- $CH_3 - CH_2 - NHCH_2 - C(=O) - CH_3$ فورمول په نوم يادېږي ؟



الف - اميد ب - ايتال اسيت اميد ج - ايسټر د - کيتون

10- له لاندې مرکبونو څخه کوم يو دويمې امين نه دی؟

الف - $CH_3 - CH_2 - NH - CH_3$ ب - $H_3C - NH_2$ ج - $H_3C - NH - CH_3$ د - $H_3C - NHCH_3$

تشرېحي پوښتنې

1- د لاندې مرکبونو نومونه اېښودنه او دهغوی ډولونه وټاکي:



2- د لاندې امينونو ساختماني فورمولونه وليکي:

الف - *cyclopropylamine* ب - *dimethylethylamine* ج - *ethylhexylamine*

3- په د نايټروجن سلسله به *cyclopropylamine* مرکب کي څومره وي؟

$CH_3 - Cl$ ، $20.2g$ له Cl ، $12g/mol$ ، N ، $14g/mol$ ، H ، $1g/mol$ ، O ، $16g/mol$ ، Cl : 35.5g/mol


4- $3.4g$ امونيا له $CH_3 - Cl$ ، $20.2g$ ، $12g/mol$ ، N ، $14g/mol$ ، H ، $1g/mol$ ، O ، $16g/mol$ ، Cl : 35.5g/mol

5- د امينونو او اميد ونو په منځ کي څه توپير دي ، په دي اړه لازم معلومات وړاندې کړئ؟

6- د *propylamine* مرکب په $0.25molar$ محلول کي د هايډروجن د ايون غلظت $[H^+] = 10^{-12}$ سره مساوي دي ، دهغه K_b پيدا کړئ.

7- په څلورم امين کي 65.75% کاربن ، 19.18% نايټروجن او 15.07% هايډروجن د کتلې له کبله شتون لري د هغه ماليکولي فورمول پيدا کړئ.

8- د لاندې اميدونو نومونه وليکي:



9- $5.95g$ امونيا له اسيت کلورايد (CH_3COCl) سره تعامل کړی دی ، څومره اسيت اميد حاصل شوی دی ؟

10- امين په اويلن محلول کي له خپل ځان څخه القلي خاصيت ښکاره کوي ، ولې ؟ په دلايلو معلومات وړاندې کړئ ؟



طبيعي پولي ميرونه



هغه ماليکولونه چې د څوکو چينو ماليکولونو له يوځای کيدو څخه جوړ شوي دي ، د پولي ميرونه نامه او هغه کو چني ماليکولونه چې پولي ميرونه جوړوي ، د مونوميرونو په نوم يادېږي .

پولي ميرونه په دوو ډلو وېشل شوي دي چې طبيعي پولي ميرونه او مصنوعي پولي ميرونه دي ، په دې څپرکي کې د طبيعي پولي ميرونو په اړه معلومات وړاندې کېږي او په راتلونکي څپرکي کې به د مصنوعي پولي ميرونو په هکله معلومات وړاندې شي .

د طبيعي پولي ميرونو تر سرليک لاندې هغه مرکبونه څېړل کېږي چې طبيعي بنسټ لري او د پروټينونو ، نوکليويک اسيدونه ، امينو اسيدونه ، انزيمونه ، نشايسته ، سلولوز ، وربنس او طبيعي وربنس دی چې په دې څپرکي به يې ځينې ځانگړتياوي مطالعه کړي .

د دې څپرکي په لوستلو به پوره شي ، چې دا مرکبونه کوم جوړښت او خواص لري او په ورځني ژوند کې کوم رول لوبوي ؟



1_12: د طبيعي پولي ميرونو ډلبندي

پولي ميرونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی مالیکولونه د څوکو چينو مالیکولونو د نښتلو له امله جوړ شوي دي، کوچني مالیکولونه چې پولي ميرونه جوړوي، د مونوميرونو په نوم یادېږي. پولي ميرونه کېدای شي ، له یو ډول مونوميرونو او یا له بیلابیلو مونوميرونو څخه جوړ شوی وي . پولي ميرونه چې د یو ډول مونوميرونو څخه جوړ شوي وي، د کوپولي ميرونو په نوم یادېږي او پولي ميرونه چې د بیلابیلو مونوميرونو څخه جوړ شوي وي، د کوپولي ميرونو په نوم یادېږي .

پولي ميرونه په دوو ډلو وېشل شوي دي چې عبارت له طبيعي پولي ميرونو او مصنوعي پولي ميرونو څخه دي ، طبيعي پولي ميرونه عبارت له څو قيمته قندونو (نشايسته او سلولوز) ، د پروټينونو ، د نوکليک اسيدونو ، د انزايمونو، د وريښمو او طبيعي رېز څخه دي چې لاندې بېلولو:

1_1_12: قندونه

کاربو هایدريټونه د ژوندانه مهم مرکبونه دي چې زموږ د ورځني ژوند په بیلابیلو برخو کې په کار ورل کېږي. دکورونو، وروڼه، موبل، خوراکي مواد، کالي او نور توکي له کاربو هایدريټونو څخه جوړ شوي دي. کاربو هایدريټونه په طبیعت کې ډیر موندل کېږي او په ټولو ژوندیو جسمونو کې شتون لري چې د ژویو او له هغې ډلې څخه د انسانانو د خورو مواد دي.


کاربو هایدريټونه زیاتره د شنو نباتاتو په واسطه جوړېږي چې د نباتاتو د پلور شنه ماده د لمر د رڼا په شتون کې د هوا کاربن ډای اکساید او هغه اوبه چې د ریښو له لارې یې جذب کړي دي، په گلوکوز تبدیلوي، دا عملیه د فوتو سنتیز په نامه یادېږي:



1_12) شکل، نباتات د گلوکوز او اکسیجن تولید کوونکي





په رښتیا چې نباتات طبیعي لابرانار نه دي چې د خوړو مواد جوړوي. په پورتنۍ معادله کې لیدل کېږي چې په نباتاتو کې د کلوروفیل د شنبې مایې په مرسته د گلوکوز د جوړېدو عملیه ترسره کېږي او اکسیجن هم تولیدېږي، ټول ژوي اکسیجن تنفس کوي، اکسیجن د کاربوهایدریتونو او د خوړونورو توکو د اکسیدېشن لپاره په کار وړي چې د ژونديو په ارگانیزم کې انرژي ازاو وي.



د فوتو سنتیز عملیه او د ژویو د تنفس عملیه دوی معکوسې عملې دي؛ په دې دوو عملیو کې د کاربن ډایاکساید او اکسیجن د کچې توازن کنټرولېږي.

2_1_12: د کاربو هایدریتونو جوړښت او نوم ایښودنه

کاربو هایدریتونه د کاربن د هایدریتونو په نوم هم یادوي، څرنگه چې د هغوی ساده فارمول $\text{C}_m(\text{H}_2\text{O})_n$ یا $\text{C}_m\text{H}_{2n}\text{O}_n$ دی؛ پردې بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه لیدل کېږي. د دې ډلې مرکبونه گلوکوز $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (چې د الدیهایډي گروپ لرونکي دي)، فركتوز $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (د کیتوني گروپ لرونکي دي) (انودر دي چې په میووکې شتون لري. د دې دواړو قندونو دجوړښت فورمولونه عبارت دي له:




(2_12) شکل: الف- ځمکنی توت د فركتوز سرچينه، ب: انکور د گلوکوز سرچينه، ج: شات د مونو سکرېډونو سرچينه

د عمومي فورمولونو په پام کې نیولو سره، خیر ساده کاربو هایدريت ، فارم الیهاید (CH₂O) دي، نو ځکه کیدای شي چې کاربو هایدريتونه د فارم الیهاید پولی میرونه وي؛ د بیلګې په ډول:




د پیرانونو او فورانونو بڼې:

ګلوکوز د الکولو او الیهایدو د وظیفه یي ګروپونو لرونکي دي او لږ څه لوړ ، کېدو او کړۍ کیدو زنځیر لري چې کولای شي یو کرېز همې استیال جوړکړي ، دا کړۍ له شپږو اتومونو سره ، د ګلوکوز پیرانونو په نوم یا دبېرې ؛ ځکه د پیران په نوم کرېز نیز ایتړ ته ورته دي ، د هغه فورمول په لاندې ډول دي:




د پیران کړۍ

فرکتوز هم د محلول په حالت کې ، 70% د کرېز همې استیال بڼه لري او د پیرانونو کړۍ ته ورته شپږو اتومونه لري ؛ خو 30% یې د پنځه اتومي کړۍ په بڼه دي ؛ دا چې فوران ته ورته دي ؛ نو د فورانونو (Furanose) په نوم یادېږي او په ټاکلي ډول کرېز فرکتوز د فرکتوز فورانونو په نوم یادېږي ، لاندې شکل فوران بڼېي:




د فوران کړۍ

پیچلي کاربو هایدريتونه چې په هغوی کې ګلوکوز او فرکتوز دواړه شتون ولري ؛د خو قیمه قندونو (پولې سکرایدونو) (Polysaccharides) په نوم یادېږي ، د هغوی له ډلې څخه یوه هم بوره (Sacarose) ده چې د دوه قیمته قندونو (disaccharides) په نوم یادېږي، چې د یو مالیکول ګلوکوز پیرانور او د یوه مالیکول فرکتوز فورانونو د یوځای کیدو او دیو مالیکول اوبو په ایستلو سره لاس ته راځي . دا هر واحد د مونو سکرایدونو (Monosacride) په نوم یا دبېرې، مونو سکرایدونو له بل سره یوځای کېږي ، او لیګو سکرایدونه جوړوي:



مثال : دلاندي کاربو هایدريتونو نوم اینیودنه وکړئ:



حل:

a) aldo pentose b) Keto pentose c) aldohexose d) Keto hexose e) Ketotetrose

3_1_12: د کاربو هایدريتونو ډلبندي


کاربو هایدريتونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې له ساده او پیچلو څخه عبارت دي.

1_ مونو سکرایډونه

ساده قندونه (Simple sugars) یا مونو سکرایډونه (Monosacharides) د کاربو هایدريتونو هغه ډول دی چې نه هایدرولیز کېږي او د هغوی په مالیکولونو کې د کاربن د اتومونو شمیر له 3 څخه تر 9 اتومونو پورې رسېږي. مونو سکرایډونه چې په خوراکي توکو کې شته، د هکسوز (Hexoses) په نوم یادېږي. گلوکوز ډیر ساده مونو سکرایډ دی چې په ژونديو اورگانیزمونو کې د انرژي د تولید او د میتابولیزم په عملیه کې بنسټیز رول لوبوي، دا مرکبونه په ځیگر (بڼه) او نسجونو کې ذخیره کېږي او د



هغوي مهمې سر چينې انگور او شات دي ،مونو سکر ايدونه سپين رنگه کرسټالي مرکبونه دي او خورځوند لري ، له اوبو سره هايډروجنې اړيکه تړي ؛ نو ځکه حل کيدونکی دي ، هايډروکاربنونه په ايترونو کې نه حلېږي.




D-galactose mannose D-fructose D-glucose
(aldohexose) (Ketohexose) (aldohexose) (Ketohexose)

دالوز مونو سکر ايدونه په خپل ماليکولي ترکيب کې څلور نه برابر شوی کاربنونه لري چې په (*) علامې سره ټاکل شوي دي . دا مرکبونه په جامد حالت کې د روښنايي عمل ترسره کوي . گلوکوز چې دالو هکسوز په نوم هم يادېږي، دڅلور نه برابر شويو کاربنونو لرونکي دي او د هغه نه برابر شوی کاربنونو په پام کې نيولوسره ، د دې مرکبونو د روښنايي ايزوميري په لاندې ډول محاسبه کېږي:

$$2^n = 2^4 = 16 \text{ د الوهکسوز د ايزو ميرونو شمير}$$

په پورتنۍ معادله کې 2^n د نه برابر شوو کاربنونو شمير ښيي. مونو سکر ايدونه کيدای شي چې کپيز يا زنجيري ماليکولونه ولري، د زنجيرني مونو سکر ايدونو د هايډروليز په پايله کې کپيز مونوسکر ايدونه لاس ته راځي چې په دې حالت کې د هغو نه برابر شوو د کاربنونو شمير له څلورو اتو مونو څخه پنځو اتو مونو ته زياتېږي ، د مونو سکر ايدونو د کړۍ په جوړېدو کې د نه برابر شوو کاربنونو داتو مونو د زياتوالي عمليه د همې اسپتال په نوم يادېږي، د گلوکوز د ماليکول د کپيز جوړښت جوړېدل گورو:





الف - که چیرې وي - گلوکوز (D - glucose) په اوبو کې حل شي ، د هغه کپیز گلوکوز لاس ته راځي .

ب - په α -D - glucose کې د OH - گروپونه د کړۍ په لومړي او خلورم کاربن کې د Cis په حالت شتون لري او یوازې د لومړي کاربن د OH گروپ ، اکریال (axial) دي او نور اکوتریال (aquatrial) دي.

ج - په β -D - glucose کې د OH - گروپونه د کړۍ په لومړي او خلورم کاربن کې د اکواتریال (aquatrial) په حالت کې دي .

د مونو سکرایډونو اسکلېټ بندي


خرنگه چې دټولو هایډروکاربنونو د کاربن اتومونه د تاوېدو وړ دي؛ له دې کبله پوهانو معیاري میتودونه د کاربوهایډرېټونو د سترو شمېرې بنودنې لپاره په کار وړي دي چې یو له دې میتودو څخه د فیشر میتود دی چې د تاوېدلو مرکز د بنودلو لپاره د یوې سطحې پر مخ ګڼه اخیستل کیږي په تیرو لوستونو کې مو مطالعه کړل چې د خلور مخو کاربنونو څخه یو اتوم د فیشر په بنودنه کې په دوو پړو خطونو سره بنودل کیږي ، افقي خطونه د مخ د بهرنۍ سطحې د اړیکو بنودونکي او عمودي خطونه د مخ د شا اړیکو بنودونکي دي ، د پرې کړې سره سم د کاربنیل د گروپ کاربن د فیشر د فورمول په باندې برخې او یا هغې ته نژدې لیکل کیږي ، پردې بنسټ R- ګلیسر الډیهایډ چې ټیتر ساده مونو سکرایډ دي، په لاندې شکل کې لیدل کیږي:



(3_12) شکل: د فیشر بنودنه د گلسر ایدونو له لپاره


د یادولو وړ ده دا چې د فیشر بنودنه کېدای شي د هغه د جوړښت له بدلون پرته ، د 180° درجو په

اندازه (پرتله له 90° یا 270° درجو څخه) د سطحې پر منځ تلو شي:



$[R]$ - گلسر الډیهاید

هغه کاربوهاید ریتونه چې د تاویدلو څلور مرکرونه ولري ، داسې بنودل کېږي چې د تاویدلو مرکزونه یو دبل له پاسه شتون لري او د کاربونیل د گروپ کاربن د هغوی له پاسه او یا لاندې بنودل کېږي ؛ د بیلګې په ډول: گلوکوز د تاویدلو څلور مرکرونه لري چې د فیشر په بنودنه کې یو دبل سر بېره شتون لري ، خو دا تصوري بنودنه د مالیکولونو د سم جوړښت چې کوږ تاو او پیچ وي ، معلومات نه ورکوي:




په پورته کې د کاربونیل



فعالیت

د گلیسر الیپهایدونو فیشری بنوده چی لاندی لیکل شوی، کوم یو بی د یو انانتومیر بیانونکی دی؟




د D او L فنډونه:


گلیسر الیپهایدونه (Glycerinaldehyde) ډیر ساده الموز نه دی چې د تاویدلو یو مرکز لري او د دوو انانتیومیر شکلونو لرونکي (اښه وي تصویر) دی چې د ښي تصویر ښي په طبیعت کې زیات موندل کېږي؛ یعنې که چېرې د طبیعي گلیسر الیپهایدونو یوه نمونه په یو پولارومتر کې کینودل شي، رنایو لاریز کېږي او د ساعت د عقربې سره سم تاوېږي چې په مثبت (+) علامه ښودل کېږي. دا چې د C_2 اسکلیټ په (+) گلیسر الیپهاید په (R) ښودل شوی؛ نو دا گلیسر الیپهاید د D- گلیسر الیپهاید په نوم یادېږي، (D له Dextrorotatory څخه اخېستل شوی دی چې ښي ښي خواته د تاویدلو په معناه ده) د هغې بله انانتیومتر؛ یعنې (S) - گلیسر الیپهاید د L- گلیسر الیپهاید په نوم یاد وي (L له levorotatory کلمې څخه اخېستل شوی دی چې کښ خواته د تاویدلو په معناه دي).

د مونو سکرایدونو خواص

1- د الموزو مونو سکرایدونه د فېلنگ او تولین د محلولونو په شتون کې اکسیدي کېږي او د هغوی د کاربونیل په گروپ کې اکسیدیشن ترسره کېږي:



بېنډيلېري ؛ نو د محلول په حالت کې له نوموړو بنودونکو سره تعامل کوي ، د هغوی کيټوني گروپ د کاربوکسيل په گروپ بدلون مومي ، خو لومړي د کيټون گروپ په الډيهايډي گروپ او بيا د هغوی الډيهايډی گروپ د کاربوکسيلک اسيد په گروپ تبديليږي:



د برومينو اوبه د الموزونو الديهايی گروپ اکسیدي کوي او د کاربوکسيل په گروپ يې تبديل او المونیک اسيد جوړوي:





ناتیریک اسید برومین داوون په نسبت تیر غنډلی اکسید کونکي دي چې د الیپایدو CH_2OH - گروپ اکسیدي کوي او په کاربوکسیک اسید یې تبدیلوي :



مثال:

یو اللوز چې عمومي فارمول یې $C_n H_{2n} O_n$ دی، $36g$ یې د تولین له ښودونکي سره تعامل کړي او $43.2g$ سپینو زرو ته یې رسوب ورکړی، د دې اللوز مالیکولي فورمول به کوم وي؟ د کاربن اټومي کتله $12g/mol$ ، د هایدروجن اټومي کتله $1g/mol$ ، د اکسیجن اټومي کتله $16g/mol$ او د سپینو زرو اټومي کتله $108g/mol$ ده.


حل:



$$30n \text{ g aldose} - 216gAg$$

$$36g \text{ aldose} - 43.2gAg$$

$$n = \frac{36g \cdot 216g}{30g \cdot 43.2g} = 6$$




فعالیت




500g د گلکوز 1.2% کتلوي محلول نمونه د فهانګ له ښودونکي محلول سره تعامل ورکړی شوی دی، خوږه Cu_2O به رسوب کړی وي؟ د Cu_2O مالیکولي کتله 143 او د گلکوز $C_6H_{12}O_6$ د 180 ده.

د مونو سکرایډونو ارجاع کول

د مونو سکرایډونو کیتوني او الډهایډي ګروپونه د غښتلو ارجاع کوونکو په واسطه ارجاع کېږي؛ د بیلګې په ډول: که چېرې د $D-C_6H_{12}O_6$ د $NaBH_4$ او یا د H_2 په واسطه د کتلست په شتون کې ارجاع شي، $D-glucitol$ (Sorbitol) لاس ته راځي:



مثال : د : D – ribuose (aketo pentose) د محصول تعامل د تولین او NaBH_4 سره به کوم وي ؟



فعالیت

د D-ribose aketopentose د تعامل محصول د تولین دښودونکي او د NaBH_4 سره به څه وي ؟

2- ډای سکرایډونه:

د مونو سکرایډونو د دوو مالیکولونو د اتحاد ، تراکم او د دې هایډریشن څخه د ډای سکرایډونو مالیکول لاس ته راځي چې د دوو مونو سکرایډونو په منځ کې یو اکسیجنی ټول کيږي .

د ډای سکرایډونو عمومي خواص



- 1- د ډای سکرایډونو عمومي فورمول $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ دی .
- 2- ډای سکرایډونه سپین رنگ لري او خوند یې خوږ دی .
- 3- د ټولو ډای سکرایډونو مالیکولونه ښي خوا ته تاوېږي او نور پور لاړنښ کوي .
- 4- ډای سکرایډونه هایډرولیز کيږي او د هغوی د هایډرولیز په پایله کې مونو سکرایډونه لاس ته راځي .
- 5- د مهمو ډای سکرایډونو څخه یوه پوره ده او نور مهم ډای سکرایډونه لکتوز ، مالتوز او سلیبوز دي .

سکروز (پوره)

پوره د یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکتوز د ښېلیدو له امله لاس ته راځي:



دا دواړه نوموړي هکسوزونه د گلايکوسايډ glycoside اړيکې په واسطه چې د گلوکوز د لومړۍ کاربن (C-1) او د فريکټوز د دويم کاربن (C-2) سره تړل کېږي ، نښتي دي . بوره په ډيره کچه په نباتاتو ؛ لکه: لبلبو او گنيو کې موندل کېږي چې د اکسترکشن په ميتود د هغوی څخه خالصه بوره په لاس راوړل کېږي . بوره په اوبو کې په اسانۍ سره حل کېږي ؛ خو په الکولو کې ډيره لږه حل کېږي . کله چې بوره هضم شي ؛ په دې صورت کې په ځيگر کې گلوکوز او فريکټوز جوړ او وروسته له جوړېدو څخه په وينه کې جذبېږي:



څرنگه چې سکروز د کاربونيل گروپ نه لري ؛ له دې کبله د فېهنګ او تولين له ښودونکو سره تعامل نه کوي او د ارجاعي خاصيت هم نه لري .



شکل: د سکروز ویلې کیدل او د شیریني جوړیدل (4_12)

په یورین کې د شکرې د اندازې ټاکل


فعالیت:

زیاتې عضوي مالګې په خپل جوړښت کې د الډیهایدونو او ګلیتونونو ګروپونه لري؛ له دې کبله هغوی ډیر لږ کولې شي چې فلزي آیونونه؛ لکه: Ag^+ ، Bi^{3+} ، Hg^{2+} ، Cu^{2+} جوړ کړي . کله چې دا مالګې په کاربوکسیک اسید اکسیدایز کېږي ، دا معلومات په وینه او یورین کې د شکرې د اندازې د ټاکلو لپاره کارول کېدای شي . که څه هم په وینه او یورین کې د شکرې د اندازې د ټاکلو لپاره بیلابیل میتودونه کار وړل کېږي؛ خو مهم میتود د فېلنګ د بنډونکي کارول دي (هغه ماده چې د کیمیايي تعامل لپاره کارول کېږي، په ځانګړي توګه د دې د پوهیدلو لپاره ده چې د نظر وړ ماده کې مو کوم نور مواد هم شته). په دې مورد کې د کار لاره په لاندې ډول ده:

- 1- په یو تست تیوب کې د فېلنګ د محلول اندازه CuSO_4 دمحلول 70% اچوي .
- 2- د جوړ شوي فېلنګ محلول له مساوي اندازې سره سم ، د سودیم پیرتاتسیم نار تاربت او سودیم هیدروکساید محلول اندازه (له اوبو سره د 100 ml ملي لیټرو په اندازه جوړ کړي) په یو تست تیوب کې یې واچوی .
- 3- محلولونه یو په بل کې تر هغه وخته پورې حل کړئ چې د اوبو په شان تیاره رنګ یې ولیدل شي.
- 4- بیا له دې څخه وروسته محلول وینوروی (د اوبو په شان تیاره رنګ باید ولیدل شي ، که چیرې ونه لیدل شي ، نو تست تیوب پاک نه دی)
- 5- نو یورین یا دوني سیروم باید په لاس راغلي محلول کې واچول شي (د یورین اندازه باید له

ښودونکي څخه زيات نه وي) که چيرې پيرين يا سيروم شکره ولري، نو سور اویا ټیر رنگه رسوب په تست تیرب کې جوړیږي.


په وینه کې د گلوکوز نورماله اندازه له $80mg$ څخه تر $120mg$ په شاوخوا کې ده. د سوځیدلو درېدل او په وینه کې د گلوکوز فعالیت د انسولین د هارمون پر تولید پورې اړه لري.




(شکل 6_12) د شکرې د اندازې موندل په وینه کې

لکتوز (lactose)

لکتوز دښودو په قند هم مشهور دي، دا قند د ټي لرونکو ژويو په ښودو کې شته چې د انسانانو شوي چې 6% ، د غوا وشوي 4% له لکتوز څخه جوړی شوي دي :



د لکتوز جوړښت په لاندې ډول دي:





شکل شوي د لکتوز سر چينه: (6_12)



مالټوز (Maltose)


مالټوز د ډاي سکرایډنو هغه ډول دي چې د اوریشو په دانو او نورو نباتاتو کې موندل کیږي. دا قند کیدای شي چې له نشایستی او ګلايکوجن څخه د امایلیز (Amylase) انزیم د کړنې په واسطه لاس ته راوړل شي. دا قند $102 - 103^{\circ}C$ تودوخه کې ولې کیږي چې د څښلو او د خوراکي موادو په تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په مالټوز کې الډیهایډي ګروپ شته، له دې کبله د فهدنگ محلول ارجاع کولی شي او د برومین د اوبو په شتون کې په مالټونیک اسید (moltonic acid) تبدیلېږي. که چیرې مالټوز د تیزابونو په شتون کې هایدرولیز شي، په ګلوکوز بدلېږي:



سلیویوز (cellobiose)


د سلولوز د قسمي هایدرولیز په پایله کې، سلیویوز تشکیلېږي، که چیرې هایدرولیز ته دوام ورکړل شي، په پای کې دوه مالیکوله ګلوکوز لاس ته راځي. سلیویوز د مالټوز په شان دي او یو له بل هندسي

ایزومیر دي، په ځینې هیوادونو کې لرگیو ته له ګرموتیزابونو سره تودوخه ورکوي، په پایله کې سیلیویوز لاس ته راوړي چې له هغه څخه د ژویو د خوړو لپاره ګټه اخیستل کېږي. که چېرې سیلیویوز هایدرولیز شي دوه مالیکوله ګلوکوز حاصلېږي:




2_2_12: پولي سکرایډونه (Polysacarides)


پولي سکرایډونه د پیرانونز ګلوکوز د واحدونو یو له بل سره دیوځای کیدو او دهغوی د دې هایدريشن په پایله کې تشکیلېږي. نشایسته هم په دې مرکبونو کې شامله ده چې د بناخ لرونکي جوړښت له کبله دهضم کیدو وړتیا لري؛ خو سلولوز هم چې د پولي سکرایډونو د زنجیر څخه د اوږدو رېښو په بڼه لاس ته راغلی دي؛ نو څرنگه چې دا رېښې د هایدروجني اړیکو په واسطه یو له بل سره یوځای شوي دي، غښتیا لرونکې ماده ده، چې د هضم وړ نه ده. د نباتاتو کنبې، رېښې او بناخونه یې له سلولوز څخه جوړې شوې دي:



د دې قندونو د پېژندګلوی، او له نورو مرکبونو څخه د دې مرکب دیلولو لپاره د فېلنګ لېسټونونو کې څخه کار اخیستل کېږي کوم چې د ګلوکوز سره قرمزي رسوب تشکیلوي:




فرکتوز هم د ګلوکوز په شان اکسیدي کېږي؛ خو د هغه هایدروکسيل ګروپ اکسیدیشن کېږي، د هغه ډاکسیلېشن یوه برخه په لاندې ډول ده:



عمومي خواص

- 1- د پولي سکرایډونو عمومي فورمول له $(C_6H_{10}O_5)_n$ څخه عبارت دی.
 - 2- د نباتاتو په تخمونه او تیغونو کې پیدا کیږي .
 - 3- پولي سکرایډونه هغه مواد دي چې د کرسټال کیدو وړتیا نه لري او پرته له مزي دي . دا مرکبونه په اوبو او الکولو کې نه حل کیږي ؛ که چېرې هایډرولیز شي ، په مونو سکرایډونو بدلیږي:
- مهم پولي سکرایډونه عبارت له: نشایسته (Starch) ، گلایکوجن (Glycogen) ، سلولوز (Cellulose) او دکستین (Dextrin) دي.
- نشایسته (Starch)**

د پولي سکرایډونو له مهمو مرکبونو څخه یوه هم نشایسته ده چې د گلوکوز د مالیکولونو د ترکیب د گلایکوسایډي اړیکې پر بنسټ تشکیلېږي ، جوار ، کچالو ، وریجې ، د نباتاتو تخمونه او ربړني د نشایستي مهمې سرچینې دي . نشایسته د خوارو بڼه سرچینه ده چې د هغې هر مالیکول له زرگونو گلوکوز مالیکولونو څخه جوړ شوی دی ، د فورمول یوه برخه یې په لاندی ډول ده :



څرنگه چې ویل شو، نشایسته په اوبو کې نه حل کیږي ؛ که چېرې له اوبو سره یوځای تودوخه ورکړل شي ، د هغوی هایډولیز ترسره کیږي او په یو قیمته قندونو توپه کیږي . نشایسته د فهاڼګ بڼو دوزنکي ارجاع کوي او که چېرې له ایوډین سره یوځای شي ، د اوبو رنگه محلول جوړوي . دا چې په دې مرکب کې د $-OH$ - گروپونه زیات شته دي ؛ نو د اوبو بڼه جذبوزنکي دي ، د تودوخې د ورکولو په پایله کې د نشایستي هایډرولیز ترسره کیږي او د هایډرولیز محصول یې گلوکوز دی:






شکل: الف کچالو د نشايستې سرچينه ب - ووی د نشايستې سرچينه

گلايکوجن (Glycogen)

گلايکوجن حيواني نشايسته ده چې د حيواناتو په ځيگر کې شته او حيوانات د انرژي د ذخيرې نقش لري. هغه دخواړو کاربو هيدريتونه چې په انرژي تبديل شوي نه وي ، په ځيگر کې په گلايکوجن تبديل او توليدوي ، د گلوکوز د واحدونو شمير په گلايکوجن کې سلگونو عددونو ته لوړېږي. د گلايکوجن د پيچليو جوړښتونو يوه برخه د 1،4 او 1،6 له يوځاي کيدو سره په لاندې ډوله ده :




شکل: د گلايکوجن د مغلق جوړښت يوه برخه د او د يوځاي کيدو سره 1،4 او 1،6.

سلولوز (Cellulose)

د مهمو پولې سکرايدونو څخه يو هم سلولوز دی چې د گلوکوز د ماليکولونو د يو ځای والي په واسطه او د گلايکوزيد اړيکې پر بنسټ جوړ شوي دي او د 350 مونو ميرونو واحدنه لري، د هغه ماليکولي کتله 500000 ته رسېږي . د سلولوز اندازه په طبيعت کې ډيره زياته ده، د نباتاتو د حجرو د يوال له دې مرکب څخه جوړ شوی دی . د سلولوز مهمې سرچينې لرگي ، وانه ، کتان او کنف دي. سلولوز امورف (Amorph) ماده ده چې په او بو کې نه حل کېږي ، دا مرکب د نورو پولې سکرايدونو پر خلاف د تيزابونو او القيو سره له ځانه غښتلتيا ښيي،



خو د تو دوخي او لوړ فشار په شتون کې د نړيو تيرابونو په واسطه هايډروليز کيږي او په گلوکوز بدليږي:



(9_12) شکل: لرگي د سلولوز د پولي ميرونو ډول

2_12: پروټينونه

پروټينونه د پولي ميرونو له طبيعي ډولونو څخه دي چې د انسانانو اورگانيزم بې تر 15% جوړ کړی دی او په بدن کې ډيرې دندي ترسره کوي. رشتوي پروټينونه (Tibrus proteins) د بدن د پوستکي او نسجونو بنسټيزې اجزاوې دي او نور پروټينونه په ميعاتو او وينې کې هم شتون لري چې حجرو ته د اکسيجن ، شحمياتو او نورو موادو د لېږلو لامل شوي دي او د ميتابوليزم په عمليې کې برخه اخلي ؛ همدارنگه هارمونونه ؛ لکه: انسولين او انزايمونه د پروټينونو له ډولونو څخه دي . پروټينونه د خوراکي توکو بنسټيزې اجزاوې دي ، خوراکي ډير مواد پروټين لري ، سره خوښه ، سابه ، جويات ؛ لکه : نخود او لوبيا له پروټينونو څخه ډک دي . د خوړو موادو پروټينونه د اورگانيزم او د هاضمي سيستم کې په کوچنيو اجزاوو ؛ يعنې په امينو اسيدونو توپه کيږي او دا امينو اسيدونه په حجرو کې بيرته د بدن د اعضاو په ضروري پروټينونو بدليږي ؛ څرنگه چې د پروټينونو بنسټيزې اجزاوې ، امينو اسيدونه دي ؛ پردي بنسټ د امينو اسيدونو په هکله بايد معلومات وړاندې شي :


12_3: امينو اسيدونه (Amino acids)

که چيرې دکاربوکسيلک اسيدونو دکاربونونو او يا څو هايډروجن اتومه د NH_2 - (امين) په واسطه بې ځايه شي ، دهغوی اړوند امينو اسيدونه لاس ته راځي ؛ د بيلگې په ډول : $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ د امينو اسيدونو يو ډول دی چې د امين د گروپ په واسطه د اسټيک اسيد د ميتال د پاتې شوني يو اټوم هايډروجن د بې ځايه کيدو په پايله کې لاس ته راغلي دي .




د امینو اسیدونو نوم ایښودنه


سره له دې چې د بیو کیمیا پوهانو د امینو اسیدونو لپاره مروجي (Trivel) نومونه ټاکلي دي؛ خو کیدای شي چې د امینو اسیدونو نوم ایښودنه په سیستماتیک ډول هم ترسره شي، د ځینو امینو اسیدونو مروجي نومونه په لاندې ډول دي:





له دې دوو امینو اسیدونو نړیواله نوم ایښودنه له لاندې لیکني سره سم ترسره کېږي: دا چې الاین د Propanoic acid ایستل شوي دي او د NH_2 -گروپ په 2 نمبر کاربن کې ځای لري. (د کاربوکسیل د گروپ کاربن باید تل فیر کوڅني نمبر ځانته غوره کړي) پر دې بنسټ د الاین سیستماتیک نوم عبارت دی له:



دیادولو وړه دا چې د COOH -گروپ تل د زنځیر په یوې نوکي کې ځای لري. د کاربن اټوم چې د COOH -له کاربن سره اړیکه لري، د الفا (α)، بل کاربن د بیتا (β) او همدارنگه گاما (γ) په نومل شوي دي:




امینو اسیدونه چې د NH_2 -گروپ د الفا α په کاربن نښتلي وي، د α amin oacides په نوم یادېږي او که چېرې د بیتا β په کاربن نښتلي وي د β amin oacides په نوم یادېږي او که چېرې د γ په کاربن باندې ځای ولري د γ - امینو اسید (γ amin oacides) په نوم یادېږي:




د امینو اسیدونو خواص

د امینو اسیدونو په ترکیب کې د NH_2 - او COOH - ډگروپونو د شتون له کبله دا مرکبونه امفوتریکه ځانګړتیاوې لري؛ یعنې هم تیزابي خواص او هم قلوي خواص لري. له ګلايسین سره د سوډیم هایدروکساید تعامل په لاندې ډول ګورو:



په تیزابي محیط کې امینو اسیدونه په لاندې ډول لیدل کېږي:




امینو اسیدونه په جامد حالت کې د دوه قطبي ايون په بڼه ځان ښکاره کوي، داسې چې د هغوی د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیلیټ د ايون په بڼه (COO^-) او د هغوی د امین ګروپ د امونیوم (NH_3^+) د ايون په بڼه ښکاره شوي دي چې د امفای ايون (Amphion) یا سویتر (Zwitter ion) په نوم یادېږي:




شکل: ۱۰_۱۲) ماهي د پروټین مهمه سرچینه

(1_12) جدول 20 مهم بيولوزيڪي امينو اسيدونه

نوم	معمولي نوم	سمبول	فورمول
گلايسين	Glycine	Gly	$\begin{array}{c} \text{H} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
الائين	Alanine	Ala	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
والين	Valine	Val	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \end{array}$
ليوسين	Leucine	Leu	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \end{array}$
ايروليوسين	Isoleucine	Ile	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \end{array}$
سيرين	Serine	Ser	$\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2$
تيريوئين	Threonine	Thr	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{C} - \text{H} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{NH}_2 \end{array}$
سستين	Cysteine	Cys	$\text{HS} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2$
ميتيونين	Methionine	Met	$\text{CH}_3 - \text{S} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2$
اسيداسپارٽيڪ	aspartic acid	asp	$\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2$
اسپارٽين	Asparagine	Asn	$\text{H}_2\text{N} - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2$

گلو تا میک اسید	Acideglutamiqae	Clu	$\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2
گلو تا مین	Glutamin	Cln	$\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2
لیسین	Lysine	Lys	$\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2
ارژنین	Arginine	Arg	$\text{H}_2\text{N}-\text{C}(=\text{NH})-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2
فیل الاین	Phenylalanine	Phe	 $\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2
تیروزین	Tyrosine	Tyr	$\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2
تریپتوفان	Tryptophane	Try	 $\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2
هیستیدین	Histidine	His	 $\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2
پروлін	Proline	Pro	

پروټينونه ځانگړو دجوړښتونو د واحدونو لرونکي دي چې له امينو اسيدونو څخه عبارت دي. د ټولو پروټينو موجوداتو پروټينه له امينو اسيدونو څخه جوړشوي دي. د پروټينونو په جوړښت کې له شلو (20) څخه ډير امينو اسيدونه برخه لري او د پېچلو پولي ميرونو له ډلو څخه دي؛ نو نايون هم د پولي ميرونو د ډولونو څخه دي؛ خو د هغې په ترکيب کې يوازې يو ډول مونو مير شامل دي. د انسانانو د بدن ارگانونه د پنځلس (15) ډولو امينو اسيدونو دجوړولو توان لري، ترڅو د هغوي په واسطه خپل ژونده دوام ورکړي؛ له دې کبله د بنسټيز امينو اسيدونو په نوم يا ډيري. هغه ماليکولونه چې له دوو امينو اسيدونو څخه جوړ شوي دي، د پېتايد په نوم يا ډيري.



د CO-NH - اړیکه د پیټایډي اړیکې په نوم او وروستی امینو اسید د پاتې شوو موادو او یا د Residue په نوم یادوي، د پیټایډونو زنځیر دسل گونو څخه د ډیرو وروستو بڼاخ لرونکو څخه جوړ شوي دي او د پیټایډی اړیکو په واسطه یې نظم تر لاسه کړی دی ، ډیولي پیټایډ زنځیر چې وروستی ونه لري ، داولیگو اسید په نامه یادېږي ، د پولی پیټایډي هغه امینو اسیدونه چې د هغو په سرونوکې COOH - دوه گروپونه شتون ولري ،په اولینو محلولونوکې لوړ تیزابي خاصیت لري چې بیلگه یې د (1_12) جدول په پام کې نیولو سره کیدای شي اسپاراکیټک اسید او گلوټامیک اسیدو وړاندې شي ، که د COOH - گروپ په اُماید $\text{O}^{=}$ (C-NH_2 -) او گلوټامین تبدیلېږي.

که چیرې د NH_2 – گروپونه د COOH – گروپونو څخه زیات وي، دا ډول امینو اسیدونه د قلوي امینو اسیدونو په نوم یادېږي چې په اوبلو محلولونو کې قلوي pH لرونکي دي، د ارثین امینو اسید په ځانګړي توګه د انسانانو په سپرم او د مذکور ماهیانو په تناسلي سپین رنگه مایع کې شتون لري .

سیستین (Cysteine)، د سلفر لرونکو امینو اسیدونو له ډولونو څخه دي چې د هغه زنجیر په $\text{S} - \text{H}$ پای ته رسېږي او میتیونین (Methionine) د سلفر لرونکو امینو اسید و بل امینو اسید دي چې په هغه کې سلفر د $\text{S} - \text{CH}_3$ وظیفه یی ګروپ په ښه شتون لري ، دا امینو اسید په ژونديو موجوداتو کې د بدن د اعضاوو د اکسیدیشن او ریداکشن ګرڼه کنټرول او بنسټیز ډول لوبوي، چې له دې ځای نور امینو اسیدونه

نیولی نه شي . زیات امینو اسیدونه الیفاتیکی کاربني زنځیرونه لري ؛ خو د میتیل الاین، تایروزین او دتريټوفان امینو اسیدونه له یوې اروماتیکی هستې جوړشوي دي چې د هغوی پېژندنه د نایتریک اسید په واسطه ممکنه ده . دا امینو اسیدونه د نایتریک اسید سره تعوضي تعاملونه ترسره کوي او د نایټرو مرکبونه جوړوي؛ نو له همدې کبله ده چی که لاسونه په نایتریک اسید سره ککړ شي ، په پایله کې د لاسونو د پوستکي رنگ ټیږیږي. که چیرې د چرگانو د هگيو سپین هایدرولیز شي ، اروماتیک امینو اسیدونه لاس ته راځي.


په پروټینونو باندې د پیټایدونو تبدیلول

د یو ډای پیټاید د COOH - گروپ د نوي امینو اسیدونو له NH_2 - گروپ سره تعامل کوي، په ترای پیټاید بدلون مومي او بیا هم د هغه د زنځیر په پای کې د COOH - گروپ شتون لري چې هغه هم په خپل وار سره د نورو امینو اسیدونو له NH_2 - گروپ سره تعامل کوي او په پایله کې پیټایدونو په پروټینونو تبدیلیږي. که چیرې داسې مالیکولونه له 35 څخه لږ امینو اسیدونه ولري ، بیا هم د پیټایدونو په نوم یا ډیری او که له دې شمیر څخه لوړ وي ، د پروټین په نوم یادېږي. ځینې پروټینونه هم شته چې له شپږو شست زرو (26000) څخه زیات امینو اسیدونه لري او د مالیکول کنټله یې 40000 g/mol ده.

په رښتیا چې پروټینونه مکرو مالیکولونه دي او د یو پروټین لومړنی جوړښت د هغوی دجوړوونکو امینو اسیدونو او د هغه تنظیم په واسطه چې امینو اسیدونه یې یو له بل سره تړلي دي ، ټاکل کیږي ؛ د بیلگې په ډول : د یو ترای پیټاید جوړېدل چې د درې امینو اسیدونو الاین ، سیرین او سیستین څخه جوړ شوی دي ، په پام کې ونیسئ چې په شپږو لارو یو له بل سره یو ځای کیږي:


Ala	Ser	Cys	Ala	Cys	Ser
Ser	Cys	Ala	Ser	Ala	Cys
Cys	Ala	Ser	Cys	Ser	Ala

د دې درې پروټینونو جوړښت په بشپړه توګه یو له بل څخه توپیر لري (سره له دې چې د هغوی لومړنی مواد سره یو شان دي)، د فزیکي او کیمیايي بیلابیل خواص لري، له دې ساده نمونې په پام کې نیولو سره کیدای شي، وویل شي چې: د طبیعت شل فعال بیولوژیکي امینو اسیدونه دي چې یو شمیر څخه زیات پروټینونه یې جوړکړي ، د هغوی شمیر د حیواناتو او نباتاتو په عالم کې 10^{12} پورې ټاکل شوي دي.



شکل 11_12: د پروتئينونو بڼه:

دا لاندې تعامل د الاین او کلاسین د ډای پروتینونو جوړیدل ټاکي:



4_12: ډای اکسي رايوز نوکليوټيک اسيد (D.N.A) او رايوز نوکليوټيک اسيد (R.N.A)

ڊير پيچلی عضوی مالیکول ډای اکسي رايوز نوکليوټيک اسيد (D.N.A) دی چې د ژوندي اورگانيزم د ټولو حجرو په هستو کې شتون لري چې د بيلايلو پروټينونو د توليد او جنيتکي خبرتياوو د ليږلو (وراثت) لپاره له يونسلم څخه بل نسل ته ، دنده تر سره کوي. د انسانانو د D.N.A مالیکول ډير لوی دی او د هغه اوږد والی له هستي څخه د وتلو وروسته دوه مترو ته رسېږي. د رايوزنو کليک اسيد (R.N.A) مالیکول د D.N.A په مالیکول ته ورته دی ؛ خو له هغه څخه کوچنی دی. دامالیکول ټول شوي ارثي خبرتياوي چې د D.N.A په واسطه ټولېږي ، له هستي څخه بهر ته لېږي.

D.N.A د جوړښت د پيژندلو ډيره ښه لاره د هغه د لومړنيو موادو د جوړښت د څيړنو لاره ده. D.N.A له هغو پولي ميرونو څخه دی چې په هغه کې د رايوز د قند بل شوي مالیکولونه د د فورانونز تکراري واحدونو په جوړښت کې شامل دي ، د رايوز بل شوی جوړښت چې فورانونز ورته ويل کېږي ، د اکسيجن د هغه انوم د لړۍ کولو څخه چې د کاربن سره اړيکه لري ، عبارت دی ، په دې حالت کې رايوز په دې اکسي رايوز مالیکول تبديليږي چې د هغه فورمول په لاندې ډول دی:




(b)

(a)

ريوز Ribose

ډاکسي ريوز Deoxyribose

په D.N.A کې مونوميرو دی اکسي رايوز دی. د هغه په لومړي نمبر کاربن کې نايټروجن لرونکي القلي بنسټي دي چې د کوولانت اړيکه يې جوړه کړې ده، (په دې ډول القليو کې نايټروجن خپل ازاد الکترونونه له لاس نه ورکوي) دا القلي مرکبونه عبارت دي له:





ډير پيچلي مشتقات


د پورين مشتقات


څرنگه چې ليدل کېږي، دلته القلي پنځه ډوله دي ،څلور ډوله يې په D.N.A کې شتون لري او د I،G،A او

له Cy څخه عبارت دي چې دی اکسی رابوز نوکلئیک اسید د لومړني کاربن سره اړیکه لري:




د پورتنۍ تعامل له تر سره کیدو څخه وروسته ، د فاسفوریک اسید تعامل له دې اکسي رابوز نوکلئیک اسید سره تر سره کېږي چې د DNA مالیکول اسکلیت جوړوي، په لاندې فورمول کې د پولې نوکلئیک اسید د زنځیر یوه برخه وړاندې شوي ده چې په هغه کې د ایستر د هر فاسفیت اړیکه د 3 او 5 کاربن سره په منظمه بڼه تکرار شوي ده:





..... هایدروجنی اریکه





د دولسم څپرکي لنډيز:

- * هغه ماليکولونه چې د څوکو چټور ماليکولونو له یوځای کیدو څخه جوړ شوي دي ، د یوې میر په نامه او هغه کو چېني ماليکولونه چې پوېلي میرونه جوړوي ، د مونومرونو (Monomers) په نوم یادیږي.
- * کاربو هایدريتونه د ژوندانه مهم مرکبونه دي چې زموږ د ورځني ژوند په بیلا بیلو برخو کې په کار وړل کېږي.
- * کاربو هایدريتونه د کاربن د هایدريتونو په نوم هم یادیږي ، څرنگه چې د هغوی ساده فارمول $C_m(H_2O)_n$ یا $C_mH_{2n}O_n$ دی ؛ پردي بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه لیدل کېږي . گلوکوز د الکولو او الډیهایډو د وظیفه یي گروپونو لرونکي دي او لږ څه لوړ او د کربو اوکری کیدو زنجیر لري.
- * کاربو هایدريتونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې د ساده او پیچلو څخه عبارت دي . ساده قندونه (Simple sugars) د مونو سکرایډونو د دوو مالیکولونو د اتحاد ، تراکم او د دې هایدريشن څخه د ډای سکرایډونو مالیکول لاس ته راځي چې د دوو مونو سکرایډونو په منځ کې یو اکسیجنې پل تړل کېږي . د ډای سکرایډونو عمومي فورمول $C_{12}H_{22}O_{11}$ دی.
- * یوې سکرایډونه د پیرانوز گلوکوز د واحدونو یو بل سره د یوځای کیدو او دهغوی د دې هایدريشن په پایله کې تشکیلېږي چې نشایسته او سلولز په کې شامل دي.
- * پروټینونه د یوې میرونو له طبیعي ډولونو څخه دي چې د انسانانو اورگانیزم یې تر 15% جوړ کړی دی او په بدن کې فوري دندې ترسره کوي.
- * که چېرې د کاربوکسلیک اسیدونو د کاربنونو یو او یا څو د هایدروجن اټومه د NH_2 - (امین) په واسطه یې ځایه شي ، د هغوی اړوند امینو اسیدونه لاس ته راځي.
- * د امینو اسیدونو په ترکیب کې د NH_2 - و $COOH$ - گروپونو د شتون له کبله دا مرکبونه امفو ترکیک ځانگړتیاوې لري ؛ یعنې هم تیزابي خواص او هم قلوي خواص لري.
- * د پروټینونو په جوړښت کې له شلو (20) څخه ډیر امینو اسیدونه برخه لري او د پیچلو پوړلي میرونو له ډلو څخه دي.
- * که چېرې مالیکولونه له 35 څخه لږ امینو اسیدونه ولري ، بیا هم د پیټایډونو په نوم یادیږي او که له دې شمیر څخه لوړ وي ، د پروټین په نوم یادیږي.
- * ډیر پیچلی عضوي مالیکول ((ډای اکسي رابوز نوکلئیک اسید D.N.A)) دي چې د ژوندي اورگانیزم د ټولو حجرو په هستو کې شتون لري او له بیلا بیلو پروټینونو د تولید او جینیکي خبرتیاوو د لېږلو (وراثت) لپاره له پورنسل څخه بل نسل ته دنده ترسره کوي .
- * د رابوزنو کلیک اسید (R.N.A) مالیکول د D.N.A مالیکول ته ورته دی ؛ خو له هغه څخه کوچنی دی . دامالیکول ټولې شوي ارثي خبرتیاوې چې د D.N.A په واسطه ټولېږي ، له هستې څخه بهر ته لېږي.

د دولسم څپرکي تمرین:


- 1- کوم شیان په کور کې ونږي چې کاربو هایدريتونه په هغوی کې شامل دي ؟ د هغوی ډیر شمیر نومونه واخلئ.
- 2- کوم کاربو هایدريتونه د انسانانو په ژوندانه کې مهم دي ؟ د هغوی نومونه واخلئ .
- 3- کوم کاربو هایدريتونه په خپله شاوخوا محیط کې گوري ؟ د هغوی نومونه واخلئ .
- 4- د فوټو سنتیز معادله په صحیح بڼه ولیکئ او د هغې د لومړنیو موادو نومونه واخلئ.
- 5- کاربو هایدريتونه د کومو وظیفه یي گروپونو پر بنسټ یو له بل څخه توپیر کېږي ؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ.
- 6- کوم اکسیدایز کوونکي کیدای شي چې د کاربو هایدريتونو د اکسیدیشن لپاره وکارول شي ، تر څو کاربوکسلیک اسید په لاس راوړل شي ؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ .
- 7- د امینو اسیدونو او پروټینونو عمومي فورمول ولیکئ او په اړه یې رڼا واچوئ.



- 8- د امينو اسيد او پروتين ترمنځ توپير څه شی دی ؟ په دې اړه څېړنې وکړئ.
- 9- څو مهم امينو اسيدونه چې د ژونديو موجوداتو په اورگانيزم کې شته دي ، نومونه يې واخلئ.
- 10- د الاین د امفي ايون بڼه وليکئ.

څلور ځوابه پوښتنې :

- 1- کاربو هایدريتونه مرکبونه دي چې الیهايدي يا کيتوني گروپ لري.
الف - ایستر ب - اتر ج - پولي ایستر د - پولي الکولونه
- 2- له لاندي فورمولونه کوم يو کاربو هایدريتونه رابښي ؟



- الف- يوازي III ب- يوازي II ج- I او II د- هـ- ټول
- 3- د گلوکوز تعامل د خمير ماڼي په شتون کې په لاندي ډول دي:



خومره ايتال الکول به له 6% ، 90g گلوکوز څخه حاصل شي ؟

- الف- 13/8 ب- 18/4 ج- 23 د- 32/2

- 4- د مونو سکر ايډونو په فورمول کې کوم گروپونه شته ؟

- الف- الیهايډ ب- کيتوني ج- هایدروکسيل د- ټول

- 5- د رايبوز نوکلېک اسيد (R.N.A) د مالیکول که ورته ؛ د هغه په نسبت کوچنی دی:

- الف- D.N.A ب- ATP ج- الف او ب دواړه د- هيچ يو

- 6- د $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$ نوم عبارت دی له:

- الف- Alanine ب- الاین ج- الف او ب دواړه د- هيچ يو

- 7- پروټينه په ټاکلي جوړښت واحد لرونکی دي چې څخه عبارت دي.

- الف- امايدونو ب- اولیگو اسيدونه ج- امينو اسيدونه د- امونيا

- 8- د شمير بيالوجيکي فعالو امينو اسيدونه کولای شي چې ډير زيات امينو اسيدونو جوړ کړی دي.

- الف- 100 ب- 20 ج- 16 د- 10^{12}

- 9- د پروټينونو ټاکلي شمير چې د طبيعت د فعالو بيالوژيکي امينو اسيدونو څخه جوړ شوي دي:

- الف- 10^{12} ب- 110 ج- 20000 د- 400000

- 10- د مونو سکر ايډونو په مالیکولونو کې د کاربن د اتومونو شمير د تر دي:

- الف- 20 تر 30 ب- 20 تر 40 ج- 3 تر 9 د- 10 تر 20 پورې.

- 11- د يو ډاي پېټايډ د COOH - گروپ د نورو امينو اسيدونو له NH_2 - گروپ سره تعامل کوي او په

- تبدليږي. الف- تراي پېټايډ ب- پېټايډ ج- امينو اسيد د- هيچ يو

- 12- د امينو اسيدونو په ترکيب کې د NH_2 - و COOH - گروپونو د شتون له کبله ده چې دا مرکبونه د

- خاصيت لري: الف- دوه گوني ب- تيزابي او قلوي ج- امفوترېک د- ټول ځوابونه صحيح دي.



په دولسم څپرکي کې د پولي ميرونو په هکله معلومات وړاندي شول، په دې پوره شو چې پولي ميرونه په دوه ډوله وېشل شوي دي چې طبيعي او مصنوعي پولي ميرونه دي. د طبيعي پولي ميرونو په اړه په تير څپرکي کې معلومات وړاندي شوي دي؛ خو د مصنوعي پولي ميرونو په هکله معلومات وړاندي شوي نه دي، په دې څپرکي کې لرو چې مصنوعي پولي ميرونه کوم دي او څرنگه کيدای شي چې پولي ميرونه په مصنوعي ډول لاس ته راوړل شي؟ مهم مصنوعي پولي ميرونه کوم دي؟ له مصنوعي پولي ميرونو څخه په کومو برخو کې کيدای شي چې گټه واخيستل شي؟

په دې څپرکي کې د متر اکم شوو او جمعي پولي ميرونو په اړه به معلومات لاس ته راوړو، د ژوندانه په چارو کې د هغوی دکارولو ځايونو په هکله به معلومات حاصل کړو.

1_13: جمعی پولي میرونه

که چیرې د پولي میرونو واحلونه (مونومیر) یو له بل سره یوځای شي، داسې پولي میرونه لاس ته راځي چې د جمعی پولي میرونو له ډولونو څخه دي (1_13). جدول جمعی پولي میرونه، مونومیرونه او د هغوی د کارولو ځایونه ښيي. پولي میرونه هغه توکي دي چې داسې مونومرونو څخه جوړ شوي دي، کوم چې د هغوی د مالیکول په جوړښت کې د جوړوونکو عنصرونو اتومونو تر منځ دوه گونې اړیکه شتون لري او دا دوه گونې اړیکه د پولي میرونېشن (Polymerization) د عملې په واسطه په یوه گونې اړیکه بدلون مومي:



(1_13) جدول د جمعی پولي میرونو او د هغوی د مونومرونو ځینې بېلگې

کارول	ډیولیمیر نام	د پولي میر فورمول	نوم او د مونومیر فورمولونه
پایپ، پلاستيکي بوتلونه	پولي ایتیلین	$-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n-$	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ Ethylene
فرشونه، پلاستيکي بوتلونه	پولي پروپیلین	$-\left[\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \right]_n-$	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ propylene
پایپ، سیرامک، دکوټو فرش، کالي	پولي وینایل کلراید	$-\left[\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \\ \\ \text{Cl} \end{array} \right]_n-$	$\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ Vynylchloride
قالین او د اوبدلو دستگاه	پولي اکریل نایتریل (PAN)	$-\left[\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \\ \\ \text{CN} \end{array} \right]_n-$	$\text{CH}_2 = \text{CH}$ CN Acrylnitril
ناسوز پوښونه	پولي تترا فلورو میتیلین	$-(\text{CF}_2 - \text{CF}_2)_n-$	$\text{CF}_2 = \text{CF}_2$
بطري او د کورو وسایل	پولي میتیل مینا اګریلت	$-(\text{CH}_2 - \text{C}(\text{CH}_3)(\text{COOCH}_3))_n-$	$\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$ Methylmethacrilat
د تودوخې نه تیروونکي، د لویو سامانونه، مصنوعي زبر،	پولي بیوتادین او پولي سټیرین (SBR)	$-(\text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_2)_n-$ $\left[\begin{array}{c} \\ \text{CH}_2 - \text{C}(\text{CH}_3) \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} \right]_n$	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$ Butadiene $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)$ Styrene

13_1_1: پولي ايتيلين

که چيرې د ايتلين ماليکولونه د تودوخې په 250°C او په $3000\text{ atm} - 1000$ فشار او د عضوي پر اکسايډونو په شتون کې پولي ميرازيشن شي ، پولي ايتلين (Polyethylene) لاس ته راځي ، د هغوی د تعامل ميخانيکيت داسې دی چې عضوي پر اکسايډونو $(\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R})$ ته تودوخه ورکوي چې په پايله کې په دوه راډيکالونو باندې چې په $2\text{R}\bullet$ نږدې کېږي ، بدلون مومي:



نوموړي راډيکالونه د ايتلين له ماليکول سره تعامل کوي ، په پايله کې نوي راډيکالونه په لاندې ډول تر لاسه کېږي :





له پورتنیو ډولونو سره سم حاصل شوي راډيکالونه په وروستيو پړاونو کې د ايتلين له بل ماليکول سره تعامل کوي او دا عمليه پرله پسې دوام مومي:




د ايتلين د مونو مير ډيولي مير ډيوليزن معادله په لاندې ډول ليکل کېږي:




په دې فورمول کې د n قيمت ډير لوي دي چې سلگونو ته رسېږي . پولي ايتلين د هومولوگ پولي مير (Homo polymer) له ډوله دي چې له يو عين مونو مير څخه جوړ شوي دي ؛ نور هوموپولي ميرونه عبارت له پولي وينايل کلورايد ، پولي تترا فلورايد او پولي ستايرن څخه دي چې د راډيکالو تعاملونو پر بنسټ تشکيلېږي ، د هغوی عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي:



Polystyrene



poly vinylchloride(PVC)




poly tetrafluoride ethylene (Teflon)



د پولی ایتیلین او د نښتو پولی میرونو بیلابیل شکلونه:

په لاندې شکل د پولی ایتیلین بیلابیلې بڼې ښودل شوي دي چې د هغوی له ډلې څخه پولی ایتیلین د لوړ کثافت (high-density poly ethylene) دي او په HDPE ښودله شوي دي، دا پولی میرونو اوږد زنجیر لري او د لوړ کثافت لرونکي دي؛ له دې کبله یې مالیکولونه یو د بل له پاسه په نښتې بڼه شتون لري او ترې دي، دا پولی میرونو شمېر او جوس په پلاستيکي قطبیت کې په کار وړل کېږي؛ ځکه دا پولی میرونو (HDPE) کلک دي. د پولی ایتیلین بل ډول د (Low-density poly ethylene LDPE) پولی ایتیلین په نوم یادېږي چې ټیټ کثافت لري او ښاخ لرونکي (لشعاعي) زنجیر لري چې د هغه کثافت د HDPE له کثافت څخه ټیټ دی، دا پولی میرونو پلاستيکي کڅوړو په جوړولو کې په کار وړل کېږي.




(1-13) شکل د بیلابیل کثافت لرونکو پولی ایتیلینونو څخه جوړ شوي لوبښي:


یو بل ډول پولی ایتیلین هم شته چې د کروس لینکد پولی ایتیلین (Cross-linked poly ethylene) په نوم یادېږي او په CPE ښودل کېږي، دا پولی ایتیلین داسې جوړېږي چې له دوو څنګ پر څنګ مالیکولونو څخه د هایډروجن یو، یو اټوم جلا کېږي؛ بیا دا دوه مالیکولونه یو له بل سره یوځای کېږي، له دې دوو یوځای شوو مالیکولونو څخه لاس ته راغلي پولی میرونو ترې پولی میرونو په نوم یادېږي او د HDPE د پولی میرونو په نسبت ډیر کلک دي چې له هغه څخه کلک او غښتلي شیان جوړوي.

2_1_13: ربر

د طبیعي مهمو پولي میرونو څخه یو هم ربر دی چې د ایزوپرين (Isoprene) د مونومیر د رادیکالي تعامل په پایله کې لاس ته راځي، د ایزوپرين دوه ډوله پولي میرونه شته چې د هغوی د ایزومرونو پورې تړلي دي او هغه عبارت د سیس او ترانس (cis and trans) ایزومیري دي چې په لاندې ډول لاس ته راځي:




د پولي میرايزشن په عملیه کې خو دواړه ایزومیري سیس او ترانس (cis and trans) په مخلوطه بڼه حاصلیږي، طبیعي ربر د سیس ایزومیري پولي میر دي چې د هیوا له ونې څخه لاس ته راځي. طبیعي ربر نښلونکې ماده ده چې د هغه ارجاعي وړتیا لږه ده، د همدې لامل له کبله په فابریکو کې له هغه څخه دومره ګټه نه اخیستل کیږي.




شکل: (2_13) د هیوا ونه، د طبیعي ربر سرچینه

کله چې طبیعي ربر ته له سلفر سره تعامل ورکړل شي؛ نو د هغه کیفیت لوړیږي چې کلک ربر لاس ته راځي او دوام یې زیاتېږي چې دا تعامل د (Vulcanisation) (هغه تعامل دی چې د موادو ترمنځ اړیکې زیاتوي او د موادو د نښلیدو ځانګړتیا ټیټوي؛ خو غښتوالی او ټینګوالی ډیروي) په نوم یادیږي:





لومري خل امريکايي عالم چارلس گوديار (Charles Goodyear) په 1839 م. کال کې Vulcanisation عملیه په طبيعي ربر باندې ترسره کړه چې نښلونکي او ماتيدونکي طبيعي ربر ته يې بدلون ورکړ او په کلک او غښتلي ربر يې تبديل کړ، د لاس ته راغلي ربر خواص، د هغه سلفرو مقدار پورې اړه لري، کوم چې په انزوېرين کې ور زياتېږي، که چېرې د ور زيات شوي سلفر اندازه له 1% تر 5% څخه پورې وي نو لاسته راغلی ربر نرم وي چې له هغه څخه دست کشو، د ټايرونو دښه ټيوپ او په نورو ځايو کې په کارول کېږي. که چېرې د سلفر اندازه د 30% پورې وي، ددې ربر غښتلتيا ډيره ده او له هغه څخه د موټرو د ټايرونو په جوړولو کې گټه اخيستل کېږي.

په 1920 م. کال کې الماني عالم کارل زيگلر (Karl ziegler) لومړی خل مصنوعي ربر د پولي ميرايښتن تعامل پرېنست د پيتروليم له بيوتادين څخه په لاس راوړ، لاس ته راغلي ربر يې په BuNa وښود، دلته Bu د بيوتادين او Na له سړدیم څخه نماينده گي کوي کوم چې په دې تعامل کې د کنست په توگه کارول شوی دی:



د بيوتادين د پولي مير په لاس ته راوړلو سره د موټرونو د جوړولو صنعت پرمختگ وکړ چې ټايرونه او د موټرو دښه او باندنيو سامانونو په جوړولو کې له همدې ربر څخه کار اخيستل کېږي. د پولي ستيارين - بيوتادين (Styrene-butadiene) بل مصنوعي ربر دی چې په (SBR) ښودل شوي دي، يو کوپولي مير دي، دا ربر له دوو بيلابيلو مونو ميرونو څخه جوړ شوی دی:






شکل: 3_13) پولي ستايرين بيوتادين (PolyStyrene-butadiene)

نيوټرين د مصنوعي ربر بل ډول دی چې د طبيعي ربر په ځای له هغه څخه گټه اخيستل کيږي ، دا ربر د



2 - کلوروبيوتادين (2chlorobuta diene) له پورلي ميراييزيشن څخه لاس ته راځي او مونومير يې ايزوپرين ته ورته دي ؛ خو دايزو پرين د ميتايل پاڼي شوني په کلورو پرين کې په کلورين تعويض شوي دي ، د هغوی فورمولونه په لاندې ډول دي:



Isoprene

2-chlorobutadiene


په دې مونومير کې د کلورين شتون د غوړيو او عضوي محلولونو پر مقابل کې د هغه د غښتوالي د زياتيدو لامل گرځيدلي دي، د هغه پولي ميراييزيشن په لاندې ډول دی:



شکل: 4_13) د موټرونو په ټایرونو کې مصنوعي ربر


2_1_13: پولي ستايرين

که د ايتلين د هايډروجن يو اټوم د بنزين په کړۍ باندې تعويض شي، د ستايرين مونومير لاس ته راځي چې فورمول يې په لاندې ډول دی:




د ستیارین له پولی میرلینشن څخه پولی ستیارین لاس ته راځي چې په لاندی ډول ښودل کیږي:

Styrene Poly styrene



پلاستیکونه له پولی ستیارین څخه جوړ شوي دي ، پلاستيکي لوښتي او د کور د اړتیا نور توکي له دي پولی میر څخه جوړ شوي دي.



شکل: د پولی ستیارین څخه جوړ شوي لوښتي (5_13)

2_13: متراکم شوي پولی میرونه (Condensation Polymers)


پولی میرونه چې په تیرو لوستونو کې مطالعه شول ، د جمعي پولی میرونو له ډولونو څخه دي چې په هغوی کې د مونو میرونو ټولې برخې پرته د کمښت شاملې دي ؛ خو په متراکم شوی پولی میرونو کې د مونو میرونو ځینې برخې ونډه نه لري ، دا جلا شوي برخې په عمومي توګه اوبه دي چې د تراکم د عملیې (Condensation) په واسطه منځ ته راځي.

متراکم شوی پولی میر د هغو پولی میرونو له ډولونو څخه دي چې د ترکیبي تعاملونو په واسطه تشکیلېږي ، د دي پولی میرونو مونو میرونه ، دوه وظیفه یي ګروپونه لري چې هر مونو میر د همدغو ګروپونو له لارې له دوو نورو مونو میرونو سره اړیکې جوړوي.


متراکم شوي پولی میرونه د کوپولی میرونو له ډولونو څخه دي (کو پولی میر د هغو پولی میرونو د ډول څخه دي چې د دوو یا څو بیلابیلو مونو میرونو څخه جوړ شوي دي).

1-2_13: پولی ایسترونه :

پولی ایسترونه؛ لکه دکرون (Dacron) د متراکم شوی پولی میرونو له ډولونو څخه دي چې د ایتلین ګلایکول او فټالیک اسید له تراکم څخه د لاندې معادلې سره سم لاس ته راځي دي:



د ایتلین گلائیکول د هایدروکسیل گروپ د تري فتالیک اسید د کاربو کسید له گروپونو سره تعامل کوي، اوږده زنځیرونه یې د ایستري اړیکو له درلودلو سره جوړ کړي دي، پولي ایتلین فتالیک په بیلا بیلو برخو کې کارول کېږي ، د ټایرونو ، قلمونو او بوتلونو په جوړولو کې په کار وړل شوي او هم د هغو کالیو تارونه چې اتو کولونه اړتیا نه لري ، تري جوړشوي دي، لاندې شکلونه نوموړي تارونه ښيي:




شکل: 6_13: د پولي ایسترونو تارونه

که چیرې داسې پولي میرونه د فلم په بڼه جوړ شي ، د میلر (Mylar) په نوم یادېږي چې د ټیپ ، ویديو او نورو توکو په جوړولو کې په کار وړل کېږي . له پولي ایسترونو څخه د الیافونو ، فلمونو او پلاستيکي بوتلونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کېږي.


2_2_13: پولي امایډونه

پولي امایډونه د مترکم شوو پولي میرونو ډول دی چې د هغوی په مالیکولونو کې د امایډي اړیکه ($\text{-N}-\overset{\text{H}}{\overset{\text{O}}{\parallel}}\text{C}-$) شتون لري ، د دې ډول پولي میرونو بڼه بیلګه د 6,6- نیلون (6,6-nylon) دي چې د ادیپیک اسید او هګزامیټیلین ډای امین له مونو میرونو څخه لاس ته راځي ، د ادیپیک اسید دکاربو کسید گروپ د هګران ډای امین له امینو گروپو سره تعامل کوي ، په پایله کې د اویو مالیکولونه جلا او د هغوی پولي میر لاس ته راځي:



لاس ته راځي پولي میر د دوو بیلا بیلو مونو میرونو لرونکي دي او یو کو پولي میر دي ؛ دا چې هر یو مونو

میر شپږ، شپږ لومړۍ کاربن لری؛ نو له دې کبله د 6,6- نیلون په نوم یا د بېري 'نوموړی پولي میر په 1935م. کال کې دیو عالم په واسطه چې نوم یې والس کروتر Dr. Wallace carothers و ، لاس ته راغلی، دا پولي میر د کارولو ډیر ځایونه لري ، د پولي امایډونو د هغوی له ډلې څخه د نیلون کالپو د جوړولو لپاره ګټه اخېستل کېږي؛ که پولي امایډونو ته وړانګې ورکول شي ، کلک او متر اکم (Cross-linking) او په ډیرو کلکو توکو تبدیلېږي چې له هغوی څخه د مرمیو ضد واسکتونو په جوړولو کې کار اخېستل کېږي.




(7_13 شکل: 6,6 نیلون (6,6-Nylon))

3_13: ساینس ، تکنالوژي او پوهنه

مصنوعي پولي ميرونه دراتلونکي او نن ورځې توکي دي، دا توکي په او سنی زمانه کې د کارولو ډیر ځایونه لري او په راتلونکي کې هم د پولي ميرونو بیلابیل ډولونه ترکیب او ورڅخه به ګټه واخیستل شي ، په اوسنی زمانه کې مهم پلاستيکونه ترکیب شوي چی سپک، کلک او د برېښنا تیرونکي دي چې مقاومت یې له هغو فولادو سره یو شان دي کوم چې ورسره هم اندازه دي، که څه هم پلاستيکونو ځینې وړې ستونزې رامنځ ته کړي؛ خو داستونزې دومره زياتې او د پام وړنه دي. په ننني طبابت کې د انسانانو د بدن ځینې غړي چې له هغوی د بدن اصلي غړی خپلي دندي ترسره کولي نه شي او له کاره لویډلي وي، له مصنوعي غړو څخه چې د پولي ميرونو څخه جوړ شوي دي ، ګټه اخیستل کېږي ، په راتلونکي کې کېدای شي چې مصنوعي هلوکړي داسي جوړ کړي چې د اصلي هلوکړو سره اړیکه ورکړي ترڅو د هغوی د ودې لامل وگرځي کوم چې هغوي سره یې اړیکه ترل شوې ده ، همدارنګه زړه ، سږي او ځيګر به هم د مصنوعي پولي ميرونو څخه جوړ شي، د زړه والونه هم د مصنوعي پولي ميرونو څخه جوړ شوي دي، د انسانانو د بدن بیلابیل غړي: لکه خوږونه، لاسونه، پښې او د انسانانو د بدن نور غړي په دې وروستیو کې د همدغو مصنوعي پولي ميرونو څخه جوړ شوي دي له بدن څخه د بیګانه مواد لرېکول ، ډیره لویه ستونزه یې انجینرانو او ډیزاینرانو ته ورپېښه کړي ده ؛ ځکه د انسانانو ځان په سیستم کې د ننه نه منی پردي مواد او هغه لري کوي چې مصنوعي غړي هم له همدې پرديو موادو څخه جوړ شوي او طبعي غړي هغوی ته د تهاجمو موادو په سترګه ګوري او لري کوي یې ، هغه مواد د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو لپاره مناسب دي چې د دې سیستمونو دلري کولو د حالت د چمتوالي لامل ونه شي او د هغوی سره روزه جوړه وکړی شي د مصنوعي توکو لرونکو اعضاو لویه ستونزه داده چې دهغوي همدا برخه دویني د پرن کېدو لامل ګرځي او د ونې عادي بهیر ګډوډ وي، د ونې د بهیر چټکتیا په پيوند شوي مصنوعي ډیزاین

شورې برخې کې ډیر مهم دی ، د ونډې دغیر نورمال چټکتیا په دې برخه کې د ونډې د پرن کېدو لامل کیږي. د اصلي غړو د برخې او د مصنوعي نښتلي برخې ډېره ښکاره ستونزه، د مصنوعي نښتېل شوې او د طبیعي برخې دنساجو تر منځ د اړیکو تړل دي . هغه توکي چې د خوړو په توګه بدن ته وردننه کیږي ، د طبیعي نسجونو د یو برخې د هغوي رښتوي نسجونو د ودې لامل کیږي کوم چې مصنوعي نښلول شوې برخې ته نژدې وی ، دا برخه کلکه او ماتیدونکې وي چې د درد رامنځته کېدو، پړسېدو او د طبیعي نسجونو دشرېدلو لامل ګرځي. هغه مصنوعي پولي میر چې په طبابت کې ډیر په کار وړل کیږي ، عبارت له سلیکان د رېر څخه دی چې د (Silastic) په نوم یادېږي او د پولي میر فورمول یې په لاندې ډول دی.



هغه غشاوې چې د Polydimethylsilotane څخه جوړې شوي دي، د مصنوعي پرستګۍ په توګه د سوزېدو د قربانانو د درملنې لپاره په کارول کېږي. د ونډې مصنوعي رنگونه د ګرون یا تیفلان (Teflon) د پولي ایستر څخه جوړ شوي دي ، په دې اړه د مصنوعي پولي میرونو په لوست کې معلومات وړاندې شوي دي. د پولي وینایل د پلاستيکونو (پولي ایتیلین پلاستيکونو) څخه د اوبو پایونو په جوړولو ، د دیوالونو پوښلو، د دروازو او کرکیو د چوکاټونو په جوړولو ، د تودوخې نه تیروونکو او د برښنايي سامانونو او موادو په پوښلو کې ترې ګټه اخيستل کیږي .

د مصنوعي پولي میرونو څخه د طیارو په دننه برخو کې ګټه اخيستل کیږي ، خو د طیارو په وزرو کې هم مصنوعي پولي میرونو څخه چې ترکیبی لږ وزن لري او د کمپوزېټ (Composite) په نوم یادېږي، کار اخيستل کیږي . په اوسنۍ پېړۍ کې د ټایر لرونکو ماشینونو پرزي د مصنوعي پولي میرو څخه جوړې شوي او ددی امکان شته چې په نژدې راټلونکې پېړۍ کې د موټرونو اسکلېټ هم د کلک پلاستیک چې د کمپوزېټ موادو څخه جوړېږي ، کار واخستل شي. په راتلونکو وختونو کې به د برښنا هادي پلاستيکو څخه د ماشینونو سپکې تېرۍ جوړې شي .

د دې امکان هم شته چې په 21 م. پېړۍ کې یو شمېر داسې پولي میرونه ترکیب شي ، کوم چې د ډیرو د حیرانتیاوړ وي، د فوتو سنتیز (photosynthesis) عملې په پایله کې زموږ د اړتیا وړ غذايي مواد او اکسیجن لاس ته راځي چې په دې موادو کې د لمر انرژي ذخیره او له هغې څخه په ورځنیو حیاتي کیمیاوي تعاملونو کې ګټه اخيستل کیږي . په دې وروستیو پېړیو کې کونښن شوي چې ترڅو داسې پولي میرونه دیزاین کړي چې د لمر انرژي په نیغه کیمیايي فایده لرونکي انرژي تبدیله کړای وشي ، دیادولو وړ ده داچې: زیات مصنوعي پولي میرونه د پترولیم او له طبیعي ګاز څخه لاس ته راځي چې ممکن د 21 م. پېړۍ ترپاي پورې د هغو ټولې زېرمې په مصرف ورسېږي ، پوهان کونښن کوي ، ترڅو د یې خلی ناستي ومومي او له هغو څخه د ګټې اخيستلو زمینه برابره کړي.

13_4: د مصنوعي پولي میرونو په واسطه د هستوګنې د چاپیریال ککړتیا

پولي میرونه د هغوی له ډلې څخه پلاستيکونه د هستوګنې د چاپیریال د ککړتیا لامل ګرځېدلي دي. په امریکا

کې پلاستيکونو د جامدو کثافتو کوټونو 20% حجم جوړ کړی دی. او په عمومي ډول يې په پرمختللو هېوادونو کې 90% د جامدو کثافتو د کوټونو حجم تشکیل کړی دی چې غټه ستونزه يې رامنځته کړې ده؛ ځکه دا کوټونه په ځمکې کې ښخ شوي او ډیر ځای يې نیولی چې په ځمکې کې د ځای دکموالي لامل گرځيدلی. پلاستيکونه له کلکو موادو جوړ دي چې په ډیره موده کې هم نه پوټه کېږي. که چېرې دوی لرې واپول شي، له منځه نه ځي. پارکونه، د پلورلارې، لوبې لارې، سيندونه او حتی سمندرونه تړي چې په سمندرونو کې سمندري ژويو ته حېلې ستونزه رامنځته کوي.



شکل: 13-9) پلاستيکونو د بیران

شکل: 13-8) په سمندرونو کې د پلاستيکونو اچول او سمندري ژويو ته د هغوی تاوان

په عمومي ډول پلاستيکونه په دوه ډوله دي چې د یو ډول بکټر یا په واسطه پوټه کېږي او د (Biodegradable) په نوم یادېږي. په نوم یادېږي، دا پلاستيکونه د نشايستې له پولې میرونو څخه جوړ شوي دي.

دویم ډول پلاستيک د بکټر یا په واسطه نه پوټه کېږي او د (Nonbiodegradable) په نوم یادېږي. دې ډول پلاستيکونه له منځه نه ځي، خو پارکونه، د پلورلارې، لوبې لارې، سيندونه او حتی سمندرونه بندوي چې په سمندرونو کې دروندانه ستونزې رامنځته کوي او د تل لپاره هم پاتې کېږي چې د دوی بېلگې کيدای شي پولې ایتلین، پولې اکریلیت، پولې سټیرین، فټلان او پولې بیوتا داین وړاندې شي. د مصنوعي پولې میرونو له کبله د رامنځته شوې ستونزې د لرې کیدو لپاره، هغوی ته له سره دوران ورکوي او بیا ترې گټه اخېستل کېږي چې بیا ترې پلاستيکونه جوړوي. له پلاستيکونو څخه راپیدا شوو ستونزو د حل بله لاره داده چې هغوی سوزول کېږي او د هغوی د تودوخې څخه انرژي لاس ته راځي، خو د پلاستيکونو او رېفونو سوزول د پام وړ نورې ستونزې رامنځ ته کوي هغه دا چې زهري مواد، کاربن ډای اکساید گاز (CO_2)، کاربن مونو اکساید (CO)، سلفر ډای اکساید (SO_2) او هایدروجن کلوراید (HCl) تولید وي چې د هوا دککړتیا لامل گرځي. ددې ستونزې دحل یوازینی لاره دا ده چې باید له هغو ډولو پلاستيکو څخه گټه واخیستل شي، کوم چې د بکټر یاو په واسطه پوټه کیدلای شي.

د پلاستيکونو سوداګري

د پلاستيکو د کوټونو سوداګري د استوګنې د ساتلو له کبله خورا ډیر اهمیت لري، دا چې پلاستيکونه له نفتي موادو څخه جوړ شوي دي، د نفتو بېرته جوړونه ستونزمنه ده؛ نو د پلاستيکو سوداګري او بېرته جوړښت يې د نفتو شتون ته مرسته کوي. ډیرې د سوداګرۍ او د پلاستيکونو د بیا کارولو لارې شته دي چې یوه يې د هغوی پوټي، پوټي، کول او د هغوی د بیلابیلو ډولونو مخلوط کول دي؛ په دې لارې پلاستيکونه وروسته له مینځلو بیا

وچوري او له نورو توکو سره يې مخلوط وی چې له هغوی څخه د پلاستيکو پانې په لاس راوړي. د غیر الکولي مشروباتو پلاستيکي بوتلونه، وروسته له مینځلو تپه، تپه کوي او له هغوی څخه د پلاستيکي لوښو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه د بیلابیلو مرکبونو د پلاستيکونو د مخلوطونو له ډولونو د تپه، تپه کولو څخه وروسته څوکي، میزونه، ګلداني، سطونه او نور لوښي جوړوي.

فکر وکړئ

1_ د څښلو شربتونو د اخیستلو په وخت کې، به تاسې د خپل کور د څکلو لپاره لاندیني کوم ډول بوتلونه (الف او یا که ب) ټاکئ؟




شکل (10_13): د څښلو بوتلونه د بیلابیلو کتلو سره

2_ که چېرې پلاستيکونه په لاندې طريقه له منځه یوسو، کوم لاندې مشکلات به په پای کې ولری؟
الف_ سوځول ب_ د خاورو لاندې کول.
3_ د څښلو د شربتونو د بوتلونو جوړولو یوه فابریکه د څښلو د شربتونو د بوتلونو کتله یې له 68 ګرامو څخه 51 ګرامو ته راټیټوي، ستاسې په خیال د فابریکې د کار کوونکو ډاګر نه څه ګټې به د څښلو د شربتونو د بوتلونو د جوړولو کارخانې ته، اخیستونکو ته همدارنګه کیمیايي سرچینو او د استوګنې ځایونو ته، ولري؟

د هوا اکړتیاوې او تیزابي بارانونه:

د سوزولو معدني توکي؛ لکه: نفت، د ډبرو سکاره او نور د هوا د ککړتیا سرچینې دي. د مصنوعي او طبیعي بیلابیلو پولي میرونو له سوزیدلو له امله د هوا په اتموسفیر کې بیلابیل ګازونه ازادېږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، د دې ازادو شویو ګازونو څخه ځینې یې د باران له څاڅکو سره مخلوط کېږي او د تیزابي بارانونو دوردو لامل ګرځي، دا ګازونه عبارت له SO_2 او ډایټروجن اکسایډونه (NO_x) دي، دا ګازونه له هوا څخه درانه دي ځمکې ته ښکته راځي. دا ګازونه ډیر زیات د هغوتولیدي فابریکو څخه ازادېږي، کوم چې لوړ لوګي وتونکي تلونه لري چې د باران د اوریدو په وخت کې د باران په څاڅکو کې حل او د بیلابیلو تیزابونو د جوړیدو لامل ګرځي، جوړ شوي تیزابونه د ځمکې د منځ د تخریبونو لامل ګرځي، نباتاتو او حیواناتو ته تاوان رسوي؛ د بیلګې په ډول: کاربن ډای اکسایډ، د سلفر او نایټروجن اکسایډونه له لاندې معاملو سره سم د باران له اوبو کې تعامل کوي او تیزابونه جوړوي:



دا جوړشوي تيزابونه اوبو ته وړدنه کيږي او په ويالو ، سيندونو او سمندرونو کې بهيږي چې د اوبو دمنځ جيواناتو او نباتاتو ته تاوان رسوي تر دې کچې چې د هغوی د مړينې لامل گرځي، په لاندې شکل کې ليدل کيږي چې د تيزابي بارانونو اوريدل د کرنيزو خاورو په معديني موادو باندې اغيزه کوي او په مالګو يې تبديلي، دا مالګې اوبو کې حلېږي او له اوبو سره يوځای د ځمکو په ژورو برخو کې ښکته ځي او د نباتاتو د اړتيا وړ مواد کم او له منځته ځي. په تيزابي اوبو کې داهک پوړ اچوي چې په دې صورت کې تيزابونه خنثی او اړونده pH لاس ته راځي .



(11_13) شکل: په اسکاندينيا تيزابي سيند کې د چرنې د جبرو د پوړو په واسطه د هغه د تيزابونو خنثی کول

فکر وکړئ

په نړۍ کې د SO_2 د توليد سطحه د ليدلو وړ بدلونه لري، لاندې جدول د SO_2 د توليدولو دسطحي بدلونونه په درې لويو وچو کې ښيي، ستاسو په خيال زموږ دگران هيواد لپاره دا اندازې څه پيښي رامنځ ته کولي شي؟ او هم په 2010 م. کال کې د وړاندوينې د SO_2 د اندازې د لېوالتيا لپاره د کومو لارو وړانديز کوئ؟

جدول د نړۍ په درې لويو وچو کې د SO_2 د توليد مسطح په ميليون تن (13_2)					
کال	1980	1990	1995	2000	2010
اروپا	59	49	31	26	18
امريکا	24	20	16	15	14
آسيا	15	34	40	53	79

دکړتياو و مخنيوی:

د موادو د سوزيدلو پرځاي د انرژي د لاس ته راوړلو په موخه د انرژي د لاسته راوړلو لپاره سمې لارې لټول ؛ د بيلګې په ډول : د لمر له انرژي څخه ګټه اخيسته ، د SO_2 د تشکيلوونکو موادو د سوځولو کموالي ، ککړتياو د کنټرول د لګښت برابرول، د ککړتياو مخنيوی کوي.



د دیار لسم څپرکي لنډيز:

* که چېرې د پولې میرونو واحدونه (مونومیر) یو له بل سره یوځای شي، داسې پولې میرونه لاس ته راځي چې د جمعي پولې میرونو له ډولونو څخه دي.

* مونو میرونه هغه مواد دي، کوم چې د هغوی د مالیکول په جوړښت کې د جوړوونکو عنصرونو لڼو مونو تر منځ دوه گوني اړیکه شتون لري او دا دوه گوني اړیکه د پولې میرازیشن (Polymerization) د عملي په واسطه په یوه گوني اړیکه بدلون مومي.

* که چېرې د ایتیلین مالیکولونه د تودوخې په 250°C او په $3000\text{atm} - 1000$ فشار او د عضوي پر اکسایډونو په شتون کې پولې میرازیشن شي، پولې ایتیلین (Polyethylene) لاس ته راځي.

* د طبیعي مهم پولې میرونو څخه یو هم ربړ دی چې د ایزوپرين (Isoprene) د مونو میر د رادیکالي تعامل په بهیر کې لاس ته راځي، د ایزوپرين دوه ډوله پولې میرونه شته چې د هغوی د ایزومرونو پورې تړلي دي او هغه عبارت د سیس او ترانس (cis and trans) ایزومیري دي.

* په متراکم شورو پولې میرونو کې د مونومرونو ځینې برخې سهم نه لري، دا جلا شوي برخې په عمومي توگه اوبه دي چې د تراکم د عملي (Condensation)، په واسطه منځ ته راځي.

* پولې استرونه؛ لکه دکرون (Dacron) د متراکم شورو پولې میرونو له ډولونو څخه دي چې د ایتیلین گلایکول او فتالیک اسید له تراکم څخه لاس ته راغلي دي.

* پولې امایډونه د متراکم شورو پولې میرونو ډول دي چې د هغوی په مالیکولونو کې امایډي اړیکه $(-\text{N}-\text{C}-)$ شتون لري، د دې ډول پولې میرونو ښه بیلگه د 6، 6- نیلون (nylon-6,6) دي.

* په ننني طبابت کې د انسانانو د بدن ځینې غړي چې خپلې دندي نه شي تر سرکولې او له کاره لویډلې وي، د مصنوعي غړو څخه چې د پولې میرونو څخه جوړشوی وي، گټه اخیستل کېږي.

* له مصنوعي پولې میرونو څخه د طیارو په دننه برخې کې گټه اخیستل کېږي، خو د طیارو په وړوکي هم له مصنوعي پولې میرونو څخه چې ترکیبي لرون لري او د کمپوزیت (Composite) به نوم یادیږي، کار اخیستل کېږي.

* د دې امکان هم شته چې په 21 م پیړۍ کې یو شمیر داسې پولې میرونه ترکیب شي، کوم چې د ډیټري جیرانټیاور وي، د فوتو سنتیز (Photosynthesis) عملي په پایله کې زموږ د اړتیا وړ غذایي مواد او اکسیجن لاس ته راځي چې په دې موادو کې د لمر انرژي ذخیره او له هغې څخه په ورځنیو حیاتي کیمیايي تعاملونو کې گټه اخیستل کېږي. په دې وروستیو پیړیو کې کونښن شوی چې داسې پولې میرونه دیزاین کړي چې د لمر انرژي منځ په نیغه په کیمیايي گټه لرونکي انرژي تبدیله کړای شي.

د دیار لسم څپرکي پوښتي:

څلور ځوابه پوښتي

- 1- که چېرې د د پولې میرونو واحد یو له بل سره یو ځای شي پولې میرونه حاصلېږي چې د پولې میرونو ډول دی.
الف- جمعي، مونومیر ب- جمعي، ډای میر ج- متراکم شوی مونو میرونه د- هېڅ یو.
- 2- پولې میرونه هغه مواد دي چې له څخه جوړشوی وي.
الف- ډای میرونو ب- ترای میرونو ج- مونو میرونو د- ترا میرونو.
- 3- د پولې ایتیلین فورمول عبارت دي له:
الف: $(-\text{CH}_2 - \text{CH}_2 -)_n$ ب: $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ ج: $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2$ د- هېڅ یو.
- 4- د لوړ کثافت لرونکي پولې ایتیلین (High-density poly ethylene) په ښودل کېږي.
الف- LDPE ب- CPE ج- الف او ب دواړه د- HDPE
- 5- طبیعي ربړ د د رایکالي مونو میرونو له تعامل څخه لاس ته راځي.
الف- ایزوپرين ب- Isoprene ج- الف او ب دواړه د- مونومیر ایتیلین

- 6- د سلفر او طبيعي ريز تعامل د تعامل په نوم يادېږي.
- الف- ايزومريزېشن ب- Vulcanisation ج- جمعي د- پولي ميراييزېشن
- 7- نيوپرين د مصنوعي ريز پوړل ډول دي چې د پولي ميراييزېشن حاصلېږي.
- الف- chlorbuta diene-2 ب- كلوروپوتا داى مين ج- 2- كلوروپوتا داى مين د- پولي اميدونه
- د الف او ج دواړه
- 8- د پلاسټيک لوبڼې او د کورنور د اړتيا مواد د څخه جوړ شوي دي:
- الف- پولي ايتيلين ب- پلاسټيکونه ج- پولي ستايرين د- پولي اميدونه
- 9- متراکم شوي پولي ميرونه د هغو پولي ميرونو ډول دي چې د تعاملونو په واسطه جوړېږي.
- الف- ترکيبي ب- جمعي ج- د سون د- جلاکيلو
- 10- په پولي اميدونو او د هغوی په ماليکولونوکې (.....) اړيکه شته ده:
- الف- اميدي اړيکه ب- $\text{H}-\text{O}-\text{N}-\text{C}$ ج- الف او ب دواړه د- هيچ يو
- 11- په متراکم شوو پولي ميرونوکې د څينې برخې شاملې نه دي:
- الف- ماليکول ب- اټوم ج- مرکب د- مونومير
- 12- مصنوعي پولي ميرونه چې په طبابت کې ډير په کار وړل کېږي، څخه عبارت دي له دي،
- الف- Silastic ب- د سليکان ريز ج- الف او ب دواړه د- هيچ يو
- 13- د وينې مصنوعي رنگونه د څخه جوړ شوي دي.
- الف- پولي ايسټر، د کروټ، ب- تفلان ج- Teflon د- ټول ځوابونه سم دي
- 14- د طيارو په ووزونوکې ترکيبي کم وزن لرونکي پولي ميرونه د په نوم گڼه اخلي.
- الف- کمپوزيټ ب- (Composite) ج- الف او ب دواړه د- هيچ يو
- 15- د ټيپ ، ويليو او نورو په جوړولو کې له لاندې پولي ميرونو څخه کوم يو په کار وړل کېږي ؟
- الف- ميلر ب- Mylar ج- نيلون 6,6 د- الف او ب
- 16- دکرون (Dacron) د متراکم شوو پولي ميرونو له ډولونو څخه دي چې د تراکم له امله حاصل شوی دی:
- الف- ايتيلين گلايکول ب- فتاليک اسيد ج- الف او ب دواړه د- ايتلين
- تشرېحي پوښتنې:**
- 1- دپولي ميراييزېشن (Polymerization) عمليه روښانه او د دوه گونې اړيکې بلون په يو گونې اړيکې تشرېح کړئ.
 - 2- د ايزوپرين دوه ډوله پولي ميرونه چې د هغو د ايزو ميرونو پورې اړه لري ، څرگنده کړئ.
 - 3- د ستايرين له پولي ميراييزېشن څخه کوم پولي مير حاصلېږي ؟ په دې اړوند معلومات وړاندې کړئ.
 - 4- دکرون (Dacron) کوم ډول پولي مير دی ؟ د کومو مونوميرونو له تراکم څخه حاصلېږي ؟ د هغه د پولي ميراييزېشن معادله وليکئ.
 - 5- د Polydimethylsilotane او د هغه د استعمال د ځايونو په اړه معلومات وړاندې کړئ .
 - 6- د مصنوعي پولي ميرونو او په ننني عصر کې د هغو د رول په هکله په ننني صنعت کې او د راتلونکو موادو په جوړولو کې معلومات وړاندې او دهغو د کارولو په هکله لازم معلومات وړاندې کړئ .
 - 7- پولي ايسټرونه ؛ لکه د کروټ (Dacron) کوم ډول پولي مير دي ؟ په دې اړه معلومات ورکړئ .
 - 8- د طبيعي او مصنوعي ريز ترمنځ توپير د بياگو په وړاندې کولو معلومات ورکړئ .
 - 9- د پولي ايتلينو بيلابيل شکلونه روښانه او د هغوی د کارولو ځايونه د بيلگو په واسطه څرگند کړئ .
 - 10- کوم پولي ميرونه د استوگنې دځايونو د لازمتي ککړتياوو لامل گرځي ؟ په دې هکله معلومات وړاندې کړئ .

اخذلیکونه:

- 1- K. Peter, C. Vollhardt, Organic Chemistry, Fourth Edition, 2003, US
 - 2- Ovorak, Schmutu.a. von der Chemier 2, 1996 by E.DORNER GmbH, 1010 wien, Austria.
 - 3- Pribas, Hagenauer, Markl, Zadrrazil Chemie,aktuell , 1. Auflage, 2006, Austria.
 - 4- Dr. Franz Neufingerl, Otto Urban, Dr. Martina viehhauser, Chemie 2
 - 5- Franz Neufingerl, Chemie istuberal 4, 2006 westermann wien,im Verlag E. DORNER GmbH, Austria.
 - 6- ZANBAK YAYINLAR, Hydrocarbons, 2006, Chemistry series.
 - 7- ZANBAK YAYINLAR, Oxygen and Nitrogen Containing, organic Compounds,2005 , chemistry series.
 - 8- KOYZ and TREICHEL, Chemistry and Chemical Reactivity, fourth Edition, 1999, USA.
 - 9- Williams S.Seese, G. William Daub, Basic Chemistry, Fifth Edition, 1988, USA.
 - 10- HOLT, RINEHART and WINSTON, MODERN Chmistry, 2002, USA.
 - 11- Raymond Chang, General Chemistry, Third Edition, 2003, USA.
 - 12- David E. Goldberg, Fundamentals of Chemistry, Ghird Edition, 2001, USA.
 - 13- Steven S. Zumdahl, Chemistry, Third Edition, 1993, USA.
- ۱۴- شیمی (۲) و آزمایشگاه ، منصور عابدینی و دیگران، وزارت آموزش و پرورش، سال دوم دبیرستان، ۱۳۸۵ تهران.
- ۱۵- کیمیای عمومی. مؤلف: پوهندوی دیلوم انجیر عبدالمحمد عزیز، د کابل پوهنتون، ۱۳۸۷ کال.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library