



سید جمال الدین افغانی پوهنتون
Sayed Jamaluddin Afghani University

کرنې پوهنځی

Faculty of Agriculture

د ځنگلپوهنې او طبیعي منابعو دیپارټمنت

Department of Forestry and Natural Resources

د دیوه گل درې د ونو او بوټو ارزونه

(Assessment of Trees and Shrubs of Dewagal Dara)

(د لیسانس دورې وروستی سمینار)

Ketabton.com

څیړونکی : ادریس

لارښود استاد: پوهنیار محیب الله صافی

کال: ۱۴۴۵ هـ ق/ ۱۴۰۲ هـ ش

سمینار استاد: پوهنیار شاهد الله



سید جمال الدین افغانی پوهنتون
کرنې پوهنځی
د ځنگلپوهنې او طبیعي منابعو دیپارتمنت

د دیوه گل درې د ونو او بوټو ارزونه (Assessment of Trees and Shrubs of Dewagal Dara)



څیړونکی : ادریس

کال: ۱۴۴۵هـ ق/ ۱۴۰۲ هـ ش

سمستر: اتم

لارښود استاد: پوهنیار محیب الله صافی

سمینار استاد : پوهنیار شاهد الله امن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د مطالبو لړلیک

عنوان	مخ
لنډيز	۱.....
سريزه	۲.....
پيژندنه	۳.....
د څيړنې ستونزې	۵.....
د څيړنې ارزښت	۵.....
د څيړنې اهداف	۵.....
تيرو اثارو ته کتنه	۶.....
مواد او کړنلاره	۸.....
د معلوماتو راټولول	۹.....
موندنې	۱۱.....
چهارمغز	۱۶.....
څيړی	۱۷.....
شوه	۱۸.....
انځر	۱۹.....

- ۲۰..... لاچي
- ۲۱..... وحشي زيتون
- ۲۲..... چنار
- ۲۳..... سفيدار
- ۲۴..... گورگره
- ۲۵..... غز
- ۲۶..... پلوخه
- ۲۷..... توت
- ۲۸..... بوکيانه
- ۲۹..... نبنتر
- ۳۰..... کيکر
- ۳۱..... توراملوک
- ۳۲..... غوراسکی
- ۳۵..... مناقشه
- ۳۶..... نتيجه گيري
- ۳۷..... سپارښتنې
- ۳۸..... ماخذونه

شکلونو لړلیک

مخ

شکل

(۱) شکل : د مطالعې ساحې ښودنه کوي..... ۸.

جدولونو لړليک

مخ

جدول

(۱) جدول. په ديوه گل دره کې د ونو او بوټو د تنوع ښودنه کوي..... ۱۲

لنډيز

دا څېړنه د ۲۰۲۳ کال په وروستيو کې د څوکۍ ولسوالۍ په ديوه گل دره کې چې د کنړ د مرکز د اسعداباد ښار څخه ۲۸ کيلو متره فاصله لري تر سره شوې. څرنګه چې ونې او بوټي زيات ارزښت لرونکي دي او بايد په اړه يې هر اړخيزه ارزونه ترسره شي متاسفانه چې د ديوه گل درې د ونو او بوټو په اړه ارزونه نه ده ترسره شوې همدارنګه د دغه سيمې د ونو او بوټو په پيژندنه کې د معلوماتو کموالي شتون لري او د يادې سيمې د ونو او بوټو په ساتنه کې د معلوماتو نشتون د دې څيړنې ستونزې دي چې د همدې ستونزو د له منځه وړلو په خاطر دا څيړنه کې ترسره شوې د دې څيړنې د ترسره کولو له پاره په ساحه کې ۳۰ دانې کواډريټونه اچول شوي، د سيمې په مختلفو برخو کې د ونو لپاره ۲۰×۲۰ متره او د بوټو لپاره ۵×۵ متره کې کواډريټونه استعمال شوي، د ونو او بوټو د قطر د اندازه کولو له پاره د متر او د ارتفاع د اندازه کولو له پاره د Stick Method څخه استفاده شوې. په ديوه گل دره کې د ونو او بوټو ۳۰ مختلفې نوعې چې ۱۷ مختلفو نباتي کورنيو پورې تړاو لري شتون لري. په ذکر شوو کورنيو کې د Rosaceae کورنۍ يې تر ټولو زيات (۵) سپيشزونه په درلودلو سره غالبه کورنۍ ده ورپسې Fabaceae کورنۍ (۳) سپيشزونه، Moraceae (۳) سپيشزونه او Rutaceae (۳) نوعې لري. له ذکر شوو ونو او بوټو څخه (*Quercus dilatata*) د ($RD=19.6$) نسبتي ګڼوالي په لرلو سره تر ټولو زياته ساحه تر پوښښ لاندې راوستې ده همدارنګه په ترتيب سره (*Olea europaea*) د ($RD=16.8$) نسبتي ګڼوالي، (*Zizyphus spp*) د ($RD=10.63$) نسبتي ګڼوالي په درلودلو سره تر ټولو غالبې نوعې وې پداسې حال کې (*Pistacia khinjuck*) د ($RD=0.32$) نسبتي ګڼوالي په درلودلو سره تر ټولو کمه ساحه پوښلې ده. همدارنګه د فرمول په اساس Shannon Weiner د نوعو د تنوع لړيال ($H' = 2.6$) داسې ښودنه کوي چې د ديوه گل درې د ونو او بوټو تنوع په اوسط حالت کې قرار لري پداسې حال کې چې د تنوع يوشانوالی يې ($Evenness = 3.4$) دی.

کلیدي ټکي: ونې او بوټي، کواډريټ، اورښت، ديوه گل دره

سريزه

د انسانانو او ټولو ژونديو موجوداتو د ژوند د بقا له پاره ونې او بوټي ډير زيات ارزښت لري د مثال په توگه همدا ونې او بوټي دي چې هوا معتدله کوي، اورښت زياتوي، د ونو او بوټو ريښې په خاصه توگه سطحي ريښې د خاورې ذرات يو بل پورې نښلوي او د خاورې د ښويدو څخه مخنيوی کوي. همدارنگه ونې او بوټي د يو هيواد په اقتصاد کې هم ستر رول لري چې د لرگيو څخه يې په صنعت کې زيات عوايد تر لاسه کيږي، د ځينو ونو او بوټو د پوستکي څخه د ريزين پنوم کيمياوي مواد استخراجيږي چې د همدې کيمياوي موادو څخه په طبي مواردو کې استفاده کيږي. د ديوه گل درې د ونو او بوټو په اړه ارزونه نه ده ترسره شوې، د دغه سيمې د ونو او بوټو په پېژندنه کې د معلوماتو کموالی او د يادې سيمې د ونو او بوټو په ساتنه کې د معلوماتو نشتون هغه ستونزې وې چې له امله يې ما هم غوره وگنله چې دغه څيړنه ترسره کړم تر څو د ديوه گل درې د ونو او بوټو ارزونه او د ساتنې لارې چارې په گوته شي ما په دې څيړنه کې د ونو او بوټو په پېژندنه، د څيړنې ارزښت، د څيړنې ستونزې، اهداف، تېرو اثارو ته کتنه او په پای کې د خپلې څيړنې نتيجه گيري، سپارښتنې او ماخذونه ليکلي او د امکان تر حده مې کوښښ کړی چې په ساده او روانو جملو مطالب وليکل شي. مننه کوم د خپل لارښود استاد پوهنيار محيب الله صافياو سمينار استاد پوهنيار شاهد الله امن له نه ستړي کيدونکو هلو ځلو څخه. د خپلو دوستانو، وروڼو او والدينو څخه نړۍ مننه کوم چې ما سره يې په څلور کلنه دوره کې نه ستړي کيدونکي هلې ځلې کړي دي. پدې علمي څيړنه کې مې پوره هڅه کړې چې د معتبرو علمي ماخذونو څخه معلومات راټول کړم په دې هيله چې د لوستونکو د گټې وړ وگرځي.

په درنښت

ادريس

د ځنگلپوهنې او طبيعي منابعو ډيپارټمنټ

پيژندنه

د بشر د ژوندانه لپاره ونې او بوټي ډير زيات ارزښت لري د مثال په توگه همدا ونې او بوټي دي چې هوا معتدله کوي، اورښت زياتوي، د ونو او بوټو ريښې په خاصه توگه سطحي ريښې د خاورې ذرات يو بل پورې نښلوي او د خاورې د ښويدو څخه مخنيوی کوي. همدارنگه ونې او بوټي د يو هيواد په اقتصاد کې هم ستر رول لري چې د لرگيو څخه يې په صنعت کې زيات عوايد تر لاسه کيږي، د ځينو ونو او بوټو د پوستکي څخه د ريزين پنوم کيمياوي مواد استخراجيږي چې د همدې کيمياوي موادو څخه په طبي مواردو کې استفاده کيږي او په زياته اندازه عوايد ترې تر لاسه کيږي. ونې او بوټي د هوا ککړتيا په کمولو کې هم ستر رول لري. (Ali et al., 2022) ونې او بوټي د باران پواسطه د خاورې د تخريميمخنيويکوي، د تيزو بادونو د زيان اندازه راکموي. همدارنگه ونې او بوټي د محيط په صفاوالي کې مهم رول لري او د چاپيريال د ښکلا سبب گرځي. ونې او بوټي د وحشي حيواناتو او الوتونکو د اوسيدو او ژوند تيږولو لپاره پناه ځای برابروي، ونې او بوټي د غبريزې ککړتيا په راکمولو کې هم ستر رول لري او د وچکالۍ په مخنيوي کې ستر ارزښت لري (Negi et al., 2018). ونې او بوټي د نباتي پوښښ بنسټيزه برخه ده چې د ښکلا او اقتصادي ښېگڼو تر څنگ د بې شميره ايکوسيستي خدمتونو وړاندې کوونکي دي، ونې او بوټي د انسانانو او وحشي ژوو د خوړو ورځنۍ اړتياوو بشپړوونکي دي چې انسانان او وحشي ژوي يې د خوراک لپاره د ميوو، غوزو او تخمونو څخه استفاده کوي، همدا ونې او بوټي دي چې د انسانانو، وحشي ژوو، مارغانو او په ټوله کې د ټولو ژونديو موجوداتو لپاره پټنځايونه او کورونه برابروي، په ښارونو کې ونې او بوټي د ايکولوژيکي خدمتونو، اقليمي بدلون په وړاندې مبارزې او د هوا ککړتيا په مخنيوي کې ځانگړی ارزښت لري، ونې او بوټي ښاري سيمو ته د سيلانيانو په ورتگ او د سيمې د ښکلا ارزښت په لوړولو کې ستر رول لري، ونې او بوټي کاربن نصبوي او په بدل کې يې اکسيجن چاپيريال ته تهيه کوي چې د همدې امله په نړيواله سطحه د تودوخې په منځنۍ اندازه کې کموالی راولي او د هوا د يخوالي لامل گرځي، ونې او بوټي زيات اقتصادي ارزښت لرونکي دي چې په ساختماني او تجارتي برخو کې ترې استفاده کيږي همدارنگه د ځينو ونو او بوټو د پوستکو څخه ريزين استخراجيږي چې په طبي مواردو لکه د ملا درد، جلدي امراضو، د خيتې دردونو او داسې نورو مواردو کې ترې استفاده کيږي، د ونو لرگي سخت او دوامداره دي چې صنعت، ساختماني مواردو، فرنيچر، کتاره جوړونه او همدارنگه د زينت په خاطر د پارکونو او سرکونو په غاړو کې کرل کيږي (Sarkar & Devi, 2014). ځينې بوټي د زيات ارزښت درلودونکي وي لکه غوړاسکي چې د بوټو د جملې څخه شميرل کيږي چې د همدې غوړاسکي څخه د شاتو مچيو د روزنې لپاره، د خاورې د تخريب

د مخنيوي، او د زينت لپاره په پارکونو، کورونو غاړو او د کوڅو په غاړو کې کرل کېږي. همدارنگه د دې نبات پانې د حیواناتو په خاص ډول د غواگانو لپاره په زړه پورې خواږه برابروي او د کمپوسټ جوړولو لپاره هم ډیر استعمالیږي. همدارنگه د بوټو څخه په ځینو امراضو لکه د خیتې درد، د سینې درد او د سرطان په مخنیوي کې هم استفاده کېږي (Wani & Pant, 2023). همدارنگه د ونو څخه د کنبټیو په جوړولو او زراعتي سامان الاتو په جوړولو کې استفاده کېږي او د ونو د پانو څخه ضروري تیل ویستل کېږي چې د مکروب ضد درملو په توګه ترې استفاده کېږي. همدارنگه طب، کاغذ جوړولو، د لرګیو د تولید او د زينت لپاره هم کرل کېږي (Alam, 2011). د ځینو ونو لرګی ډیر سخت وي نو ځکه په فرنیچر او ساختماني مواردو کې ترې ډیره استفاده کېږي او د لرګی څخه یې په کمه اندازه ژاوله ترلاسه کېږي چې په دوا جوړولو کې ترې استفاده کېږي. همدارنگه د ونو د ځوانو شاخونو څخه شیرې اخیستل کېږي چې د غاښونو د صفایې لپاره استعمالیږي او د غاښونو د ناروغیو په استعمال کې ترې هم استفاده کېږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010). ځینې ونې نری پوستکی لري چې د کاغذ په جوړولو کې ترې استفاده کېږي او د پوستکي څخه یې د وریشمو چینجي د تغذیې لپاره استفاده کېږي همدارنگه د ونو د پانو څخه د حیواناتو د تغذیې لپاره استفاده هم کېږي او د میوې څخه یې د ستونې په دردونو کې استفاده کېږي (Dibaba et al., 2022). ونې په کرنیزو ځمکو کې هم د قطار په شکل کرل کېږي او هم په کرنیزو ځمکو کې د باد ماتونکو په توګه کرل کېږي. د ونو او بوټو د پوستکي او پانو څخه تانین استخراجېږي چې د تانینو څخه یې بیا په دوايانو په جوړولو کې استفاده کېږي (Chetri & Shreshta, 2023). دیوه گل دره چې د کنړ ولایت په څوکی ولسوالۍ کې موقیعت لري او د کنړ د مرکز د اسعداباد ښار څخه ۲۸ کیلو متره فاصله لري چې شمال ته یې د چپې درې ولسوالۍ جنوب ته یې د کنړ سیند ختیځ ته یې نرنګ او لویدیځ ته یې د نورگل ولسوالۍ پرته ده او د سمندر د سطحې څخه په ۱۶۴۰ متره لوړوالي کې پرته ده د ونو او بوټو له امله ایکولوژیکي ارزښت لري .

د څيړنې ستونزې

څرنګه چې ونې او بوټي زيات ارزښت لرونکي دي او بايد په اړه يې هر اړخيزه معلومات راټول او ارزونه ترسره شي نو متاسفانه چې د ديوه گل درې د ونو او بوټو په اړه ارزونه نه ده ترسره شوې همدارنګه د دغه سيمې د ونو او بوټو په پېژندنه کې د معلوماتو کموالی شتون لري او د يادې سيمې د ونو او بوټو په ساتنه کې د معلوماتو نشتون د دې څيړنې ستونزې دي چې د همدې ذکر شويو ستونزو د له منځه وړلو په خاطر دا څيړنه د ديوه گل په دره کې ترسره شوې تر څو يادو ستونزو ته د پای ټکی کيښودل شي .

د څيړنې ارزښت

ونې او بوټي ډير زيات ارزښت لري د مثال په توګه همدا ونې او بوټي دي چې هوا معتدله کوي، اورښت زياتوي، د ونو او بوټو ريښې په خاصه توګه سطحي ريښې د خاورې ذرات يو بل پورې نښلوي او د خاورې د ښويدو څخه مخنيوی کوي. همدارنګه ونې او بوټي د يو هيواد په اقتصاد کې هم ستر رول لري چې د لرګيو څخه يې په صنعت کې زيات عوايد تر لاسه کيږي، د ځينو ونو او بوټو د پوستکي څخه د ريزين پنوم کيمياوي مواد استخراجيږي چې د همدې کيمياوي موادو څخه په طبي مواردو کې استفاده کيږي او په زياته اندازه عوايد ترې تر لاسه کيږي. ونې او بوټي د هوا ککړتيا په کمولو کې هم ستر رول لري (Ali et al., 2022). دا چې ونې او بوټي ډيرې ګټې لري نو په همدې اساس څيړنې ته اړتيا ليدل کيږي ددې څيړنې په مرسته د ديوه گل درې د ونو او بوټو ارزونه ترسره شوې او د يادې ساحې د ونو او بوټو په اړه معلومات زيات شوي او تر څنګ يې د ساتنې لارې چارې په ګوته شوي دي.

د څيړنې اهداف

1. د ديوه گل په دره کې د موجوده ونو او بوټو په اړه معلومات تر لاسه کول.
2. د ديوه گل درې د ونو او بوټو د ساتنې لارې چارې په ګوته کول.

تيرو اثارو ته کتنه

واني اوپانټ په (۲۰۲۳) ميلادي کال کې د هند هيواد په Gulmarg Wildlife Sanctuary کې د نباتاتو ارزونه ترسره کړې چې د ارزونې لپاره يې د کواډريټ ميتود څخه استفاده کړې وه چې پدې ارزونه کې يې د ونو لپاره 10×10 متره کې او د بوټو لپاره يې 5×5 متره کې کواډريټونه استعمال کړي و او د ټولو کواډريټونو شمير يې ۳۰ دانې و په پايله کې معلومه شوه چې د Vascular نباتاتو ۷۴ کورنۍ چې پدې کورنيو کې د Gymnosperm ۳ کورنۍ، د Angiosperm ۶۲ کورنۍ او د Pteridophytes ۹ کورنۍ شاملې وې او پدې څيړنه کې يې د نباتاتو غالبې کورنۍ عبارت وېله Asteraceae ۵۸ نوعې، Lamiaceae ۲۱ نوعې، Rosaceae ۲۱ نوعې او له Ranunculaceae څخه چې ۱۸ نوعې يې شاملې وې .

چيلي او ملگرو يې په (۲۰۲۳) ميلادي کال کې په مراکش هيواد کې د نباتاتو ارزونه ترسره کړې وه چې د ارزونې لپاره يې د کواډريټ ميتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره يې 20×20 او د بوټو لپاره يې 5×5 متره کې کواډريټونه استعمال کړي وه او د ټولو کواډريټونو شمير يې ۴۰ عدده وه . د څيړنې په پايله کې يې د نباتاتو ۳۵۸ Taxa، ۲۲۸ Genera او ۶۶ Family پيژندلې وې او تر ټولو غالبې کورنۍ يې عبارت وې له Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae او Poaceae څخه .

سيکار او ملگرو يې په (۲۰۲۳) ميلادي کال کې د هند هيواد د لويديځې هماليا په سيمو کې د نباتاتو ارزونه ترسره کړې چې د دې ارزونې لپاره يې د کواډريټ ميتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره يې 10×10 متره او د بوټو لپاره يې 5×5 متره کې کواډريټونه استعمال کړي وو چې په پايله کې يې د نباتاتو ۲۶۵ نوعې چې ۵۵ کورنيو سره يې تړاو درلود پيژندلې وو چې پدې نباتاتو کې Gymnosperm او Angiosperm دواړه شامل وو او تر ټولو غالبې کورنۍ يې عبارت وې له Asteraceae ۳۰ Taxa، Rosaceae ۲۱ Taxa، او د Ranunculaceae څخه چې ۸ Taxa يې درلودې .

علي او ملگرو يې په (۲۰۲۲) ميلادي کال کې د پاکستان هيواد په پنجاب ايالت کې د نباتاتو ارزونه ترسره کړې وه چې پدې څيړنه کې يې د کواډريټ ميتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره يې 10×10 متره او د بوټو لپاره يې 5×5 متره کې کواډريټونه استعمال کړي وو چې په پايله کې يې د نباتاتو ۱۲۰ مختلفې نوعې پيژندلې وې چې Dicots

او Monocots دواړه پکې شامل وو چې د Dicot له جملې څخه یې Asteraceae او د Monocots له جملې څخه یې Poaceae غالبې کورنۍ وې .

ډیبابا او ملګرو یې په (۲۰۲۲) میلادي کال کې د Ethiopia هیواد Dima سیمې د ځنګل د نباتاتو ارزونه ترسره کړې وه چې پدې څېړنه کې یې د کواډریټ میتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره یې ۲۵×۲۵ متره او د بوټو لپاره یې ۵×۵ متره کې کواډریټونه استعمال کړي وو او د ټولو کواډریټونو شمیر یې ۹۰ دانې وو چې په پایله کې یې د نباتاتو ۱۸۰ نوعې چې ۶۹ کورنیو سره یې تړاو درلود پیژندلي وو چې له دې جملې څخه یې ۵۲ نوعې ونې او ۳۱ نوعې یې د بوټو شاملې وې او تر ټولو غالبې کورنۍ یې عبارت وې له Rubiaceae ۱۱ نوعې، Acanthaceae ۱۱ نوعې، Asteraceae ۱۱ نوعې، او Fabaceae څخه چې ۸ نوعې یې درلودې .

شریستا په (۲۰۱۹) میلادي کال کې د نیپال هیواد د نباتاتو ارزونه ترسره کړې وه چې پدې څېړنه کې یې د کواډریټ میتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره یې ۱۰×۱۰ متره کې کواډریټونه استعمال کړي وو چې د دې ارزونې په پایله کې یې د نباتاتو ۲۹۹ نوعې چې ۸۶ کورنیو سره یې تړاو درلود پیژندلي وو چې پکې Dicots او Monocots دواړه شامل وو چې د Dicots له جملې څخه یې ۶۹ کورنۍ او ۲۲۹ نوعې پداسې حال کې چې د Monocots له جملې څخه یې ۱۵ کورنۍ او ۳۹ نوعې شاملې وې پدې ارزونه کې د نباتاتو تر ټولو غالبې کورنۍ عبارت وې له Rosaceae ۲۳ نوعې، Ericaceae ۱۷ نوعې او Lauraceae څخه چې ۹ نوعې یې درلودې .


نیګي اوملګرو یې په (۲۰۱۸) میلادي کال کې د هند هیواد په Nanda Devi National Park کې د نباتاتو ارزونه ترسره کړې وه چې پدې څېړنه کې یې د کواډریټ میتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره یې ۱۰×۱۰ متره او د بوټو لپاره یې ۵×۵ کې کواډریټونه استعمال کړي وو چې د دې ارزونې په پایله کې یې د نباتاتو ۷۱ کورنۍ پیژندلي وې او تر ټولو غالبې کورنۍ یې عبارت وې له Asteraceae, Ranunculaceae او Rosaceae څخه ..

سرکار او ډیوی په (۲۰۱۴) میلادي کال کې د هند هیواد په Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary کې د نباتاتو ارزونه ترسره کړې وه چې په دې ارزونه کې یې د کواډریټ میتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره یې ۱۰×۱۰ متره کې کواډریټونه استعمال کړي وو او د ټولو کواډریټونو شمیر یې ۱۰۰ وو. د دې ارزونې په پایله کې یې د ونو ۷۵ نوعې چې د نباتاتو ۴۰ کورنیو سره یې تړاو درلود پیژندلي وې او غالبې کورنۍ یې عبارت وې له Moraceae ۸ نوعې، Magnoliaceae ۵ نوعې، Anacardaceae ۴ نوعې او Meliaceae څخه چې ۴ نوعې یې درلودې .

کړنلاره (Methodology)

د څېړنې ساحه (Study area)

دا څېړنه د ۲۰۲۳ کال په وروستيو کې د څوکۍ ولسوالۍ په ديوه گل دره کې ترسره شوې چې د ديوه گل دره د کنړ د مرکز د اسعداباد ښار څخه ۲۸ کيلو متره فاصله لري او د سمندر د سطحې څخه په ۱۶۴۰ متره لوړوالي کې پرته ده چې د څوکۍ ولسوالۍ ټوله ځمکه ۲۴۵۲۲ هکتاره، کرنيزه ځمکه يې ۱۴۱۶ هکتاره، شاړه ځمکه يې ۴۰۷ هکتاره، ځنگلي ساحه يې ۱۶۵۹۰ هکتاره او ۴۷۰۹ هکتاره څړځايونه لري (Arazi, 2017). په ديوه گل دره کې پيدا کيدونکي نباتات عبارت دي له شوه، نښتر، چهارمغز، بيره، بوکيانه، سفيدار، توت، شنډۍ، چينار، غوراسکۍ، شنۍ، خيړۍ، انځر، انار، انگور، شفتالو، ښوون، نارنج، لاجي، غز، توراملوک، پلوڅه، گورگره، کيکر او داسې نور (Breckle & Rafiqpoor, 2010).



(۱) شکل : د مطالعې ساحې ښودنه کوي.

د معلوماتو راټولول (Data collection)

د دې څېړنې د ترسره کولو له پاره د مشخصې سیمې څخه مستقیماً ارزونه شوې همدارنگه په ساحه کې ۳۰ دانې کواډریتونه اچول شوي د سیمې په مختلفو برخو کې د ونو لپاره ۲۰×۲۰ متره او د بوټو لپاره ۵×۵ متره کې کواډریتونه استعمال شوي چې یو کواډریت د بل کواډریت څخه په یو کیلو متره فاصله کې اچول شوی په دې کواډریتونو کې د ټولو ونو او بوټو د نوعو شمیر، د ونو او بوټو قطر، لوړوالی معلوم شوی او همدارنگه په دې کواډریتونو کې غالبې ونې او بوټي معلوم شوي. د ونو او بوټو د قطر د اندازه کولو له پاره د متر څخه استفاده شوې او د ارتفاع د اندازه کولو له پاره د Stick Method څخه استفاده شوې د دې تر څنګ د یادو ونو او بوټو علمي نوم، انګلیسي نوم Family, genus, species د ګل او میوې نیونې وختونه او پیداکیدونکې ساحې په ګوته شوي.

تحلیل او تجزیه (Data analysis)

د څېړنې پر وخت راټول شوي ارقام د مایکروسافټ ایکسل او د Plant net پروګرام پواسطه تحلیل شوي او همدارنگه د لاندینو فورمولونو پواسطه تحلیل او تجزیه شوي دي.

د نوعو د تنوع لړیال (Species Diversity Index)

د دغه لړیال په مرسته په یوه ځانګړې ساحه کې د انواعو د بډایتوب او د دوي د نسبتي یوشانوالي د ترلاسه کولو په موخه له لاندې ځانګړي فورمول څخه استفاده شوې ده.

$$H' = \sum_{i=1}^S pi \ln(pi)$$

په پورته ذکر شوي فورمول کې

H' = شانن واینر لړیال (Shannon Wiener Diversity Index)

S = په ټوله انتخاب شوې ساحه کې د نوعو د شمیر ښودنه کوي

P_i = په ټول نفوس کې د ځانګړې نوعې د شتون نسبت

$\ln$ = د طبیعي لوګاریتم ښودنه کوي

د انواعو بډايتوب (Species richness)

په يوه ځانگړې ساحه کې د انواعو گڼوالی (Species richness) بلل کيږي او د لاندې ځانگړي فارمول پواسطه محاسبه شوي دي

$$D = \frac{S}{\sqrt{N}}$$

په پورته ذکر شوي فورمول کې

S = د انواعو د تعداد ښودنه کوي

N = د هرې نوعې د شمير ښودنه کوي

نسبتي گڼوالی (Relative Density)

$(n_i/N) \times 100$ = په ټوله انتخاب شوې ساحه کې انفرادي نوعه (%) نسبتي گڼوالی

دغه کرڼه په ټوله ساحه کې د هرې ځانگړې نوعې د سلنې د کره شميرې د ښودنې په موخه ترسره کيږي چې

N = د انتخاب شوې سيمې اړوند ټوله ساحه کې د ټولو نوعو کره شميره

n_i = د هرې نوعې اړوند د تعداد ښودنه کوي.

موندنې

په دیوه گل دره کې د ونو او بوټو ۳۰ مختلفې نوعې چې ۱۷ مختلفو نباتي کورنیو پورې تړاو لري شتون لري. په ذکر شوو کورنیو کې د Rosaceae کورنۍ یې تر ټولو زیات (۵) سپیشزونو په درلودلو سره غالبه کورنۍ ده ورپسې Fabaceae کورنۍ (۳) سپیشزونه، Moraceae (۳) سپیشزونه او Rutaceae (۳) نوعې لري. له ذکر شوو ونو او بوټو څخه (*Quercus dilatata*) د ($RD=19.6$) نسبتي ګڼوالي په لرلو سره تر ټولو زیاته ساحه تر پوښښ لاندې راوستې ده همدارنګه په ترتیب سره (*Olea europaea*) د ($RD=16.8$) نسبتي ګڼوالي، (*Zizyphus spp*) د ($RD=10.63$) نسبتي ګڼوالي، (*Reptonia boxifolia*) د ($RD=9.85$) نسبتي ګڼوالي په درلودلو سره تر ټولو غالبې نوعې وې پداسې حال کې (*Pistacia khinjuck*) د ($RD=0.32$) نسبتي ګڼوالي په درلودلو سره تر ټولو کمه ساحه پوښلې ده. همدارنګه د فرمول په اساس Shannon Weiner د نوعو د تنوع لړیال ($H' = 2.6$) داسې ښودنه کوي چې د دیوه گل درې د ونو او بوټو تنوع په اوسط حالت کې قرار لري پداسې حال کې چې د تنوع یوشانوالی یې ($Eveness = 3.4$) دی.

(۱) جدول. په دیوه گل دره کې د ونو او بوټو تنوع ښايي

شماره	علمي نوم	عام نوم	محلي نوم	کورنۍ	دفعاتو شمیر	نسبتي ځنوالی
۱	<i>Citrus aurantium</i>	Sour orange	نارنج	Rutaceae	۹	0.57
۲	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalyptus	لاچي	Myrtaceae	۱۷	1.09
۳	<i>Morus alba</i>	Mulberry	توت	Moraceae	۸۶	5.54
۴	<i>Dalbergia sissoo</i>	Shisham	شوه	Fabaceae	۱۱	0.7
۵	<i>Prunus persica</i>	Peach	شفتالو	Rosaceae	۹	0.57
۶	<i>Olea europaea</i>	Olive	بنوون	Oleaceae	۲۶۲	16.8
۷	<i>Pinus wallichiana</i>	Pine	نښتر	Pinaceae	۹	0.57
۸	<i>Tamarix aphylla</i>	Thamarix	غز	Tamaricaceae	۱۶	1.03
۹	<i>Ficus carica</i>	Fig	انځر	Moraceae	۹۴	6.05
۱۰	<i>Quercus dilatata</i>	Green oak	څيری	Fagaceae	۳۰۵	19.6
۱۱	<i>Diospyrus lotus</i>	Date plum	تور املوک	Ebenaceae	۲۱	1.35
۱۲	<i>Juglans regia</i>	Walnut	غوز	Juglandaceae	۱۳	0.83
۱۳	<i>Populus spp</i>	Populus	سفیدار	Salicaceae	۲۰	1.28
۱۴	<i>Reptonia boxifolia</i>	Buckthorn	گورگوره	Sapotaceae	۱۵۳	9.85

10.63	۱۶۵	Rhamnaceae	بیره	Jujube tree	<i>Zizyphus spp</i>	۱۵
9.14	۱۴۲	Fabaceae	پلوسه	Acaci	<i>Acacia modesta</i>	۱۶
5.02	۷۸	Sapindaceae	غوراسکی	Hup bush	<i>Dodonaea viscosa</i>	۱۷
0.57	۹	Fabaceae	کیکر	Gum arabic	<i>Acacia nilotica</i>	۱۸
0.32	۵	Anacardiaceae	شنی	Wild pistacio	<i>Pistacia khinjuck</i>	۱۹
0.64	۱۰	Meliaceae	بکیانه	Chinaberry	<i>Melia azedarach</i>	۲۰
1.41	۲۲	Moraceae	تور توت	Mulberry	<i>Morus nigra</i>	۲۱
0.83	۱۳	Rutaceae	مالته	Orange	<i>Citrus sinensis</i>	۲۲
0.96	۱۵	Cupressaceae	اوبخته	Juniper	<i>Juniperus communis</i>	۲۳
0.83	۱۳	Rosaceae	لوکات	Loquat	<i>Eriobotrya japonica</i>	۲۴
0.57	۹	Rosaceae	الوجه	Plum	<i>Pronus domestica</i>	۲۵
0.51	۸	Rosaceae	ناک	Pear	<i>Pyrus communis</i>	۲۶
0.51	۸	Myrtaceae	گلبد	Bottle brush	<i>Callistemon viminalis</i>	۲۷
0.9	۱۴	Rosaceae	زردالو	Apricot	<i>Prunus armenica</i>	۲۸
0.51	۸	Rutaceae	لیمو	Lemon	<i>Citrus limon</i>	۲۹
0.51	۸	Rosaceae	سور توت	Mulberry	<i>Morus rubra</i>	۳۰

شماره	نوعه	دفعات و شمیر	Pi	LN Pi	Pi * LN Pi
1	لاچی	17	0.010953608	-4.514086357	-0.049445534
2	سپین توت	86	0.055412371	-2.892952404	-0.160305352
3	شوه	11	0.007087629	-4.949404428	-0.035079542
4	شفتالو	9	0.005798969	-5.150075123	-0.029865126
6	نبوون	262	0.168814433	-1.778955197	-0.300313313
7	ننبر	9	0.005798969	-5.150075123	-0.029865126
8	غز	16	0.010309278	-4.574710979	-0.047161969
9	انخر	94	0.06056701	-2.804004918	-0.169830195
10	خیری	305	0.196520619	-1.626987924	-0.319736673
11	توراملوک	21	0.013530928	-4.302777263	-0.058220569
12	چهارمغز	13	0.008376289	-4.782350343	-0.040058347
13	سفیدار	20	0.012886598	-4.351567427	-0.0560769
14	گورگره	153	0.098582474	-2.316861779	-0.228401967
15	بیره	165	0.106314433	-2.241354227	-0.238288304
16	پلوخه	142	0.091494845	-2.391472643	-0.21880742
17	غوراسکی	78	0.050257732	-2.990590874	-0.150300315
18	کیکر	9	0.005798969	-5.150075123	-0.029865126
19	شنی	5	0.003221649	-5.737861788	-0.018485379
20	بکیانه	10	0.006443299	-5.044714608	-0.032504604
21	تور توت	22	0.014175258	-4.256257247	-0.060333543
22	مالته	13	0.008376289	-4.782350343	-0.040058347
23	اوبخته	15	0.009664948	-4.6392495	-0.044838107
24	لوکات	13	0.008376289	-4.782350343	-0.040058347
25	الوجه	9	0.005798969	-5.150075123	-0.029865126
26	ناک	8	0.005154639	-5.267858159	-0.027153908
	گلید	8	0.005154639	-5.267858159	-0.027153908

-0.042471259	-4.708242371	0.009020619	14	زردالو	28
-0.027153908	-5.267858159	0.005154639	8	لیمو	29
-0.027153908	-5.267858159	0.005154639	8	سورتوت	30
-2.608717248		1			

د نوعو د تنوع لړيال ($H' = 2.6$) داسې ښودنه کوي چې د دیوه گل درې د ونو او بوټو تنوع په اوسط حالت کې قرار لري پداسې حال کې چې د تنوع یوشانوالی یې ($\text{evenness} = 3.4$) دی .

Shannon Diversity Index(H)	2.6
Evenness	3.4
Species Richness	30



علمي نوم: *Juglans regia*
 انگليسي نوم: Walnut
 محلي نوم: چهارمغز
 کورنۍ: Juglandaceae

مورفولوژي

دا نبات پلن پانه او پانېژې ونه ده چې ۲۵-۳۰ متره پورې لوړوالی لري او قطر يې تر ۲ مترو پورې رسېږي خو زموږ خپړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په دیوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توګه ۱۹ متره اوږدوالی او ۱۳۰ سانتي متره قطر لري. او په سختو حالاتو کې وده کوي، پوستکی يې څر رنگ لري. د ځوانۍ په حالت کې يې پوستکی ښويه او کله چې يې عمر زیاتېږي پوستکی يې هم زیږوالی غوره کوي. د پانو ډول يې Imperipinnate دی او د پانو اوږدوالی يې ۲۰-۵۰ ملي مترو پورې رسېږي، گلان يې Dioicous دي او نارینه گلان يې ۵-۱۲ سانتي متره پورې اوږدوالی لري او د گلانو رنگ يې شين دی، میوه يې سپتمبر نه تر اکتوبر میاشتو کې پخېږي (Alam, 2011).

انتشار او خپرښت ساحه

دا ونه د اروپا جنوب ختیځ، د اسيا جنوب ختیځ، مرکزي اسيا، قفقاز، پاکستان، هماليا، برما او اکثره زراعتي سیمو کې پیدا کېږي د بحر د سطحې څخه په ۱۵۰۰-۲۵۰۰ مترو پورې ارتفاع کې پیدا کېږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010). خو په افغانستان کې دا نبات ۲۶۰۰ متره په ارتفاع کې پیدا کېږي چې زیاتره په افغانستان کې په کابل، لغمان، نورستان، کنړ او ننگرهار ولایتونو کې پیدا کېږي. همدارنګه دا نبات نیمه سیوري خوشونکی نبات دی چې په غني او لږ رطوبت لرونکې ژووره خاوره کې ښه وده کوي چې هم په یواځې او هم د پانېژه ونو سره په ګروپي شکل پیدا کېږي (Alam, 2011).

استعمال

د دې ونې د لرګي څخه د فرنیچر په جوړولو کې، د پوستکي او پانو څخه يې په رنگ جوړولو کې استفاده کېږي او د لرګي څخه يې د چينجي ضد مادې په توګه هم استفاده کېږي او د چهارمغزو تیلد رنگ د تولید لپاره هم استفاده کېږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010). ددې نبات ځوانې او شې میوې په زیاته اندازه ویتامین سي لري چې اکثره د مربا په جوړولو کې ترې استفاده کېږي، لرګی يې دروند او قوي دی نو له همدې امله د فرنیچر لپاره غوره لرګی دی (Alam, 2011).



علمي نوم: *Quercus dilatata*

انگليسي نوم: green oak

محلي نوم: خيړی

کورنۍ: Fagaceae

مورفولوژي

خيړی يا بلوط تل شنه او د قوي ښاخونو لرونک و نه ده چې د ۱۲-۱۳ مترو پورې لوړوالی لري . او قطر يې تر ۲ مترو پورې رسېږي خو زموږ خيړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۴،۵ متره اوږدوالی او ۷۹ سانتي متره قطر لري. د خيړۍ پاڼې ډېلې او گردې دي چې ۲،۵ - ۴ سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. ښځينه گلان يې سلنډر شکله او لنډ وي (Alam, 2011). د دې ونې گل د اپريل نه تر مۍ مياشتو کې غوړيږي او گلان يې Monoecious دي پوستکۍ يې په لومړيو وختونو کې خړ نصواري رنگ لري خو د وخت په تيريدو سره بيا تور خړ رنگ غوره کوي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپرښت ساحه

دا نبات په پاکستان، شمال لويديځ هند او هماليا کې پيدا کيږي او د افغانستان په ختيځو سيمو کې په زياته اندازه پيدا کيږي. خيړۍ د وچکالۍ او يخوښې په مقابل کې يو مقاومت لرونکی نبات دی چې د غرونو په لمنو کې ښه وده کوي. همدا رنگه دا نبات په وچو او سلوې لرونکو ساحو کې ښه وده کوي او د بحر د سطحې څخه په ۱۱۰۰-۲۴۰۰ مترو پورې ارتفاع کې پيدا کيږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

استعمال

ددې ونې څخه په ساختماني چارو کې استفاده کيږي، همدارنگه د سون موادو په توگه ترې هم استفاده کيږي او د پاڼو او کوچنيو شاخونو څخه يې د علوفې په منظور هم استفاده کيږي او همدارنگه د کتارو په جوړولو کې ترې هم استفاده کيږي. د دې ونې لرگی سخت او ډير وزن لرونکی دی چې د زياتې تودوخې د ورکړې توانايي لري نو ځکه ترې سکاره په زياته اندازه تر لاسه کيږي (Alam, 2011).



علمي نوم: *Dalbergia sissoo*

انگليسي نوم: Shisham

محلي نوم: شوه

کورنۍ: Fabaceae

مورفولوژي

شوه يوه پلن پانې او پانېژې ونه ده چې ۲۵-۴۰ مترو پورې لوړوالی لري او قطر يې ۱-۲ مترو پورې رسېږي خو زموږ څېړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۱۸ متره اوږدوالی او ۱۵۰ سانتي متره قطر لري. پوستکی يې زېړ او خړ رنګ لرونکی دی، ښاخونه يې پراخه او پراگنده شوي وي او د پانو ډول يې Acuminate د ۱۲-۱۸ سانتي مترو پورې اوږدوالی لري، گلان پېخوښوداره ژېړ رنګه سپين رنګ لري. تخمونه يې په نومبر او اکتوبر مياشتو کې پخېږي (Alam, 2011).

انتشار او خپرښت ساحه

دا نبات د هماليا لړيو اصلي نبات دی چې ۱۲-۲۲ سانتي گراډ کې په ښه شکل وده کوي او د افغانستان په زياتو ولايتونو لکه کابل، ننگرهار، لغمان، کنړ، خوست، نورستان او داسې نورو ولايتونو کې په سترگو کيږي (Alam, 2011). شوه د ايران په جنوب ختيځ، پاکستان، هند او اکثره زراعتي سيمو کې پيدا کيږي. سوري لرونکو د غرونو لمنو او سيندونو شاوخوا کې زرغونيزي همدارنګه دا نبات په شگلنو او جغل لرونکو خاورو کې ښه وده کوي او د سرکونو، نهرونو، کروندو او ځنگلونو کې په کمه اندازه پيدا کيږي. شوه د بحر له سطحي څخه ۶۰۰-۱۲۰۰ متره ارتفاع کې پيدا کيږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

استعمال

د دې نبات لرګی ډير سخت او د واینو پر وړاندې د زيات مقاومت لرونکی دی نو ځکه يې لرګی په ساختماني چارو کې په زياته اندازه استعمالیږي. د پانو څخه يې د سون موادو په توګه او د تخمونو څخه يې تیل استخراجیږي چې د پوستکي ناروغيو په علاج کې ترې استفاده کيږي همدارنګه د دې نبات څخه د سون موادو په توګه هم استفاده کيږي (Alam, 2011).



علمي نوم : *Ficus carica*

انگليسي نوم : Fig

محلي نوم : انځر

کورنۍ : Moraceae

مورفولوژي

د انځر نبات يوه کوچنۍ ونه ده چې اوږدوالی يې ۵-۶ مترو پورې او قطر يې ۷۵ سانتي مترو پورې رسېږي خو زموږ څېړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۵،۳ متره اوږدوالی او ۳۳ سانتي متره قطر لري. گل يې د پسرلي په آخرو وختونو کې ليدل کيږي، د گلانو ډول يې hyphantodium دی او گرده افشاني يې د مچيو په وسيله ترسره کيږي.. (Breckle & Rafiqpoor,2010)

انتشار او خپرښت ساحه

اینځر په مدیترانه، اروپا، افریقا، اسیا، ایران، ترکمنستان او تاجکستان کې هم پیدا کیږي. د افغانستان په زیات شمیر زراعتي سیمو کې پیدا کیږي. همدارنگه باغونو او کورونو په شاوخوا کې کرل کیږي. اینځر د بحر له سطحې څخه ۴۰۰-۱۶۰۰ متره لوړوالي کې پیدا کیږي (Breckle & Rafiqpoor,2010).

استعمال

اینځر نبات په زیاته اندازه اقتصادي ارزښت لري چې میوه یې په وچه او لمده توگه خوړل کیږي، دا نبات لوی او پلنې پانې لري چې د پانو څخه یې د حیواناتو لپاره د علوفې په ډول استفاده کیږي همدارنگه دا نبات په اکثره ځایونو کې د زینت په ډول او هم د سیوري په منظور هم کرل کیږي (Breckle & Rafiqpoor,2010).



علمي نوم: *Eucalyptus camaldulensis*

انگليسي نوم: Eucalyptus

محلي نوم: لاچي

کورنۍ: Myrtaceae

مورفولوژي

لاچي نبات يوه تل شنه ونه ده، د دې نبات اوږدوالی د ۲۰-۴۰ مترو پورې رسېږي او قطر يې ۱،۵-۳ مترو پورې رسېږي خو زموږ څېړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۱۹ متره اوږدوالی او ۳۲ سانتي متره قطر لري. پوستکي يې شين رنگه او د ځوانۍ په وخت کې ښويه وي خو د وخت په تيريدو سره زيروالی غوره کوي. د پانو ډول يې Acuminate دی او د پانو اوږدوالی يې ۱۰-۲۰ سانتي مترو پورې رسېږي. د گلانو ډول يې Solitary دی د لاچي ونې گل له پسرلي څخه اوږي پورې ليدل کيږي. د گل رنگ يې زير او سپين دی (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپريدو ساحه

لاچي په استراليا کې په زيات شمير پيدا کيږي او په استراليا کې ترې زياته استفاده کيږي ځکه چې ژر رسيدونکي ونه ده. د لاچي ونې ۵۰۰ نوعې او ډولونه د استراليا په ځنگلونو کې پيدا کيږي. په افغانستان کې په زراعتي سيمو او هغه ځايونو کې پيدا کيږي چې کنگل ونلري همدارنگه دغه ونه د جلال اباد ښار د ښاري ونو په نوم هم يادېږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

استعمال

ددې نبات څخه د کښتيو په جوړولو او زراعتي سامان الاتو په جوړولو کې استفاده کيږي او د پانو څخه يې ضروري تيل ويستل کيږي چې د مکروب ضد درملو په توگه ترې استفاده کيږي دې ونې څخه د تيلو په استحصال کې استفاده کيږي همدارنگه طب، کاغذ جوړولو، د لرگيو د توليد او د زينت لپاره هم استعمالېږي (Alam, 2011).



علمي نوم: *Olea europaea*

انگليسي نوم: wild olive

محلي نوم: وحشي زيتون

کورنۍ: Oleaceae

مورفولوژي

دا نبات يوه تل شنه ونه ده چې د ۱۰-۱۵ متره پورې لوړوالی لري او قطر يې د ۱ متر پورې رسېږي خو زموږ څېړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په دیوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۳،۶ متره اوږدوالی او ۵۸ سانتي متره قطر لري. د پاڼو ډول يې Obtuse دی او پاڼې يې په دواړو څوکو کې نرۍ شوي وي، گلان يې Perfect دي. میوه يې وړه او کوچنۍ ده چې د ۸ ملي مترو پورې اوږدوالی لري او میوه چې يې کله پخه شي تور رنګ غوره کوي (Alam, 2011). د زيتون گل د اپريل نه تر مۍ مياشتو کې غوړيږي، د گلانو رنګ يې سپين دی. لرگی يې ډير سخت او د پاڼو شاته برخو رنګ يې د زنگ وېلي او سپينوالی لري (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپرښت ساحه

زيتون د پاکستان په کشمير ايالت په اکثره سيمو کې پيدا کيږي، د افغانستان په ختيځو ولايتونو کې په زياته اندازه پيدا کيږي. د بحر د سطحي څخه ۹۰۰ نه تر ۱۸۰۰ متره په ارتفاع کې ښه وده کوي (Breckle & Rafiqpoor, 2010). دا نبات د جنوب لويديځې اسيا او د ختيځ افغانستان څخه نيولی تر لويديځ نيپال پورې ليدل کيږي په گرمو سيمو او سيندونو سره نږدې ساحو کې ښه وده کوي (Alam, 2011).

استعمال

د دې نبات لرگی دروند او کلک دی چې په نجاری کې ترې استفاده کيږي، میوه يې د خوراک په منظور استعمالیږي او هم ورڅخه تیل ویستل کيږي د دې ونې څخه د زيتونو تیل توليدیږي، میوه يې په تازه توگه د خوراک او د اچارو په جوړولو کې ترې هم گټه اخيستل کيږي.



علمي نوم: *Platanus orientalis*

انگلیسي نوم: oriental plane tree

محلي نوم: چنار

کورنۍ: Platanaceae

مورفولوژي

چنار یوه درمیانہ سائز لرونکې ونه ده چې ۲۷-۳۳ مترو پورې لوړوالی لري او قطر یې ۱-۱.۵ مترو پورې رسیږي خو زموږ څیړنو وښودله چې د کنړ ولایت، څوکی ولسوالۍ په دیوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توګه ۱۷ متره اوږدوالی او ۵۳ سانتي متره قطر لري. پوستکي یې په خپله سطحه باندې کرښې لري، د پاڼو ډول یې palmate دی چې ۱۵-۲۵ سانتي متره پورې پراخوالی لري، میوه یې بال ته ورته ده چې په خپل ځان باندې ویښته ډوله ساختمانونه لري (Breckle & Rafiqpoor, 2010). د چنار گل د اپریل نه تر می میاشتو پورې لیدل کیږي، مونث گلونه یې غټ او مذکر یې واړه او کروي شکل لري، ګرده افشانې یې د باد په وسیله ترسره کیږي، پوستکي یې سپین او شین ته ورته دی. د چنار ونه غټه تنه لري (Alam, 2011).

انتشار او خپریدو ساحه

چنار په اروپا، منځنۍ او مرکزي اسیا کې په زیاته پیمانه پیدا کیږي د افغانستان په شمال، مرکز، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې پیدا کیږي. چنار په اروپا کې په دوه رګه شکل لیدل کیږي، د اروپا په جنوب ختیځ او جنوب لویدیځ کې پیدا کیږي دا نبات د بحر له سطحې څخه ۵۰۰ - ۲۵۰۰ متره ارتفاع کې پیدا کیږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

استعمال

د چنار ونه د زینت په منظور د سرکونو، نهرونو، په لارو او کورونو کې د سیوري د جوړولو لپاره کرل کیږي همدارنګه د دې نبات لرګی صفا دی چې په اسانۍ سره پالش کیږي نو له همدې امله ترې په نجاری کې استفاده کیږي (Alam, 2011).



علمي نوم: *Populus spp*

انگليسي نوم: *Populus*

محلي نوم: سپيدار

کورنۍ: *Salicaceae*

مورفولوژي

سفيدار يوه پانريژه ونه ده چې پوستکۍ يې سپين ته ورته رنگ لري. تکثير يې د قلمې او د نورو لارو په وسيله ترسره کيږي، سپيدار نبات ۳۰ متره پورې لوړوالی لري او قطر يې ۹۰ سانتي مترو پورې رسيږي خو زموږ څيړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکۍ ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۱۵ متره اوږدوالی او ۲۱ سانتي متره قطر لري. نارينه گلان يې Catkin شکل لري او ۳-۶ سانتي مترو پورې اوږدوالی لري، ښځينه گلان يې هم Catkin ډوله دي چې ۵-۱۰ سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. گلان يې اپريل نه تر مۍ مياشتو پورې غوږيږي، لرگۍ يې سپين رنگه، نرم او په کمه اندازه Node لري (Alam, 2011). گرده افشاني يې د باد په وسيله ترسره کيږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپرښت ساحه

سپيدار ونه په شمالي افريقا، جنوب لويديځه اسيا او اروپا کې په زياته اندازه پيدا کيږي همدارنگه دا ونه د اسيا جنوب لويديځ، قفقاز، ايران، مرکزي اسيا، پاکستان او سينگا پور کې پيدا کيږي. د افغانستان په زيات شمير زراعتي سيمو کې پيدا کيږي. دا ونه د بحر له سطحې څخه د ۴۰۰-۲۴۰۰ مترو پورې په ارتفاع کې پيدا کيږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

استعمال

څرنگه چې دا ونه تيزه وده لري نو له همدې امله په زياته پيمانه د سوخت لپاره کرل کيږي، د دې نبات څخه په ساختماني مواردو کې استفاده کيږي، د کرنيز سامان الاتو لکه بيلچه، لور، رمبي په جوړولو کې ترې استفاده کيږي او د حيواناتو لپاره د علوفې په برابرولو کې ترې استفاده کيږي (Alam, 2011).



علمي نوم: *Reptonia boxifolia*

انګليسي نوم: Buckthorn

محلي نوم: گورگره

کورنۍ: Sapotaceae

مورفولوژي

گورگره قوي اغزي لرونکې کوچنۍ ونه ده چې اوږدوالی يې ۵-۷ مترو پورې رسېږي او قطر يې ۶۰-۹۰ سانتي مترو پورې رسېږي خو زموږ څېړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په دیوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توګه ۵ متره اوږدوالی او ۲۸ سانتي متره قطر لري. تاج برخه يې راغونډه شوي وي، پاڼې يې تل شني وي او تر ۳ سانتي مترو پورې اوږدوالی لري، ګلان يې کوچني او زير رنګه وي او میوه يې چې پخه شي تور رنګ غوره کوي (Alam, 2011). د دې ونې ګلان د اپريل نه تر می میاشتو پورې لیدل کېږي، تیت قدې ونه ده چې تل شنه وي، ساقه يې لنډه او ضخيمه ده میوه يې تور رنګه کروي او خوږه ده (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپرښت ساحه

گورگره د خپرښت ډيره وړتيا لري چې په ختيځه افريقا، افغانستان، پاکستان او داسې نورو هېوادونو کې پيدا کېږي. همدارنګه گورگره په وچو او شگلنو خاورو کې ښه وده کوي، گورگره د بحرله سطحې څخه ۷۰۰-۱۴۰۰ مترو په ارتفاع کې پيدا کېږي همدارنګه دا نبات د عربستان جنوب ختيځ، پاکستان، عمان او سوماليا کې هم په زیاته اندازه پيدا کېږي او د افغانستان په ختيځو سيمو کې په زیات شمير پيدا کېږي (Alam, 2011).

استعمال

د دې نبات لرګی په خپل ځان باندې اغزي لري نو په همدې اساس په تجارت کې په کمه اندازه استعمالېږي خو مېوه يې د خوراک په منظور استعمالېږي، میوه يې وچېږي او په مربا کې ترې استفاده کېږي همدارنګه د دې نبات د پاڼو څخه د علوفې په ډول هم استفاده کېږي او د لرګي څخه يې د سون موادو په توګه هم استفاده کېږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).



علمي نوم *Tamarix aphylla*:

انگليسي نوم Thamarix:

محلي نوم: غز

کورنی: Tamaricaceae

مورفولوژي

دا نبات تل شنه او ستن پانې ونه ده، د دې نبات اوږدوالی ۱۵-۲۰ مترو پورې رسېږي، قطر يې ۱ متر پورې رسېږي خو زموږ څېړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۲،۵ متره اوږدوالی او ۸۰ سانتي متره قطر لري. پوستکي يې خړ رنګ څخه نيولی تر سور رنګه غوره کوي. پانې يې ډنډرکي نلري او ۱-۲ ملی مترو پورې اوږدوالی لري. د دې ونې گل د جون نه تر اکتوبر مياشتو کې لیدل کېږي، گلانو رنګ يې گلابي رنګه سپين دی او د گلانو ډول يې Raceme دی، دا نبات په اسانۍ سره د قلمو له لارې تکثيريږي، دا نبات د وچکالۍ په وړاندې ډير مقاومت لري (Alam, 2011).

انتشار او خپرښت ساحه

غز يوه قوي ونه ده چې د وچکالۍ په وړاندې ډير مقاومت لري، دا ونه ژورور ريشوي سيستم لري، په وچو، ډبرينو او مالگينو خاورو کې ښه وده کوي، کولی شي چې تر ۵۰ ملي مترو کلني اورښت کې وده وکړي، غز په مصر، د اسيا په جنوب لويديځ، عربستان، عراق، ايران، پاکستان او د افغانستان په غريزو سيمو په غريزو سيمو کې په زياته پيمانه پيدا کېږي خو تر يوه حده زراعتي سيمو کې پيدا کېږي او د بحر د سطحې څخه تر ۱۳۵۰ متره ارتفاع کې پيدا کېږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

استعمال

د دې نبات د پوستکي څخه تانين استخراجيږي چې د استخراج شوو تانيو څخه بيا په طبابت کې استفاده کېږي، د غز نبات د لرگي څخه د سون موادو په توگه هم استفاده کېږي (Alam, 2011).



علمي نوم: *Acacia modesta*

انگليسي نوم: acacia

محلي نوم: پلوڅه

کورنۍ: Fabaceae

مورفولوژي

پلوڅه يوه تل شنه پلن پانې ونه ده چې درميانه سايز لري، اوږدوالی يې ۶ - ۸ مترو پورې رسيري خو زموږ څيړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۱,۵ متره اوږدوالی او ۳۸ سانتي متره قطر لري. غیر منظم شاخونه لري، پوستکی يې زیر خړ او غیر منظم نري درزونه لري، د گلاتو ډول يې Spike او گلان يې د جون نه تر جولای میاشتو پورې لیدل کيږي او په سپتمبر میاشت کې پخيري، پلوڅه قوي ونه ده چې په غیر محیطي شرایطو کې هم ښه وده کوي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپرښت ساحه

پلوڅه د بحر د سطحې څخه ۱۴۰۰ متره په ارتفاع کې پیدا کيږي، دا نبات په ډبرینو خاورو کې ښه وده کوي همدا راز دا نبات په میلان لرونکو او د غرونو غاړو کې ښه وده کوي خو په کرنیزو ځمکو کې هم ښه وده کوي، پلوڅه په ختیځ افغانستان، مرکزي پاکستان، او د هندوستان په لویدیځ کې په زیاته پیمانه پیدا کيږي. په افغانستان کې په خوست ولایت کې په ۱۴۰۰ متره په ارتفاع کې زیاته پیدا کيږي.

استعمال

د دې نباتلرگی ډیر سخت دی نو ځکه په فرنیچر او ساختماني مواردو کې ترې ډیره استفاده کيږي او د لرگي څخه یې په کمه اندازه ژاوله ترلاسه کيږي چې په دوا جوړولو کې ترې استفاده کيږي. همدارنگه د ځوانو شاخونو څخه یې شیره اخیستل کيږي چې د غاښونو د صفایۍ لپاره استعمالیږي او د غاښونو د ناروغیو په استعمال کې ترې هم استفاده کيږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).



علمي نوم: *Morus alba*

انگلیسي نوم: Mulberry

محلي نوم: سپين توت

کورنی : Moraceae

مورفولوژي

توت یو پانریزه او پلن پانې ونه ده چې ۱۰-۱۵ متره اوږدوالی لري، قطر یې تر ۲ مترو پورې رسیري خو زموږ څیړنو وښودله چې د کنړ ولایت، څوکی ولسوالۍ په دیوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توګه ۷ متره اوږدوالی او ۸۵ سانتي متره قطر لري. خابونه یې د تاج په برخه کې سره راټول شوي وي، پوستکي یې د ځوانۍ په وخت کې شین رنګ لري خو د وخت په تیریدو سره څر رنګ غوره کوي او نا منظم درزونه پکې رامنځته کیږي، پانې یې پراخه او Ovate شکل لري د ۵-۱۵ سانتي مترو پورې اوږدوالی لري، ګلان یې Monocious دي چې د مارچ نه تر اپریل میاشتو کې په نبات کې لیدل کیږي او د اپریل نه تر جون میاشتو کې پخیري (Alam, 2011).

انتشار او خپرښت ساحه

دا نبات د بحر د سطحې څخه په ۴۰۰ - ۲۳۰۰ متره ارتفاع کې په زیاته اندازه شتون لري. دا نبات په کرنیزو خاورو کې نسبت غرنیو خاورو ته ښه وده کوي همدارنګه په ټولو کم ارتفاع لرونکو غرنیو سیمو کې هم پیدا کیږي. د سرکونو او نهرونو په غاړو کې هم پیدا کیږي توت په نړیواله کچه په چین، عراق، ایران، پاکستان، ترکمنستان، د اسیا جنوب ختیځ، اروپا او امریکا کې شتون لري د افغانستان په زراعتي سیمو او غرنیو سیمو کې هم پیدا کیږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

استعمال

د دې نبات پوستکي نری دی چې د کاغذ په جوړولو کې ترې استفاده کیږي او د پوستکي څخه یې د ورینمو چینجي د تغذیې لپاره استفاده کوي همدارنګه د دې نبات د پانو څخه د حیواناتو د تغذیې استفاده هم کیږي او د میوې څخه یې د ستونې په دردونو کې استفاده کیږي. د توت د لرګي څخه د موسیقۍ سامان الات جوړیږي، میوه یې په تازه شکل د خوراک لپاره استعمالیږي او نرمې پانې یې د ورینمو چینجي لپاره په زړه پوري خواړه دي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).



علمي نوم: *Melia azedarach*

انگليسي نوم: chinaberry tree

محلي نوم: بکيانه

کورنۍ: Meliaceae

مورفولوژي

بکيانه يوه پانريزه ونه ده چې ۵-۱۲ متره ارتفاع لري او قطر يې ۱ متر پورې رسيږي خو زموږ څيړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۷ متره اوږدوالی او ۵۰ سانتي متره قطر لري. دا يوه درميانه سايز لرونکې ونه ده چې د Sucker له لارې تکثر کوي او ډير په تيزۍ سره وده کوي پوستکي يې په ځوانۍ کې شين رنګ لري خو د وخت په تيريدو سره خړ يا نصواري رنګ غوره کوي پانې يې کم رنګه شين رنګ لري او پانې يې مرکبې وي. په اپريل مياشت کې گلان نيسي، گلان يې ياسميني رنګ لري، نارينه او ښځينه گلان يې په يو نبات کې وي خو په جلا جلا ډول او ستوري ته ورته شکل لري. د گلانو څخه يې ژير رنګه ميوې رامنځ ته کيږي چې زهري خواص لري (kateude et al, 1995).

انتشار او خپرښت ساحه

بوکيانه د بحر له سطحې څخه ۵۰۰-۹۰۰ متره ارتفاع کې موندل کيږي دا نبات په استوايي او نيمه استوايي سيمو کې ښه وده کوي. نوموړی نبات د ناوړه اقليمي شرايطو او د خاورې د ناوړه شرايطو سره مقاومت لري. همدارنګه د بوکيانې نبات د يخې او گرمې هوا پر وړاندې هم ښه مقاومت لري. بوکيانه په هماليا او زيات شمير گرمو هېوادونو کې پيدا کيږي. د دې نبات اصلي هېوادونه چين، جاپان، هند او د اسيا جنوب ختيځ هېوادونه دي او د افغانستان په ختيځ زون زراعتي سيمو کې پيدا کيږي (Alam, 2011).

استعمال

دا نبات ژر رسيدونکې ونه ده چې د لرګي څخه يې د زراعتي سامان الاتو الاتو په جوړولو کې، د فرنيچر په جوړولو کې او په تعميراتي سامان الاتو کې ترې هم استفاده کيږي. د دې نبات د پانې او کوچنيو شاخونو څخه د پسونو او وزو د علوفې لپاره استفاده کيږي، دا نبات د واینو پر وړاندې مقاومت لري ځکه چې لرګي يې زهري خاصيت لري او نوموړی نبات د طبي استعمال له امله هم شهرت لري د مېوو څخه يې د تسبيحو او غاړکيو په جوړولو کې استفاده کيږي (kateude et al, 1995).



علمي نوم: *Pinus wallichiana*

انگليسي نوم: Pine

محلي نوم: نښتر

کورنۍ: pinaceae

مورفولوژي

نښتر ستن پاڼه تل شنه ونه ده چې اوږدوالی یې تر ۵۰ مترو پورې رسیږي او قطر یې تر ۱ متر پورې رسیږي خو زموږ خپرونو وښودله چې د کنړ ولایت، څوکی ولسوالۍ په دیوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توګه ۲۴ متره اوږدوالی او ۹۰ سانتي متره قطر لري. پوستکی یې نصواري رنگ لري او په کمه اندازه درزونه لري. د دې نبات تنه نیغه او مستقیمه ختلې وي. پاڼې یې ستن ډوله او په ښاخونو باندې په غونچه یي ډول سره ترتیب شوي وي، گلونه یې Monoecious ډوله او په May-Oct میاشت کې غوړیږي او تخمونه یې په Sep-Oct میاشت کې پخیري. دا نبات قوي او ژوړ رینوي سیستم لري، د دې نبات پاڼې په خپل ترکیب کې د Turpentine پنوم کیمیاوي مواد لري او کله چې باران وشي دغه مواد مینځل کیږي او په موجوده ساحه کې د کوچنیو نباتاتو د شنه کیدو مخه نیسي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپرښت ساحه

د نښتر نبات د بحر له سطحې څخه په ۲۰۰-۲۵۰۰ متره ارتفاع کې پیدا کیږي. د دې ونې اصلي ټاټوبی د هماليا او هندوکش غرونه دي چې د افغانستان، د هند شمال او ختیځ، پاکستان، چین او بوتان پورې خپره شوې ده دا ونه د افغانستان د غرنیو ساحو د مهمو ځنگلي ونه څخه شمیرل کیږي (Alam, 2011).

استعمال

دا ونه زیات اقتصادي ارزښت لري چې په ساختماني او تجارتي برخو کې ترې استفاده کیږي. د دې ونې د پوستکي څخه ریزین استخراجیږي چې په طبي مواردو لکه د ملا درد او داسې نورو مواردو کې ترې استفاده کیږي. د دې ونې لرگی سخت او دوامداره دی چې صنعت، ساختماني مواردو، فرنیچر، کتاره جوړونه او همدارنګه د زینت په خاطر د پارکونو او سرکونو په غاړو کې کرل کیږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).



علمي نوم: *Acacia nilotica*

انگلیسي نوم: Gum Arabic tree

محلي نوم: کیکر

کورنۍ: Fabaceae

مورفولوژي

دا یوه اغزي لرونکې درمیانہ سایز لرونکي ونه ده چې لوړوالی یې ۱۰-۲۵ مترو پورې رسېږي خو زموږ څېړنو وښودله چې د کنړ ولایت، څوکی ولسوالۍ په دیوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توګه ۱۳ متره اوږدوالی او ۷۰ سانتي متره قطر لري. څو کلن نبات دی چې زېږ څر پوستکی لري او په تنه او شاخونو باندې اغزي لري. د (Girth) اندازه یې د ۲-۵ مترو پورې رسېږي. دا نبات په وچو سیمو کې ښه وده کوي. ژور رېښوي سیستم لري. دا نبات په Dec-Jan میاشتو کې گلان کوي. او له اپریل نه تر جون میاشتو کې یې گلان پخېږي. دا نبات په ګرمو سیمو کې ښه وده کوي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپرښت ساحه

دا نبات په طبیعي ډول د افریقا په وچو سیمو کې خپور شوی. چې د هغې ځای څخه بیا مصر، منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو ته خپور شوی. چې په اوسني وخت کې په اسیا، استرالیا او نورو هیوادونو کې هم په طبیعي او وحشي ډول پیدا کېږي (Alam, 2011).

استعمال

کیکریو اګرو فورسټري نبات دی. چې په کرنیزو ځمکو کې هم د قطار په شکل چې د حیواناتو د تغذیې لپاره کرل کېږي. دا نبات په کرنیزو ځمکو کې د باد ماتونکو په توګه هم کرل کېږي. له دې نبات څخه په ساختماني چارو کې، د ریل ګاډو پټلیو کې او حیواناتو لپاره د علوفې په ډول استفاده کېږي. د پوستکي او پانو څخه یې تانین استخراجېږي چې د تانینو څخه یې بیا په دویانو کې استفاده کېږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).



علمي نوم: *Diospyrus lotus*

انگلیسي نوم: Date plam

محلي نوم: تور املوک

کورنی: Ebenaceae

مورفولوژي

دا نبات درميانه سايز لرونکی نبات دی چې اوږدوالي يې ۱۵-۳۰ متره پورې رسيري او قطر يې ۱-۱،۵ متره پورې رسيري خو زموږ څيړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په ديوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۱۷ متره اوږدوالی او ۱۰۰ سانتي متره قطر لري. دا نبات کوچني گلان لري او June-July مياشتو کې گلان نيسي. دا نبات يو پاڼه ريښوونکی نبات دی چې ميوه Oct-Nov مياشتو کې پخيري. د گرده افشانی لپاره بل نبات ته ضرورت لري. په Clay ښه ذهکشي شوي خاوره، نيمه سيوري لرونکي او لمد خاوره کې ښه وده کوي. د دې نبات پوستکی د ځوانۍ پر وخت څر نصواري خو د وخت په تيريدو سره تياره نصواري رنگ غوره کوي

(Breckle & Rafiqpoor, 2010).

انتشار او خپرنت

دا نبات د جنوب لويديځې اسيا او د جنوب ختيځې اروپا اصلي او بومي نبات دی چې دې ساحو څخه بيا د نړۍ نورو برخو ته خپور شوی دی. تور املوک په تيتو او متوسط اندازه لوړو غرونو کې شتون لري او رڼا خوښوونکې ونه ده چې په ډبرينو، ميلان لرونکو او ژورو خاورو کې ښه وده کوي او د بحر له سطحې څخه په ۶۰۰-۲۰۰۰ متره ارتفاع کې پيداکيږي (Alam, 2011).

استعمال

ددې نبات د ميوې څخه په وچ او هم په تازه ډول استفاده کيږي چې ميوې يې په زياته اندازه شکرې، Malic acid او ويتامينونه لري. همدارنگه ميوه يې د تکثير او طب په برخه کې هم استعماليږي. لرگی يې Smalltimber او سونگ موادو په توگه د استعمال ځايونه لري. پخوا وختونو کې ددې ونې لرگی د لوڅو د جوړولو لپاره استعمالیده. پانې يې د علوفې او کمپوست جوړونې په منظور هم استعماليږي (Breckle & Rafiqpoor, 2010).



علمي نوم: *Dodonaea viscosa*

انگليسي نوم: Hop bush

محلي نوم: غورپاسکي

کورني: Sapindaceae

مورفولوژي

غورپاسکي تيزه وده کوونکی بوټی دی چې اوږدوالی يې په منځنۍ اندازه ۲ متره او قطر يې تر ۲۰ سانتي مترو پورې رسېږي خو زموږ څېړنو وښودله چې د کنړ ولايت، څوکی ولسوالۍ په دیوه گل دره کې نوموړی نبات په منځنۍ توگه ۱،۶ متره اوږدوالی او ۹ سانتي متره قطر لري. پوستکي يې په لومړيو کې تیاره خرڅو د وخت په تیریدو سره تیاره نصواري رنګ غوره کوي او پوستکي يې زیر وي. دا نبات کوچني ښاخونه لري، ژېړ رنګ لرونکي گلان لري او گلان يې په پسرلي او مني کې غوړیږي. تخمونه يې ښويه او تور رنګ لري چې د باد پواسطه خپریږي (Alam, 2011).

انتشار او خپرښت ساحه

غورپاسکي د استراليا، کینیا، نیوزلینډ، عمان، جنوبي افريقا او د ايران موزنی نبات دی چې د دې ځایونو څخه بیا امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ نورو هیوادونه ته خپره شوې ده. دا نبات په غرونو او تیرو لرونکو خاورو کې ښه وده کوي او د بحر له سطحې څخه په ۲۰۰-۲۰۰۰ متره ارتفاع کې پیداکيږي.

استعمال

دا بوټی د شاتو مچيو د روزنې لپاره، د خاورې د تخریب د مخنیوي لپاره، او د زینت لپاره په پارکونو، کورونو غاړو او د کوڅو په غاړو کې کرل کیږي. همدارنګه د دې نبات پانې د حیواناتو په خاص ډول د غواگانو لپاره په زړه پورې خواړه برابروي او د کمپوسټ جوړولو لپاره هم ډیر استعمالیږي. د غورپاسکي د بوټي څخه په ځینو امراضو لکه د خیتې درد، د سینې درد او د سرطان په مخنیوي کې استفاده کیږي. (Breckle & Rafiqpoor, 2010).

علمي نوم: *Morus nigra*

انگليسي نوم: mulberry

محلي نوم: تور توت

کورنی: Moraceae

انتشار او خپرښت ساحه: افغانستان، هند، چین،
اندونیزیا او ایران کې په زیاته اندازه پیدا کیږي.

استعمال: د علوفې په ډول ترې استفاده کیږي او هم
میوه یې استعمالیږي.

علمي نوم: *Ziziphus spp*

انگليسي نوم: jujube tree

محلي نوم: بیره

کورنی: Rhamnaceae

انتشار او خپرښت ساحه: عربستان، کویت، افغانستان،
ایران، پاکستان، امریکا او شمالي اسیا په ټولو
هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي.

استعمال: د میوې څخه یې هم په وچ ډول او هم تازه
ډول استفاده کیږي.

علمي نوم: *Pistacia khinjuck*

انگليسي نوم: wild pistachio

محلي نوم: شنی

کورنی: Anacardiaceae

انتشار او خپرښت ساحه: ایران، افغانستان، امریکا،
پاکستان، ترکیه، افریقا کې پیدا کیږي.

استعمال: صنعت، میوې څخه یې استفاده کیږي.

علمي نوم: *Citrus aurantium*

انگليسي نوم: Sour orange

محلي نوم: نارنج

کورنی: Rutaceae

انتشار او خپرښت ساحه: مصر، د اسیا په جنوب
لویدیځ، عربستان، عراق، ایران، پاکستان او د
افغانستان کې پیدا کیږي.

استعمال: د میوې څخه یې استفاده کیږي.

علمي نوم: *Prunus persica*

انگليسي نوم: Peach

محلي نوم: شفتالو

کورنی: Rosaceae

انتشار او خپرښت ساحه: افغانستان، پاکستان، هند،
ایران، امریکا، برازیل او په استرلیا کې پیدا کیږي.

استعمال: د میوې د تولید له پاره ترې استفاده کیږي.

علمي نوم: *Citrus sinensis*

انگليسي نوم: Orange

محلي نوم: مالته

کورنی: Rutaceae

انتشار او خپرښت ساحه: چین، هندوستان، پاکستان،
ایران، افغانستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي.

استعمال: د میوې څخه یې استفاده کیږي.

علمي نوم: *Juniperus communis*

انگليسي نوم: Juniper

محلي نوم: اوبخته

کورنی: Cupressaceae

انتشار او خپرښت ساحه: د افغانستان په غرنیو ساحو، شمالي امریکا، اروپایي هیوادونو او روسیې کې په زیاته اندازه پیداکیري.

استعمال: د لرگیو د تولید له پاره ترې استفاده کیري.

علمي نوم: *Eriobotrya japonica*

انگليسي نوم: Loquat

محلي نوم: لوکاپ

کورنی: Rosaceae

انتشار او خپرښت ساحه: اوکراین، ترکیه، یونان، المان، تاجکستان او په افغانستان کې په زیاته اندازه پیداکیري.

استعمال: د میوې د تولید له پاره ترې استفاده کیري.

علمي نوم: *Prunus domestica*

انگليسي نوم: Plum

محلي نوم: الوچه

کورنی: Rosaceae

انتشار او خپرښت ساحه: افغانستان، پاکستان، چین، جاپان او اکثره اروپایي هیوادونو کې پیداکیري.

علمي نوم: *Pyrus communis*

انگليسي نوم: Pear

محلي نوم: ناک

کورنی: Rosaceae

انتشار او خپرښت ساحه: پاکستان، ترکیه، ایران، روسیه او د منځنۍ اسیا په اکثره هیوادونو کې پیداکیري.

استعمال: د میوې د تولید له پاره ترې استفاده کیري.

علمي نوم: *Callistemon viminalis*

انگليسي نوم: Bottle Brush

محلي نوم: گلید

کورنی: Myrtaceae

انتشار او خپرښت ساحه: مرکزي امریکا، شمالي افریقا، افغانستان، پاکستان او اسیایي هیوادونو کې په زیاته اندازه پیداکیري.

استعمال: د زینت له پاره د پارکونو او کورونو په غاړو کې کرل کیري.

علمي نوم: *Prunus armenica*

انگليسي نوم: Apricot

محلي نوم: زردالو

کورنی: Rosaceae

انتشار او خپرښت ساحه: مرکزي اسیا هیوادونه، ازبکستان، هندوستان او اروپایي هیوادونو کې په زیاته اندازه پیداکیري.

استعمال: د میوې د تولید له پاره کرل کیري.

مناقشه (Discussion)

شریستا په (۲۰۱۹) میلادي کال کې د نیپال هیواد د نباتاتو ارزونه ترسره کړې وه چې پدې څېړنه کې یې د کواډریټ میتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره یې 10×10 متره کې کواډریټونه استعمال کړي وو چې د دې ارزونې په پایله کې یې د نباتاتو ۲۹۹ نوعې چې ۸۶ کورنیو سره یې تړاو درلود پیژندلي وو چې پکې Dicots او Monocots دواړه شامل وو چې د Dicots له جملې څخه یې ۶۹ کورنۍ او ۲۲۹ نوعې پداسې حال کې چې د Monocots له جملې څخه یې ۱۵ کورنۍ او ۳۹ نوعې شاملې وې پدې ارزونه کې د نباتاتو تر ټولو غالبې کورنۍ عبارت وې له Rosaceae ۲۳ نوعې، Ericaceae ۱۷ نوعې او Lauraceae څخه چې ۹ نوعې یې درلودې .

سرکار او ډیوی په (۲۰۱۴) میلادیکال کې د هند هیواد په Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary کې د نباتاتو ارزونه ترسره کړې وه چې په دې ارزونه کې یې د کواډریټ میتود څخه استفاده کړې وه چې د ونو لپاره یې 10×10 متره کې کواډریټونه استعمال کړي وو او د ټولو کواډریټونو شمیر یې ۱۰۰ وو. د دې ارزونې په پایله کې یې د ونو ۷۵ نوعې چې د نباتاتو ۴۰ کورنیو سره یې تړاو درلود پیژندلي وې او غالبې کورنۍ یې عبارت وې له Moraceae ۸ نوعې، Magnoliaceae ۵ نوعې، Anacardaceae ۴ نوعې او Meliaceae څخه چې ۴ نوعې یې درلودې. زموږ څېړنې وښودله چې په دیوه گل دره کې د ونو او بوټو ۳۰ مختلفې نوعې چې ۱۷ مختلفو نباتي کورنیو پورې تړاو لري شتون لري. په ذکر شوو کورنیو کې د Rosaceae کورنۍ یې تر ټولو زیات (۵) سپیشزونو په درلودلو سره غالبه کورنۍ ده ورپسې Fabaceae کورنۍ (۳) سپیشزونه، Moraceae (۳) سپیشزونه او Rutaceae (۳) نوعې لري. له ذکر شوو ونو او بوټو څخه (*Quercus dilatata*) د ($RD=19.6$) نسبتي ګڼوالي په لرلو سره تر ټولو زیاته ساحه تر پوښښ لاندې راوستې ده همدارنګه په ترتیب سره (*Olea europaea*) د ($RD=16.8$) نسبتي ګڼوالي، (*Zizyphus spp*) د ($RD=10.63$) نسبتي ګڼوالي، (*Reptonia boxifolia*) د ($RD=9.85$) نسبتي ګڼوالي په درلودلو سره تر ټولو غالبې نوعې وې پداسې حال کې (*Pistacia khinjuck*) د ($RD=0.32$) نسبتي ګڼوالي په درلودلو سره تر ټولو کمه ساحه پوښلې ده. همدارنګه د فرمول په اساس Shannon Weiner د نوعو د تنوع لړیال ($H' = 2.6$) داسې ښودنه کوي چې د دیوه گل درې د ونو او بوټو تنوع په اوسط حالت کې قرار لري پداسې حال کې چې د تنوع یوشانوالی یې ($Eveness = 3.4$) دی .

نتیجه گیری (Conclusion)

په دیوه گل دره کې د ونو او بوټو ۳۰ مختلفې نوعې چې ۱۷ مختلفو نباتي کورنیو پورې تړاو لري شتون لري. په ذکر شوو کورنیو کې د Rosaceae کورنۍ یې تر ټولو زیات (۵) سپیشزونه په درلودلو سره غالبه کورنۍ ده ورپسې Fabaceae کورنۍ (۳) سپیشزونه، Moraceae (۳) سپیشزونه او Rutaceae (۳) نوعې لري. له ذکر شوو ونو او بوټو څخه (*Quercus dilatata*) د ($RD=19.6$) نسبتي ګڼوالي په لرلو سره تر ټولو زیاته ساحه تر پوښښ لاندې راوستې ده همدارنګه په ترتیب سره (*Olea europaea*) د ($RD=16.8$) نسبتي ګڼوالي، (*Zizyphus spp*) د ($RD=10.63$) نسبتي ګڼوالي، (*Reptonia boxifolia*) د ($RD=9.85$) نسبتي ګڼوالي په درلودلو سره تر ټولو غالبې نوعې وې پداسې حال کې (*Pistacia khinjuck*) د ($RD=0.32$) نسبتي ګڼوالي په درلودلو سره تر ټولو کمه ساحه پوښلې ده. همدارنګه د فرمول په اساس Shannon Weiner د نوعو د تنوع لړیال ($H' = 2.6$) داسې ښودنه کوي چې د دیوه گل درې د ونو او بوټو تنوع په اوسط حالت کې قرار لري پداسې حال کې چې د تنوع یوشانوالی یې (Evenness) $= 3.4$ دی.

سپارښتنې (Recommendations)

- څرنگه چې ونې او بوټي ډیر زیات ارزښت لري او د انسانانو په ژوندانه کې یو مهم نقش لوبوي نو باید په ساتنه او زیاتیدنه کې یې هر اړخیزه لارې چارې ولټول شي او جدي اقدامات پرې عملي شي.
- د لوړو زده کړو د محترم وزارت څخه هیله کوم چې زراعت یو مسلکي او ساینسي پوهنځی دی او د ساینس لپاره قاعده داسې ده چې ساینس په تجربو ولاړ دی، چې د څېړنې په برخه کې لازم امکانات باید په هر پوهنتون کې د کرنې او دې ته ورته نورو ساینسي پوهنځیو محصلینو ته په واک کې ورکړي.
- دا چې ونې او بوټي د مختلفو اهدافو له پاره په مختلفو شکلونو زیانمن کيږي او ونې او بوټي د سقوط او انقراض د حالت سره مخ دي د دولت څخه مې دا غوښتنه ده باید ددغه سترگوانښ مخه ونیسي ترڅو دغه ملي شتمني خوندي وساتل شي او بقا ومومي.
- ټولنې او ځایي خلک باید د ونو او بوټو په ساتنه کې ډیره ونډه ولري د ونو او بوټو په زیانمنیدو باندې باید ناغې ولگوي ترڅو د ونو او بوټو د سقوط او له منځه تللو مخنیوی وشي.

ماخذونه

Alam, M. (2011). Trees and shrubs of Afghanistan: *A Dendrological Guide*, Rossolis. Lausanne, Switzerland.

Ali, M. A., Iqbal, M. S., Ahmad, K. S., Akbar, M., Mehmood, A., Hussain, S. A., ... & Islam, M. (2022). Plant species diversity assessment and monitoring in catchment areas of River Chenab, Punjab, Pakistan. *Plos one*, 17(8), e0272654.

Breackle, S.W., and Rafiqpoor, M. D. (2010). Field Guide Afghanistan: Flora and Vegetation, *Scientia Bonnensis*. Bonn, Germany.

Chebli, Y., Chentouf, M., Cabaraux, J. F., & El Otmani, S. (2023). Floristic Composition, Diversity, Palatability, and Forage Availability of Forest Rangelands in the Southern Mediterranean Region of Northern Morocco. *Land*, 12(1), 215.

Chhetri, N. B. K., & Shrestha, K. K. (2019). Floristic diversity and important value indices of tree species in lower Kanchenjunga Singhalila ridge Eastern Nepal. *American Journal of Plant Sciences*, 10(1), 248-263.

Dibaba, A., Soromessa, T., & Warkineh, B. (2022). Plant community analysis along environmental gradients in moist afro-montane forest of Gerba Dima, South-western Ethiopia. *BMC Ecology and Evolution*, 22(1), 12.

<https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2016/08/01/afghanistan-district-level-visualization>.

Negi, V. S., Giri, L., & Sekar, K. C. (2018). Floristic diversity, community composition and structure in Nanda Devi National Park after prohibition of human activities, Western Himalaya, India. *Current Science*, 115(6), 1056-1064.

Sarkar, M., & Devi, A. (2014). Assessment of diversity, population structure and regeneration status of tree species in Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary, Assam, Northeast India. *Tropical plant research*, 1(2), 26-36.

Sekar, K. C., Thapliyal, N., Pandey, A., Joshi, B., Mukherjee, S., Bhojak, P., ... & Bahukhandi, A. (2023). Plant species diversity and density patterns along altitude

gradient covering high-altitude alpine regions of west Himalaya, India. *Geology, Ecology, and Landscapes*, 1-15.

Wani, Z. A., & Pant, S. (2023). Assessment of floristic diversity and community characteristics of Gulmarg Wildlife sanctuary, Kashmir Himalaya. *Geology, Ecology, and Landscapes*, 1-21.

لومړۍ ضمیمه: کواډریټونه

Quadrates	Species									
	ښوون	څپرۍ	توراملوک	لاچي	سپين توت	شوه	شفتالو	نېتر	غز	انځر
1	11	18	4	3	0	0	0	0	0	14
2	14	11	0	0	11	1	0	0	0	0
3	8	13	6	4	0	0	0	0	4	0
4	11	12	3	0	9	0	0	0	0	10
5	8	8	0	0	10	0	0	0	0	0
6	9	9	6	0	1	0	0	3	0	0
7	3	3	0	3	0	4	0	0	0	0
8	6	0	2	0	0	0	4	0	3	10
9	6	5	0	2	3	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5
11	8	17	0	0	9	0	1	0	0	5
12	9	15	0	5	22	0	0	0	5	0
13	0	5	0	0	3	3	0	4	0	10
14	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13	4	0	0	3	0	1	0	0	10
16	7	5	0	0	5	0	0	0	0	10
17	9	6	0	0	0	0	2	0	0	0
18	2	12	0	0	0	0	0	0	0	6
19	9	11	0	0	0	0	0	0	0	4
20	6	19	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9	17	0	0	0	0	0	0	0	3
23	8	10	0	0	0	0	0	0	0	7
24	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5	17	0	0	0	0	0	0	2	0
27	9	16	0	0	0	0	1	0	0	0
28	16	13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	12	8	0	0	0	0	0	0	4	0
30	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	262	305	21	17	86	11	9	9	16	94

Quadrates	Species									
	چهارمغز	سفیدار	گورگره	بیره	پلوخه	غوراسکی	کیکر	شنی	بکیانه	تورنوت
1	2	2	13	15	12	0	0	0	0	0
2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4
5	3	5	0	15	0	8	0	0	0	0
6	0	0	20	0	10	0	0	2	0	0
7	0	0	0	15	0	12	0	0	0	4
8	3	0	15	0	0	0	0	0	3	0
9	5	5	15	10	10	8	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
11	0	4	0	0	15	16	2	0	0	5
12	0	1	0	20	15	0	0	0	2	0
13	0	0	20	0	0	4	0	1	0	2
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	4	0	1	0	0	2
16	0	0	10	10	16	0	0	0	0	0
17	0	0	10	10	0	10	2	0	0	0
18	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
20	0	0	5	20	0	20	0	0	0	0
21	0	0	5	0	15	0	0	0	0	0
23	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
26	0	0	10	0	10	0	0	2	2	0
27	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
28	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0
29	0	0	0		0	0	0	0	3	0
30	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Total	13	20	153	165	142	78	9	5	10	22

Species

Quadrates	مالټه	اوبخته	لوکات	الوجه	ناک	گلبید	زردالو	لیمو	سورتوت	چنار
1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	3	5	0	0	0	2	0	0	0	0
6	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0
7	2	0	0	3	0	0	0	0	0	4
8	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0
9	2	5	0	2	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
11	0	4	0	0	4	4	2	0	0	2
12	0	1	0	4	0	0	0	0	2	0
13	2	0	3	0	0	1	0	1	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
27	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Total	13	15	13	9	8	8	14	8	8	15

دوهمه ضمیمه: عکسونه



(۸) شکل: د الوچې ښودنه کوي



(۷) شکل: د قطر د اندازه کولو ښودنه کوي



(۱۰) شکل: د تور املوک ښودنه کوي



(۹) شکل: د پلوڅې ښودنه کوي



(۱۲) شکل: د توت ښودنه کوي



(۱۱) شکل: د څيړۍ ښودنه کوي



شکل (۱۴): د سفیدار بنودنه کوي



شکل (۱۳): د غز بنودنه کوي



شکل (۱۶): د بکيانې بنودنه کوي



شکل (۱۵): د شنډۍ بنودنه کوي



شکل (۱۸): د نارنج بنودنه کوي



شکل (۱۷): د کيکر بنودنه کوي



شکل: د چینار ښودنه کوي (۲۰)



شکل: د شوې ښودنه کوي (۱۹)



شکل: د بیرې ښودنه کوي (۲۲)



شکل: د قطر اندازه کولو ښودنه کوي (۲۱)



شکل: د د ډیتا راټولولو ښودنه کوي (۲۴)



شکل: د ونې د ارتفاع د اندازه کولو ښودنه (۲۳)

دریمه ضمیمه: د X او Y نقطې

د کواډریتونو ساحه شمیر	لوری	X	Y
1	پوشتیگان	34.79739	70.82652
2	پوشتیگان	34.79953	70.82833
3	سیرگل	34.7958	70.82813
4	سیرگل	34.79665	70.82533
5	چلس لوی کلی	34.79521	70.82406
6	چلس لوی کلی	34.78957	70.82885
7	سپیدار غر	34.78879	70.83246
8	سپیدار غر	34.78657	70.83619
9	بدگوړ	34.78563	70.8381
10	چلس	34.78357	70.83868
11	چلس	34.78118	70.84078

70.84581	34.77843	جنوب	چلس	12
70.84826	34.77838	شمال	سنگر	13
70.84995	34.77751	ختیخ	سنگر	14
70.85124	34.77809	ختیخ	سنگر	15
70.85332	34.78119	لویدیخ	سپیدار غر	16
70.85343	34.77824	جنوب	سپیدار غر	17
70.85308	34.77399	جنوب	بدگوړ	18
70.85681	34.77195	شمال	بدگوړ	19
70.85573	34.7696	شمال	بدگوړ	20
70.85509	34.76703	لویدیخ	بدگوړ	21
70.85638	34.76333	لویدیخ	پوو	22
70.85787	34.7619	جنوب	پوو	23
70.85943	34.76324	جنوب	پوو	24
70.86257	34.76256	شمال	بادینزو	25

70.86834	34.76396	ختیخ	بادینزو	26
70.87381	34.76418	ختیخ	بادینزو	27
70.86735	34.75487	ختیخ	چمبیل	28
70.87055	34.75296	شمال	چمبیل	29
70.87694	34.75135	شمال	چمبیل	30

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library